

33724 / R  
vol 4

Q. M. (M. M.) 110















CAROLI LINNÆI  
ENTOMOLOGIA,  
FAUNÆ SUECICÆ DESCRIPTIONIBUS  
AUCTA;

DD. SCOPOLI, GEOFFROY, DE GEER, FABRICII,  
SCHRANK, &c. speciebus vel in Systemate non enume-  
ratis, vel nuperrime detectis, vel speciebus Galliæ  
Australis locupletata, generum specierumque rariorum  
iconibus ornata;

Curante & augente CAROLO DE VILLERS, Acad.  
Lugd. Massil. Villa-Fr. Rhotom. necnon Geometriæ  
Regio Professore.

TOMUS QUARTUS.




LUGDUNI;

Sumptibus PIESTRE ET DELAMOLLIERE.

---

I 7 8 9.







## VII.

# A P T E R A.

*Alæ nullæ in omni sexu.*

---

## GENUS PRIMUM.

LEPISMA. *Pedes* VI. cursorii.

*Os* palpis 2. setaceis & 2. capitatis.

*Cauda* setosa, setis extensis.

*Corpus* squamis imbricatum.

Saccharina. 1. L. ( la saccharine ) squamosa, cauda triplici. t. II. f. 1.

*Brown. jam.* 425. setoura subargentea, cauda setosa setis hirsutis.

*Aldr. inf.* 570. t. 2. f. 5. forbicina.

*Geoff. paris.* 2. p. 613. t. 20. f. 3. forbicina.

*Sultz. inf.* t. 22. f. 142.

*Schæff. elem.* t. 75.

*Adam microgr.* t. 28. f. 147.

*Fab.* 1.

*De Geer tom.* 7. p. 14. semicylindrica, argentea, corpore semicylindrico squamoso, abdominis apice setis tribus.

*Enum. n.* 1009.

*Faun. Fridr. n.* 793.

*Insect. Tomus IV.*

A

*Hab. in America inter saccharum & utensilia domestica, inde per Europam vulgaris, hodie in Suecia incepit, edit etiam libros vestesque laneas.*

*Corpus lævissimum, cærulescens. Antennæ albidæ, longitudine corporis. Palpi 2 setacei & 2 capitati. Thoracem excipiunt scuta 2 majora. Abdomen segmentis 10 minoribus. Cauda setis 3 distantibus, longis, at subtus paria 2 setarum minimarum versus anum.*

*Obs. Bibliothecariis forte perperam invisum animal; mihi enim acaris vivere videtur, qui librorum compacturæ insidiantur, ipsum hominis supellectili, si forte dulcia demas, innoxium. Enum.*

**Polypoda. 2. L. (la polypede) scutata, cauda triplici.**

*Fab. 2. saltatoria, cauda triplici, abdominis segmentis subtus utrinque villosis.*

*Geoff. tom. 2. p. 614. n. 2. teres saltatrix.*

*Stroem. act. Hafn. 9. 575. t. 2.*

*Hab. in Dania. D. Brunniche. In Europæ littoribus lapidosus. F. In Gallia Aust. V.*

*Corpus fuscescens, minus præcedente, latum. Antennæ longitudine corporis; antennæ succenturiatæ inferius proximæque, prioribus triplo breviores, articulis 5, incurvatæ. Palpi 2, capitati, ad os. Pedes anteriores juxta os locati. Scuta tegunt corpus. Caudæ 3, longitudine corporis. Abdominis singula segmenta subtus ad marginem spina armata, pedis instar.*

*Obs. 1. Saltat velocissime furca subulata alba ani. Fab.*

*Obs. 2. Datur alia simillima cauda quintiplici, forte mera sexus varietas. Fab.*



Terrestris. 3. L. ( la terrestre ) nuda cauda triplici. \*  
*Hab. in Europa. Supra terram rarissima.*  
*In Gallia Aust. V.*

*Similis poduræ, sed major, corpore toto albo cylindrico. Antennæ corporis dimidii longitudine, obtusæ ut in podura.*

*Desc. Corpus cylindricum, album, facie poduræ. Antennæ corporis dimidii longitudine, obtusæ. Setæ caudæ tres extertæ. Faun. 1926.*

*Ex spec. D. Fab.*

Lineata. 4. L. ( la rayée ) cauda triplici, corpore fusco, vittis duabus albis.

*Hab. in Helvetiæ muris.*

*Desc. Antennæ setaceæ, longitudine corporis. Thorax tectus scutis tribus postice emarginatis. Corpus squamosum, supra fuscum s. nigrum, cinereo irroratum, vittis duabus longitudinalibus albis. Cauda triplex pilis villosis, intermedia brevior. Setulæ aliquot sub cauda. Subtus argentea, pectore scutis tribus tecto. Pedes breves, femoribus compressis.*

*Ex Ent. Carn.*

Longicornis. 5. L. ( la longicorne ) antennis corpore longioribus.

*Hab. in Europa.*

*Desc. Corpus supra fuscescens, & squamulis imbricatis subargenteis tectum. Caput pilosum. Antennæ pallide ferrugineæ villosulæ. Tota subtus albida, tibiis antennarum colore. Femora compressa. Setæ caudales longiores tres, villosæ, corpore breviores, quibus subjacent duæ aliæ breviores.*

A ij

## G E N U S   I I.

PODURA. *Pedes* VI cursorii.  
*Oculi* II compositi ex octonis.  
*Cauda* bifurca, saltatrix, inflexa.  
*Antennæ* setaceæ elongatæ.

Viridis. 1. P. ( la verte ) subglobosa viridis. \*  
*Geoff. paris.* 2. p. 607. podura viridis, capite  
 flavescente, antennis in medio fractis.  
*Fab.* 2.

*Enum. n.* 1011.

*Hab.* in Europæ plantis, frequens in  
 polygoni fagopyri foliis primordialibus.

*Desc.* Magnitudo majoris pediculi capitis.  
*Abdomen* dilutius viride, globosum,  
 parum in ovalem figuram terminatum,  
 versus anum admodum convexum, vi-  
 ride cum cinerascens mixtura. *Thorax*  
 tenuissimus, vix conspicuus. *Caput* viri-  
 de, obtusum, cicadis non adeo dissimile.  
*Oculi* supra caput nigri, cum linea utrin-  
 que nigricante. *Pedes* albo-virides,  
 æquales. *Antennæ* recurvæ. *Faun.* 1927.

Polypoda. 2. P. ( la polypede ) subglobosa atra, an-  
 tennis longitudine corporis apice albis. \*

*Fab.* 3.

*Hab.* in Europæ plantis.

*Desc.* Inter majores hujus generis est. *Ab-*  
*domen* globosum, sed *anus* quasi capitulo  
 eminent. *Antennæ* nigrae, corporis lon-  
 gitudine, quas divaricatas antrorsum  
 protendit, apice albæ. *Faun.* 1928.

Atra. 3. P. ( la noire ) globosa fusca nitida, an-  
 tennis longis, articulis plurimis.

*Ad. Stockh.* 1743. p. 296. t. 7.

*Fab.* 4.

*De Geer tom.* 7. p. 35. n. 7. t. 3. f. 7, 8.  
globosa, fusca, nitida, antennis longis  
fractis, articulis plurimis.

*Enum.* n. 1010.

*Faun. Fridr.* n. 794.

*Hab.* in Europæ terrestribus. In Gallia  
Aust. V.

*Desc.* Fusca, globosa. *Antennæ* longæ,  
fractæ, quatuor articulis in parte  
infima, plurimis in superiore. *Oculi* 16,  
pone antennis utrinque 8. *Corpus*  
ovatum versus anum acuminatum.  
*Pedes* tenues. *Cauda* mobilis, furcata.  
Inter furcæ apices pars cylindri huic  
poduræ propria, e qua animal tenta-  
culos retractiles exserit.

Plumbea. 4. P. (la plombée) teres fusco-cærulea nitida.

*Sultz. inf.* t. 22. f. 143.

*Geoff. paris.* 2. p. 610. n. 9.

*Fab.* 5.

*De Geer tom.* 7. p. 31. t. 3. f. 1.-4.  
corpore tereti, nigro-cæruleo, antennis  
quadrinodiis, capite pedibusque griseis.

*Enum.* n. 1014.

*Faun. Fridr.* n. 795.

*Hab.* in Europæ terrestribus.

*Desc.* Reliquis major & pediculi vulgaris  
magnitudinem attingens, omnino teres,  
fusco-cærulea, polita, pilis raris ad-  
spersa. *Pedes* albidi. *Curstat* & interdum  
salit. *Pedes* ani etiam albi. *Faun.* 1930.

*Obs.* Corpus squamosum uti lepidopterorum  
alæ. V.

Minuta. 5. P. (la petite) ovata flava, dorso maculis  
duabus ferrugineis.

*Fab.* 6.

*Hab. in Suecia. In Europæ hortis. Fab.*  
*Corpus omnium minimum. Humeri f.*  
*anterior pars abdominis, ut & ro-*  
*stica pars supra dorsum versus caudam,*  
*fusco-ferruginea.*

*Nivalis. 6. ( de la neige ) oblonga cinerea signaturis*  
*nigris. \**

*E. N. C. dec. 2. ann. 3. obs. 197. pulex nivis.*

*De Geer Að. Ups. 1740. p. 54. t. 2.*

— *tom. 7. p. 21. t. 2. f. 8.-10. Arborea*  
*grisea oblonga, griseo-cinerea, signa-*  
*turis nigris, antennis longis quadri-*  
*nodiis.*

*Fab. 7.*

*Enum. n. 1012.*

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1019.*

*Hab. in Europæ nemoribus, lignis. Hyeme*  
*frequens supra nives in vestigiis ho-*  
*minum & mammalium.*

*Desc. Corpus oblongum, cinereum, cha-*  
*racteribus nigris notatum. Faun. 1931.*

*Obs. Abdominis incisura quinta omnium*  
*longitudinem æquat. Sub arborum*  
*cortice cum atris reperiuntur. An*  
*fexus varietas ?*

*Vaga. 7. P. ( la vagabonde ) oblonga nigra, ab-*  
*domine antennisque fascia alba.*

*Fab. 8.*

*Stivem. að. Hafn. 9. 578. t. 3.*

*Hab. in Suecia. In Europæ nemoribus. Fab.*

*Nigra, sed bases antennarum & furca*  
*alba. Fascia abdominis dorsalis albida.*  
*Pedes nigri.*

*Arborea. 8. P. ( des arbres ) oblonga nigra, pedibus*  
*furcaque albis. \**

*Scop. carn. 1030.*

*De Geer. Að. Ups. 1740. p. 49. t. 1.*



—— *act. Stockh.* 1740. p. 272. t. 1.

—— *tom.* 7. p. 18. t. 2. f. 1.-6. *Arborea*  
nigra, oblonga nigra, antennis quadri-  
nodiis, pedibus furcaque pallide fuscis.

*Fab.* 9.

*Enum. n.* 1013.

*Müll. Lin. Nat. cl. v.* p. 1019.

*Geoff. inf. tom.* 2. p. 609. n. 6. nigra,  
thoracis limbo antennarumque basi  
flavis, pedibus furcaque pallidis.

*Hab. in Europæ sylvis.* In arborum cor-  
ticibus lignis putrescentibus; in pagina  
superioris ribis rubri foliorum frequens.

*Enum.*

*Desc.* Tota parva nigra. *Caudæ* furca  
cum pedibus & antennis versus basin  
albæ. *Faun.* 1932. 1177.

*Obs.* Cylindrica, angusta. *Caput* nigrum,  
postice angulatum, maculatum. *Antennæ*  
articulis 4. *Corpus* incisuris octo. *Cauda*  
basi mobilis.

Villosa. 9. P. ( la velue ) oblonga villosa, fusco  
nigroque variegata.

*Geoff. parif.* 708. t. 20. f. 2.

*Fab.* 10.

*Enum. n.* 1015.

*Beytr. Zur. nat. p.* 46. §. 3.

*Müll. Lin. Nat. cl. v.* p. 1020.

*Sulz. hist. inf. t.* 29. f. 2

*Hab. in Gallia;* reliquis triplo major. In  
Europa Australiori. *Fab.*

*Desc.* Luteo-fusca. *Caput*, *thoraxque*  
hirsuta. *Antennæ* articulis 4, corpore  
breviores. Sub lapidibus frequens. *Geoff.*

Cincta. 10. P. ( l'entourée ) cylindrica grisea,  
cingulo atro antice albo.

*Fab.* 11.

*Hab. in sylvis Europæ.*

**Pufilla. II. P.** ( la bronzée ) cylindrica ænea, furca alba.

*Fab.* 23.

*Hab.* in Europa, passim curstat, egregie exsultat.

*Corpus omnium minimum, attente observandum ne oculos fugiat, totum æneum, oblongum & fere cylindricum.*

**Aquatica. 12. P.** ( l'aquatique ) nigra aquatica. \*

*Scop. carn.* 1027.

*Geoff. parif.* 610. n. 8.

*De Geer Añ. Upf.* 1740. p. 57. t. 3.

— *añ. Stockh.* 1740. p. 279. t. 3, 4.

— *tom.* 7. p. 23. n. 3. t. 2. f. 11.—17. *aquatica nigra, antennis quadrinodiis.*

*Fab.* 15.

*Enum.* n. 1016.

*Lederm. epist.* 15. t. 7.

*Pod. gr.* p. 1020.

*Müll. Lin. Nat. cl.* v. p. 1020.

*Hab.* in aquotis Europæ, horis maturinis per phalanges decorticat aquas stagnantes.

*Obs.* Lemnam sæpe totam legit, sed habitat etiam libera supra aquas & sine medio. *Enum.*

*Desc.* Præter duos sexus a *D. de Geer.* egregie descriptos, etiam tertium, ni fallor, sexum observo, s. animalcula longe adhuc minora, rubra, rotundiora seu magis gibba, reliquis mixta. *Faun.* 1934.

*Obs.* 1. Super aquas stagnantes numerosæ. Aggregatæ laminis *P. nigris* similes. Aqua agitata, saltant, disperguntur, sed mox congregantur. *Antennæ* crassæ, quadrinodiæ. *Oculi* difficile conspicui, nigri. *D. de Geer.*

*Obs.* 2. *Poduræ* cinereæ, at rariores his

societate junguntur. An sexu, an ætate,  
an specie distinctæ?

Fimetaria. 13. P. ( la printaniere ) terrestris alba.

*Scop. carn.* 1029.

*Fab.* 16.

*Beytr. Zur. nat. p.* 47. §. 4. t. 2. f. 1.

*Enum. n.* 1017.

*Hab.* in terra prægnante, frequens primo  
vere, imprimis exit humo aqua terra  
irrorata, cauda obtusa mutica; non salit.

*Desc.* Hæc omnium minima est totaque  
alba. *Faun.* 1935.

*Obs.* Cauda prorsus nulla.

Ambulans. 14. P. ( l'ambulante ) alba, cauda bifida  
extensa obtusa.

*Fab.* 17.

*De Geer tom.* 7. p. 33. t. 3. f. 5, 6.

terrestris nivea, antennis quadrinodiis,  
cauda bifida brevi extensa.

*Faun. Fridr. n.* 796.

*Hab.* in montibus, sub muscis. In Galliæ  
vaporariis. V.

Corpus cylindricum, reliquis longius,  
album, molle. Punctum fuscum supra  
anum. Cauda setis 2 extensis, longi-  
tudine dimidii corporis. Non salit.

*Desc.* Facies omnino poduræ, teres,  
oblonga, alba, mollis, sed furca ca-  
rens, præter quod cauda sit bifida.  
Non salit. *Faun.* 1936.

*Ex Inf. paris. Entom. que paris.*

Signata. 15. P. ( la tachetée ) fusco-nigra, abdo-  
mine globoso, signaturis ferrugineis.

*Fab.* 1. subglobosa fusca, abdominis late-  
ribus fulvo maculatis.

*Hab.* sub lapidibus humidis.

*Desc.* *Antennæ* corporis longitudinem fere æquant. *Abdomen* griseum, rotundum, tribus quatuorve maculis lateralibus ferrugineis. *Cauda* abdomine pallidior.

Longicor- 16. P. ( la longicorne ) fusca non nitens, nis.

*Hab.* sub arborum cortice.

*Desc.* Fusca rotunda. *Caput* rotundatum. *Antennæ* corporis longitudine.

Livida. 17. P. ( la livide ) livido-lutea, annulis transversis nigris.

*Fab. n. 12. annulata*, livida annulis nigris.

*Hab.* sub lapidibus.

*Desc.* Livida. *Abdomen* septem fasciis nigris. *Pedum* articuli nigri.

Annularis 18. P. ( l'annulaire ) nigra, thoracis limbo antenarumque basi flavis, pedibus furcaque pallidis.

*Hab.* in lignis excisfis.

*Desc.* Nigra. *Antennæ* basi flavæ. *Thorax* basi flavus. *Pedes*, caudaque pallide albida.

Viatica. 19. P. ( des chemins ) atra, viatica.

*Hab.* in viis.

*Desc.* Nigra, ad lentem villosa. *Antennæ* dimidii corporis longitudine.

Violacea. 20. P. ( la violette ) violacea.

*Hab.* cum communi.

*Desc.* Podura plumbea minor. An ætate diversa?

*Ex op. D. de Geer.*

Aquatica- 21. P. ( l'aquatique-grise ) lineis dorsalibus grisea. nigris, antennis quadrinodiis. t. 11. f. 2.



*Ad. Upf.* 1740. p. 63. t. 4.

— *Suec.* 1740. p. 278. t. 4.

*Hab.* cum podura arborea & aquatica.

*Desc.* Villosa. *Antennæ* sæpe inæquales, articulis tribus una, quatuor altera. *Caput* rotundatum, maculis duabus ovatis. *Abdomen* linea, præter duas laterales pallidiores. *Aquaticæ* poduræ varietatem credidit *Linn.*

*Ex spec. D. Fab.*

**Lignorum. 22.** P. ( des bois ) plumbea, capite, thorace, pedibus furcaque pallidis.

*Hab.* in Europæ lignis antiquis.

*Desc.* Parva. *Caput* pallidum, ore antennisque nigris. *Thorax* subrotundus, pallidus, immaculatus. *Abdomen* plumbeum, furca nivea. *Pedes* pallidi.

*Ex Enum,*

**Monura. 23.** P. la monure ) albida, cauda indivisa conica.

*Hab.* cum fimetaria in terra prægnanti.

*Desc.* Habitu & statura poduræ *fimetariæ*, sed tantillo minor, & magis in cinereum colorem vergens. Præterea, si accurate inspiciās, linea longitudinali in dorso capite ad abdominis apicem descendente magisque, quam reliquum corpus, fusca, insigne videbis. *Antennæ*, computata basi, articulis quatuor constant, articulo extremo ovali, sed reliquis proportionem majori. *Oculi* nigri, lineam nigram utrinque in capite constituant. Partes omnes insecti satis pilosæ, præsertim corporis truncus, in quo pili longiores. *Cauda* partibus constat tribus, quarum prima, quæ

corpori adfixa est, in fuscum colorem leviter inclinat; pars altera pallida, uti totum insectum, summe diaphana, apicem versus angustior, apice ipso truncato; pars tertia aculei instar ex priori, tanquam ex vagina, progredi videtur, color ejus corneus. Hinc nomen *monuram* dixi, quod præterquam quod in hoc genere consuetum sit, caudam bifidam bipartitamque non habeat, sed simplicem, indivisam.

*Obs.* Inter poduras *finetarias*, quæ, uti dictum est, in terra prægnanti & ollis hortulanorum habitant, & post irrigationem copiosæ superficiem petunt, invenire est aliam quandam hujus generis speciem priori multo minus numerosam, sed quam facile cum priori confundas; nec enim, si non anxie colores distinguas, habes, quod suspicionem diversitatis tibi injiciat. *Podura* prior, quam ill. *Linnaeus* secutus, *finetariam* dixi, colore est prorsus albo, chori candidissimo plane consimili; at illa, quam nunc descripturi sumus, in carum vehementer inclinat. Hoc jam admonitus discrimine, & si satis levi, si attentius species, facile aliud, & illud multo præstantius, sese tibi sponte offeret; salit hæc species, cum prior hujus effugii prorsus sit inscia; saltus tamen sunt breves rarioresque, quam in reliquis descriptis hucusque speciebus. Et hoc erat præcipuum illud, quod me in hanc speciem attentum reddidit; nec mora, prehensum, cum primum licuit specimen, microscopio subjeci, novo stupore attonitus, cum caudam nullam, cujus ope saltus illos perageret, deprehendissem.

Reliquæ species caudam habent plerumque albentem, cum reliquum *corpus* sit alterius coloris, aut certe in morte caudam a corpore recta protendunt. Nihil horum in præsentī specie contingit; ut instrumentum hoc, mirandorum saltuum productivum invenias, arte opus est; speculum microscopiū contegere, nec insectum sub alio, quam reflexo radio intueri necesse est. Hoc ego demum artificio usus, qui saliat, intellexit. *Enum.*

*Ex Entom. Carn.*

Termifor- 24. P. ( la termiforme ) oblonga fusca ;  
mis. dorso piloso , antennis binodiis.

*Hab.* in Europa , sub corticefagi & circa hortos.

*Desc.* Habitus & statura termis *pulsatorii*. Dorsum gibbum , fasciculo pilorum , tanquam penicillo , cristatum. *Setæ* caudales pilosæ. *Pedes* pallidi , nigro annulati.

*Obs.* La podure approche un peu du pou pour la forme , & lui ressemble par le nombre de pattes & des yeux , & ses antennes sont tout-à-fait semblables à celles du pou , inf. paris. p. 605.

Outre la queue qui fait le caractère essentiel de la podure , elle en a encore un qui n'est pas moins remarquable quoiqu'il lui soit commun avec le genre précédent , c'est d'avoir tout son corps couvert de petites écailles , ainsi que le genre précédent. *ibid.* Poduræ oculi reipisa ex octo compositi , inde 16 oculi. Infuper non omnes squamosæ sunt. V.

## GENUS III.

TERMES. *Pedes* VI cursorii.

*Oculi* II.

*Antennæ*. setaceæ.

*Os* maxillis duabus.

Pulfatorium. I. T. ( le balancier ) abdomine oblongo,  
ore rubro, oculis luteis. \* t. II. f. 3.

*Scop. carn.* 1032.

*Derh. theol.* 119.

*Bradl. nat.* t. 27. f. 3.

*Raj. inf.* 8. *pediculo cognatus & similis*

*Aët. Angl.* n. 270. p. 231. & n. 291,  
p. 1586. & n. 245. p. 376.

*Roland. aët. Stockh.* 1754. p. 52.

*Sulz. inf.* t. 22. f. 144.

— *hist. inf.* t. 29. f. 3.

*Geoff. paris.* 2. p. 601. pediculus 12.

*Schæff. elem.* t. 126.

*Fab. hemerobius* 15. apterus ore rubro,  
oculis luteis.

*Blank. belg.* t. 14. f. F. *Podiceps ligni*

*De Geer tom.* 7. p. 41. n. 1. lignarium,  
oculis maculisque abdominalibus rufis.

An varietas. t. 4. f. 2.—t. 4. f. 3, 4.

*Faun. Fridr.* n. 797.

*Enum n.* 1019.

*Müll. Lin. Nat. cl.* v. p. 1024.

*Beytr. Zur. Nat.* p. 57. §. 11.

*Hab.* in Europa & America, frequens  
in domibus. Invisum vestibis, herba-  
riis, insectorum museis. Fœmina horo-  
logii instar pulfatoria in ligneis festucis.

*Desc. Corpus* oblongum, pallidum. *Oculi*

flavi. *Antennæ* fetaceæ , longitudine ( in plerisque , ) ipsius corporis. Macula fusca annularis intra abdomen & pone hanc versus anum punctum fuscum : segmenta abdominis ad latera punctis rufis singula notata sunt. *Os* rufum. *Faun.* 1937.

*Obs.* 1. Alatum in herbario Jamaicensi invenit celeb. *Schreber*.

*Obs.* 2. Ex hac & *D. Sparman.* observatione concludendum termes modo alatum modoque apterum esse & ad insecta neuroptera referendum.

*Obs.* 3. *Perla fusca* & *nasuta.* tom. 3. p. 567. t. 27. f. 4, 5, 6, a *D. de Geer.* descripta forsan ad termes alata pertinent, ut ipse clar. *Entom.* indicavit.

Fatidicum. 2. T. ( le prophete ) abdomine ovato , ore pallido , oculis fuscis. \*

*Frisch. inf.* 11. p. 2. t. 10.

*Fab.* hemerobius 16. apterus , ore pallido , oculis fuscis.

*Hab.* in Europa Australiori, nobis primum visum in plantis siccis a *Loeflingio* transmissis.

*Desc.* Simile præcedenti , sed duplo majus. *Oculi* fusci. *Os* pallidum. *Faun.* 1938.

*Ex Entom. Carn.*

Sylvarum. 3. T. ( des forêts ) ovatum album , antennis crassis uniarticulis.

*Hab.* in Europa. In terra sylvarum.

*Desc.* *Abdomen* pilosum , obtusum.

Florum. 4. T. ( des fleurs ) fulvum , antennis trinodiis.

*Hab.* in Europa. In flore allii ursini visum.



*Desc.* Oculi fusci. Corpus oblongum, agile. Antennæ albidæ, porrectæ, articulo ultimo setula terminato.

*Obs.* 1. Hoc & prius insectum ob os maxillosum huc retulit *D. Scop.*; sed observat *D. Schrank.* differentias ab oris oculorumque colore sumtas in hoc genere nihil decidere. Hoc posito, ad idem genus forsan non pertinerent. T. supradicta. V.

*Obs.* 2. Inter species hujus generis certe mirandum est termes capense, a *D. Sparman.* accurate descriptum. Moribus, industria laboribusque stupendum animal. In singula specie termes operarium, termes miles, termes alatum, mas vel foemina, quæ nec certant nec laborant. *Voyage au Cap de Bonne-Espérance.* tom. 2. p. 105.

*Obs.* 3. Formica alba Ind. Occ. insecta a *D. Adanson.* memorata sub hoc genere ordinanda: Rien ne m'a autant frappé que certaines éminences, qui par leur hauteur & leur régularité, me parurent de loin un assemblage de huttes de Negres & qui n'étoient que les nids de certains insectes; ce sont des pyramides rondes, de 8 à 10 picds de haut, sur une base à peu près de la même dimension, avec une surface unie, de la meilleure argille. *Voyage au Sénégal.*



## GENUS IV.

PEDICULUS. *Pedes* VI ambulatorii.

*Oculi* II.

*Os* aculeo exferendo.

*Antennæ* longitudine thoracis.

*Abdomen* depressum, sublobatum.

Humanus. I. P. ( de l'homme ) humanus;

*Mouff. inf. t.* 259.

*Ped. exp. t.* 18.

*Swamm. quart. t.* 7.

— *bibl. t. I. f.* 3.-6.

*Alb. aran. t.* 42.

*Bonan. micr. f.* 55.

*Joblot. micr. I. pp. I. t. I.*

*Baker. micr. t.* 13. *f.* 4.

*Schæff. elem. t.* 95.

*Sulz. inf. t.* 22. *f.* 145.

*Lederm. micr.* 45. *t.* 21.

*Fab. I. abdomine lobato cinereo.*

*De Geer tom. 7. p.* 62. *n. I. t. I. f.* 6.-10.

*Enum. n.* 1020.

*Faun. Fridr. n.* 798.

Hab. in capite & vestimentis humanis ;  
occiditur seminibus veratri , staphisag-  
riæ , menispermii , rutæ , apii , an-  
gelicæ , lauri ; croco , pipere , ledo ,  
lycopodio , pinguicula , hydrargyro ,  
gelu , æstu. Rodendo caput exci-  
tatores apud puerulos voraces incar-  
ceratos indeque strumosos , sicque præ-  
servat a coryza , tussi , cæcitate ,

Pediculi mammalium aviumque multo plures etiamnum non obser-  
vati , minus descripti , multo minus differentia determinati  
exstant.

*Insect. Tomus IV.*

B

*epilepsia, &c. Instante pluvia, descendit ad latera capitis.*

*Varietas capitis durior, coloratior; vestimentorum laxior, magis cinerea.*

*Problema qui solvat, cur aliæ ejusdem speciei familiæ mordicus capiti inhæreant, aliæ corporis vestimentis, is facile plurimum morborum contagiosorum naturam intelligat.*

Pubis. 2. P. ( le morpion ) pubis.

*Mouff. inf. 200.*

*Raj. inf. 8.*

*Schenck. obs. 676.*

*Red. exp. t. 19. f. 1.*

*Pet. gaz. t. 67. f. 9.*

*Fab. 2. abdomine postice emarginato, pedibus cheliformibus.*

*Enum. n. 1021.*

*Geoff. inf. tom. 2. p. 397. n. 2. pediculus inguinalis.*

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1028.*

*Hospitatur in hominis immundi pube, rarius in superciliis, pellitur oleo tabaci.*

*Antennæ articulis 5. Abdomen postice emarginatum pilosumque. Pedes 2 & 3 habent calcar & digitum cheliformem, quibus arte adhæret.*

Suis. 3. P. ( du cochon ) suis scrofæ.

*Enum. n. 1022.*

*Faun. Fridr. n. 800.*

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1030.*

*Hab. in Suibus.*

Porcelli. 4. P. ( du cochon-d'inde ) muris porcellis.

*Enum. n. 1023.*

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1030.*

*Hab. in mure porcello fatis copiosus.*

*Desc.* Facilius icone, quam verbis delineandus; inter majores sui generis. *Caput* ovatum, latere ultra medium versus abdomen crena instructum, ubi etiam oculi antennæque locantur. *Antennæ* moniliformes, articulo extremo maximo. Ante hanc crenam versus os crena utrinque alia, quo loco situm est corpusculum antenniforme. *Os* membro suatorio curvo prominente instructum. *Abdomen* fere cylindricum, oblongum, diaphanum, ita ut pedes transpareant. *Thorax*, angulis quatuor obtusis, irregulare format pentaedrum. Segmenta *abdominis* duo priora nonnihil reliquis obscuriora. *Pedes* ex partibus tribus constant, quas femur, tibiam, tarsum adpelles; hæ omnes satis magnæ; sed præterea in tarsi apice articulus brevis, tenuis, uncomobili nullo instructus; hinc facile a pilo animalis cui adhæret, deteri potest. *Anus* corpuscula duo acuminata exerit, iis simillima, quæ in acaræ aphidiode olim depinximus. *Enum.*

Cervi. 5. P. ( du cerf ) cervi.

*Frisch. inf.* 12. p. 15 t. 5.

*Red. exp.* t. 5.

*Fab.* 5.

*Faun. Fridr.* n. 801.

*Hab.* in cervo elapho, dama, capreolo.

Ovis. 6. P. ( de la brebis ) ovis arietis.

*Red. exp.* t. 22. f. 1?

*Enum.* n. 1025.

*Faun. Fridr.* n. 802.

*Hab.* in ovibus.

*Desc.* Inter majores sui generis. *Caput* orbiculare, apice seu ore instrumento

suctorio instructum. Utrinque ad latera capitis oculi minuti, nigri; & ante hos antennæ, non nihil abludentes a forma in hoc genere consueta; constant articulis tribus, ultimo apice crassiusculo. Primum *abdominis* segmentum (thorax) angustissimum, subrotundatum, sed postice dilatatum & vix sensibilibiter trilobum; hoc excipit segmentum aliud latius, sed brevius priore, tum abdomen reliquum ovatum. *Pedes*, qui omnes primis paulo ante dictis segmentis adfixi sunt, articulis tribus constant, quorum postremus oblique truncatus apice uncum insignem habet. Insectum satis pilosum, sed nulli, saltem quos ego vidissem, in articulis duobus abdominis primis, præsertim ad latera singulorum segmentorum reliquorum abdominis pili duo sublongiores adproximati. Color, ut in hoc genere consuetus est, albidus. In capite macula palpitans (cor) obscuriuscula, subcordata, & præterea lineæ duæ longitudinales. *Abdomen* fasciis novem obscurioribus transversis. *Enum.*

Bovis. 7. P. ( du taureau ) bovis tauri, *abdomine lineis transversis octo ferrugineis.*

*Fab.* 7.

*Faun. Fridr. n.* 803.

*Hab.* in bobus. Pellitur decocto ledi & fedi acris.

*Desc.* Totus albus, minimus. *Caput* testaceum. *Pedes* testacei, apice albidiores. *Abdomen* album, lineis octo testaceis transversis in dorso, quinque fasciis transversis in ventre, quæ omnes lineæ non tangunt marginem seu latera; latera tamen obscuriora reliquo corpore



five punctis octo ferrugineis notata.  
*Faun.* 1946.

Vituli. 8. P. ( du veau ) bovis tauri , abdomine plumbeo. \*

*Fab.* 8. abdomine acuminato plumbeo.

*Faun. Fridr. n.* 804.

*Hab. in* bobus cum præcedenti.

*Desc.* Præcedenti major. Abdomen ventricosum, acuminatum, cæruleo-fuscum. Pedes breves, crassi, grisei ut & caput & thorax grisea. *Faun.* 1947.

Equi. 9. P. ( du cheval ) equi caballi.

*Fab.* 9.

*Faun. Fridr. n.* 805.

*Hab. in* equis.

Asini. 10. P. ( de l'âne ) equi asini. †

*Fab.* 10. capite porrecto obtuso, abdomine ovato fusco striato.

*Alb. Aran.* 76. t. 51.

*Red. exp. t.* 22. f. 1.

— *Oper. t.* 25.

*Hab. in* asinis.

*Desc.* Pedes sex cheliformes.

Tinnunculi. 11. P. ( de crécerelle ) falconis tinnunculi. \*

*Red. exp. t.* 13.

*Frisch. inf.* 11. p. 24. t. 24.

*Fab.* 12. capite sagittato, pollice utrinque mucronato.

*Alb. Aran.* t. 43.

*Hab. in* falconibus, tinnunculis, milvis. Conferantur aliæ species in falconibus.

*Red. exp. t.* 1.

*Desc.* Inter omnium maximos pediculos, quos unquam vidi, hic erat. Corpus depressum, ovali-oblongum. Caput antice obtusum, versus aurium regionem

utrinque retrorsum obtuse sagittatum. *Thorax* marginatus fere ut in carabo seu cantharide. *Abdomen* in 9 sive 10 segmenta divisum, margine omnino integro, linea notato. *Palatum* prominens. Ungues solitarii, in vola manus spongiosum quid. *Femora* versus apicem introrsum quasi mutilata. *Faun.* 1949.

Corvi. 12. P. ( du corbeau ) corvi coracis. \*

*Fab.* 15. abdomine ovato, margine striato.

*De Geer* tom. 7. p. 76. t. 4. f. 11. ricinus cornicis albidus, fasciis dorsilibus transversis fuscis, antennis brevissimis ad apicem capitis.

*Geoff. inf. paris.* tom. 2. p. 600. n. 8. albo nigroque varius, abdomine ovato oblongo utrinque incisuris nigris.

*Red. exp.* t. 16. f. 2.

— *Oper.* t. 14.

*Faun. Fridr.* n. 806.

*Hab.* in corvis.

*Desc.* *Abdomen* ovali-oblongum, utrinque contractum, depressum, planum, cinereum, lineis ad incisuras duodecim vel decem nigris. *Collum* brevissimum. *Caput* minimum, nigrum. *Pedes* brevissimi. *Antennæ* brevissimæ, retrorsum flexæ. Substantia animalculi tenacissima, licet digitis validissimis pressum tamen vivacissimum & cursitans. *Faun.* 1950.

Infausti. 13. P. ( du merle de roche ) corvi infausti. \*

*Fab.* 17. thorace angustato, abdomine ovato pallido diaphano.

*Hab.* in corvo infausto.

*Desc.* *Abdomen* ovatum, gibbum, diaphanum, pallidum, utrinque ab basin

squamula veluti ala spuria notatum. *Thorax* angustissimus, brevis. *Caput* minimum, subrotundum, obtusum. *Oculi* nigri. *Antennæ* longitudine corporis, tenuissimæ, albæ. *Pedes* tenuissimi, satis longi. Magnitudo minimi pediculi capitis, valde tener, facile solo tactu conquassandus. *Faun.* 1951.

Picæ. 14. P. ( de la pie ) corvi picæ. †

*Fab.* 18. capite obtuso fusco, punctis quatuor nigris.

*Red. exp. t.* 5.

*Alb. Aran.* 76. t. 45.

*Geoff. inf. paris. tom.* 2. p. 603. n. 5.

*Hab. in* corvo pica.

Cygni. 15. P. ( du cygne ) anatis cygni. †

*Red. exp. t.* 8.

*Fab.* 21. capite emarginato, abdomine ovato, margine nigro striato.

*Alb. Aran.* 76. t. 58.

*Geoff. inf. paris. p.* 603. n. 9. abdomine ovato, utrinque tineis fuscis notato.

*Hab. in* cygno.

Conferatur. *Red. exp. t.* 9. f. 3.

Anseris. 16. P. ( des oies ) anatis anseris.

*Red. exp. t.* 10.

*Fab.* 22. filiformis pallidus, margine nigro punctato.

*Alb. Aran.* 76. t. 58.

*Geoff. inf. paris. p.* 603. n. 11. capite ovato, abdomine oblongo, incisuris utrinque maculatis.

*Hab. in* anseribus feris & mansuetis. Pel-litur pipere. *Fab.*

Moschatæ. 17. P. ( du canard musqué ) anatis moschatæ. †

*Red. exp. t. 9 f. 1.*

*Hab. in anate moschata.*

Querque- 18. P. ( de la farcelle ) anatis querque-  
dulæ. †

*Red. exp. t. 12.*

*Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 604. n. 15.*

*Hab. in querquedula.*

Sternæ. 19. P. ( de la mouette ) sternæ Hirundis. \*

*Red. exp. t. 9. f. 2.*

*Fab. 26. capite trigono , abdomine ovato pallido , dorso longitudinaliter nigricante.*

*De Geer tom. 7. p. 77. t. 4. f. 12.*

*ricinus lari griseo-albidus , oculis maculisque nigris , pedibus crassioribus.*

*Faun. Fridr. n. 808.*

*Hab. in sternis , laris.*

*Desc. Caput trigonum , latum , obtusum , pallidum. Thorax brevissimus , angustissimus. Abdomen ovatum , longitudine anterioris corporis , in medio longitudinaliter nigricans. Antennæ brevissimæ , capillares. Pedes brevissimi , crassi , quorum antici brevissimi sub capite. Abdomen subtus concavum. Faun. 1953.*

Plataleæ. 20. P. ) de la spatule ) plataleæ leuco-  
rodiæ. †

*Red. exp. t. 4.*

*Fab. 29. M.*

*Hab. in leucorodiis.*

Ardeæ. 21. P. ( du héron cendré ) ardeæ cineræ. †

*Red. exp. t. 6.*

*Fab. 30. M.*

---

(†) Signo crucis utique notavimus animalia nobis nec viva , nec in museis asservata visa , ut naturæ consulti ad ea attentius examinanda incitentur.

*Geoff. inf. paris. p. 603. n. 6.*

*Hab. in ardeis.*

Gruis. 22. P. ( de la grue ) ardeæ gruis.

*Frisch. inf. 5. p. 15. t. 4.*

*Fab. 27. abdomine subclavato pallido ,  
spiraculis niveis.*

*Red. exp. t. 3.*

— *oper. t. 19.*

*Hab. in gruibus.*

Ciconiæ. 23. P. ( de la cicogne ) ardeæ ciconiæ.

*Frisch. inf. 8. p. 9. t. 6.*

*Fab. 28. elongatus filiformis , abdomine  
albo , lateribus nigro punctatis.*

*Faun. Fridr. n. 809.*

*Scop. carn. fronte macula argentea ,  
maxillis tridentatis ? 1046 ?*

*Hab. in ciconiis.*

*Desc. Oblongus , albidus. Caput cordatum ,  
obtusum. Antennæ articulo terminali  
apice fusco. Oculi fusci. Maxillæ subtus  
fuscae. Abdomen albidum , ovatum. Scop.*

Charadrii. 24. P. ( du pluvier verd ) charadrii plu-  
vialis. †

*Red. exp. t. 9.*

*Fab. 33. M.*

*Hab. in pluvialibus.*

Fulicæ. 25. P. ( de la morelle ) fulicæ atræ. †

*Red. exp. t. 4.*

*Fab. 34. M.*

*Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 603. n. 4.*

*Scop. carn. n. 1044. capite rufo ano ;  
imprimis piloso , pilis parallelis.*

*Hab. in fulicis atris.*

Recurvi- 26. P. ( de l'avosette ) recurvirostræ avo-  
rostræ, settæ. \*



*It. Œl.* 90.

*Fab.* 29. oblongus fuscus, capite trigono canaliculato.

*Hab.* in recurvirostris.

*Desc.* Corpus fuscum, oblongum. Caput obsolete triangulum, acuminatum, linea transversali excavata in medio.

*Abdomen* oblongum, fere lineare in medio paullo latior, incisuris octo.

*Pedes* breves, curvi. *Antennæ* breves, parvæ, capitatae. *Faun.* 1956.

*Hæmatopi.* 27. P. ( de l'huitrier ) hæmatopi ostralegi. \*

*Fab.* 30. glaucus, thorace angustissimus, abdomine ovato, incisuris pallidis.

*Hab.* in hæmatopis.

*Desc.* Magnitudo pulicis. *Totus* glaucus.

*Caput* subrotundum, glaberrimum, convexo-planum. *Abdomen* obverse

ovatum, incisuris decem transversis, pallidis. *Pedes* breves. *Antennæ* brevissimæ. *Thorax* angustissimus. *Pili* ad

latera posterioris abdominis. *Faun.*

1957.

*Pavonis.* 28. P. ( du paon ) pavonis cristati. †

*Red. exp. t.* 15.

*Fab.* 31. capite globofo maximo, corpore pallido fuscoque striato.

*Alb. Aran.* 76. t. 47.

*Enum. n.* 1028

*Hab.* in pavonibus.

*Pediculus pavonis* *Syst.* non facile determinatur.

*Red. exp. t.* 15. *Linn. Fab.*

— *oper. t.* 23. *Fab.*

— *exper. t.* 1. f. 2. accipitris. *Geoff.*

— *opusc. tom.* 1. t. 14. *Schrank.*

*Inf. parif. tom.* 2. p. 60. n. 9. citavit solus *D. Fab.* descriptio tamen melea-

gridis pediculo convenit ; insuper hunc ultimum pediculum *Syst.* expresse enumeravit *D. Geoff.* inde synonymiam sequentem conservavi. V.

Meleagri- 29. P. ( du dindon ) meleagridis gallo-  
dis. pavonis. \*

*Red. exp. t. 22 ?*

*Fab. 32.* capite trigono obtuso, abdomine ovato griseo.

*Geoff. ins. paris. tom. 2. p. 620. n. 9.*

*Enum. n. 1029.*

*Faun. Fridr. n. 810.*

*Hab. in gallo-pavonibus.*

*Desc. Caput planum, antice rotundatum, postice dentato - angulatum, margine retrorsum subulatum. Thorax medio cordatus, utrinque angulatus. Abdomen griseum 8 vel 10 incisuris longitudinaliter in medio albis. Antennæ breves. Affinis pediculis caponis. Faun. 1958.*

*Ses antennes sont courtes. Sa tête est aplatie, arrondie sur le devant & forme par derriere des angles aigus, presque semblables à des dents pointues. Son ventre composé de huit ou neuf anneaux, est gris sur les côtés & blanc au milieu dans toute sa longueur. Geoff.*

*Obs.* Nescio an hæc species eadem cum illa quam ill. *Linn.* eodem nomine insignivit. Vir hic celeberrimus laudat pro suo insecto Entomologiæ in Germania facile parentem, celeberrimum *Frischium* : sed hic ipse doctissimo equiti contradicit, quem laudato loco delineat pediculum, in ciconiis occurrere adserens. Laudat & *Redii* iconem ; sed quam huic iconi dissimillimum insectum, quod hic descripturi sumus ? Si quis conjecturæ locus, gallina illa Affricana,

in qua diligentissimo *Redio* ibi delineatum insectum occurrit, non *meleagris gallo-pavo*, sed numida *meleagris* fuit. Cl. *Müllerus*, qui *Linnaei* *Systema naturæ*, quantum Zoologicum est, in Germanicam linguam transtulit, pediculum quendam, qui in *meleagride* habitat, delinavit; sed insectum illud, si tamen in hoc animali vivit (nam vir hic summus in parte Entomologica parum adcuratus est) multum a nostro diversum.

Huic *caput* antice rotundatum, postice sinuatum, sinu triplici; sinus utrinque dentem acutiusculum longum, & in medio duos alios formant. *Antennæ* moniliformes, satis longæ, dentes longiores setis tribus longis armantur. Ad capitis latera utrinque oculus obfcurus, & ante illum seta brevior. *Caput* corpori ope thoracis angusti rhombici jungitur, post quem thorax alter cordatus, cordis lobis acutis, abdomini apice incurbente. *Abdomen* segmentis octo instruitur, quorum primum thoraci secundo sujicitur, postremum apice profunde emarginatum, lobis lanceolatis. In nonnullis hujus species insectis in hac emarginatura membrum lanceolatum fuscum cernitur. Segmenta sex intermedia utroque latere macula introrsum oblonga fusca, & fasce setarum longiusculo ex setis sex constante instructa. *Pedes*, ut fere in reliquis speciebus, unco duplici terminantur. *Enum.*

Gallinæ. 30. P. ( de la poule ) phasian galli thorace capiteque utrinque mucronato. \*

Fab. 30.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 601. n. II.

*Enum. n.* 1030.

*Beytr. Zur. nat. p.* 114.

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p.* 1036.

*Hab. in gallinis domesticis. Expellitur pipere.*

*Desc. Pediculo vulgari minor. Corpus* pillis griseis adspersum. *Abdomen* oblongum, ovatum, 8 vel 9 incisuris. *Caput* lunatum, cruribus posteriora spectantibus. *Antennæ* brevissimæ. *Thorax* utrinque angulo acute recto mucronatus. *Faun.* 1959.

*Caponis, 31. P. ( du chapon ) phasiani galli abdominis margine nigro. \**

*Frisch. inf. 11. t.* 24.

*Red. exp. t.* 16. *f.* 1.

*Fab.* 35.

*Geoff. inf. parif. tom. 2. p.* 601. *n.* 10.

*Faun. Fridr. n.* 811.

*Hab. in gallis domesticis.*

*Desc. Magnitudo ovi pediculi humani ( seu lendis ). Corpus* depressum, caudam versus obtusum. *Abdominis* latera nigra, dorso albo diaphano; maculâ nigra versus caput, quæ cor transparens. *Caput* album. *Antennas* motitat. *Faun.* 1960.

*Tetraonis, 32. P. ( du coq de bruyere ) tetraonis tetricis. \**

*Red. exp. t.* 14. *pulex pavonis ?*

*Fab.* 42. *M.*

*Faun. Fridr. n.* 812.

*Hab. in tetraonibus.*

*Desc. Caput* semiovatum, postice truncato - marginatum, angulis posticis emarginato truncatis, antice rotundatum, supra planum. *Collum* lunatum. *Abdomen* postice pilosum, ovatum;

obtusum, margine ferrato, incisuris novem ferrugineis. *Antennæ* brevissimæ, obtusæ. *Faun.* 1961.

‡ *Iagopi.* 33. P. (de la gélinotte blanche) *tetraonis lagopi.* \*

*Fab.* 43. M.

*Hab.* in *lagopi.*

*Desc.* *Corpus* depressum, utrinque obtusum. *Abdomen* antice angustatum, postice dilatatum, figura fructus *bursæ pastoris* aut *veronicæ capsulæ*, cinctum margine nigro introrsum ferrato. *Caput* absque thorace notabili adfixum, utrinque obtusum, lateribus emarginatum. *Faun.* 1962.

*Columbæ.* 34. P. (du pigeon) *columbæ œnatis.* †

*Red. exp. t.* 2. f. 1.

*Fab.* 36. corpore filiformi, ferrugineo, postice clavato.

*Geoff. inf. paris. tom.* 2. p. 599. n. 7. oblongus filiformis, albicans, corporis lateribus utrinque ferrugineis.

*Alb. Aran. t.* 43.

*Enum. n.* 1031.

*Müll. Lin. Nat. cl. v.* p. 1037.

*Beytr. Zur. nat. p.* 114. 4. t. 5. f. 3.

*Hab.* in *columbis.*

*Desc.* *Antennæ* capitis fere longitudine.

*Caput* elongatum. *Abdomen* basi angustatum, luteo-albidum, striga fusca utrinque laterali. *Geoff.*

*Pari.* 35. P. (de la mésange) *pari majoris, cauda quadriseta.* †

*Frisch. inf.* 8. p. 9. t. 1. f. 5.

*Fab.* 38.

*Enum. n.* 1052.

*Beytr. Zur. nat. Acarus ovatus* subhya-



linus, nigricans, nudus, pedibus sub-  
æqualibus, omnibus physapodibus.

*Hab. in paris.*

*Obs. Pedes octo numerat Schrank. forte  
potius acarus.*

Hirundinis. 36. P. ( du martinet ) hirundinis apode  
*pallescens, abdomine obovato albo  
nigroque contaminato lateribus setosis,  
setis posticis majoribus. \**

*Fab. 40. pallescens, abdomine albo nigro  
maculato.*

*Hab. in hirundine apode.*

Farionis. 37. P. ( de la truite faumonée ) salmonis  
farionis. \*

*Hab. in salmone farione maris Norwegici.*

*Desc. Corpus album. Caput brevius,  
latius. Collare brevissimum. Thorax  
subquadratus. Abdomen ovatum, de-  
pressum. Pedes sex brevissimi. Supra  
caudam cylindri duo, corpore lon-  
giores; tuberculis obtekti. Faun. 1964.*

*Obs. Monoculi piscini videtur affinis ob  
corpora 2 cylindrica supra caudam. Syst.*

Apis. 38. P. ( de l'abeille ) apis. †

*Frisch. inf. 8. t. 16.*

*Fab. 42. filiformis, ferrugineus.*

*Hab. in apibus ad squamulam halterum.*

*Ex oper. D. de Geer.*

Fringillæ. 39. P. ( du pinçon ) ricinus *fringillæ* pal-  
lide fuscus, corpore oblongo margine  
nigro, capite magno, corniculis duobus  
obtusis flexibilibus.

*Hab. in fringillis.*

*Desc. Antennæ filiformes, articulis quin-  
que. Caput latum, depressum, postice*

emarginatum, antice porrectum, modo tumefactum, modo contractum. *Oculi* nigri hæmispherici. *Abdomen* incisuris octo aut novem, tenue, depressum.

*Emberizæ*. 40. P. ( du bruant ) ricinus *emberizæ* pallide fuscus, abdomine albescente, maculis lateralibus fuscis, capite magno triangulari.

*Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 599. n. 6.* subflavescens capite ovato, medio diaphano, macula fusca, lateribus punctato ferrugineis.

*Fab.* 37. pallide fuscus, abdomine albescente, maculis lateralibus fuscis, capite triangulo.

*Hab.* in emberizis.

*Desc.* *Antennæ* filiformes, articulis quinque. *Caput* fere trigonum, antice truncatum, postice utrinque tuberculo rotundato. *Oculi* nigri antennis inter & tuberculos positi. *Thorax* capite angustior, incisuris tribus. *Abdomen* longum, pilis albis longis, apice conicum. *Pedes anteriores* reliquis breviores.

*Mergi.* 41. P. ( du plongeon ) ricinus *mergi ferrati* albidus, capite flavescente, corpore elongato. t. II. f. 4.

*Hab.* in mergis ferratis.

*Desc.* *Antennæ* filiformes, articulis quinque. *Caput thoraxque* rufescentelutea. *Caput* magnum, elongatum, depressum. *Thorax* in duas partes divisus. *Abdomen* albescentis, lineolis nigricantibus lateralibus. *Pedes anteriores* brevissimi, sæpe sub capite occultati.

Canis.

Canis. 42. P. ( du chien ) ricinus *canis*, capite angulato flavescente, fusco punctato, abdomine ovato albido marginibus serrato, thorace brevissimo.

*Hab.* in canibus. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Pediculo *vulgari* minor. *Antennæ* filiformes. *Caput* latum, magnum, lateraliter emarginatum, fusco-luteum. *Thorax* capiti concolor. *Abdomen* ovatum, incisuris denticulatis pilosis uti totum insectum.

Gallinæ. 43. P. ( de la poule ) ricinus *gallinæ* albidus, abdomine ovato, capite semi-orbiculato, postice setis quatuor longioribus.

*Scop. carn. n.* 1037?

*Hab.* in gallinis. In Gallia Aust. V.

*Desc.* *Antennæ* caput æquant. *Caput* semicirculare, postice angulatum; pilis duobus nigris, longis utrinque. *Abdomen* ovatum depressum, laminis lateralibus clavatis notatum. *Pedes* breves, crassi. *Thorax* non distinguitur.

*Obs.* *Gallinæ* pediculo *Syst.* differt; thorax hujus distinctus & angulatus. V.

*Ex Entom. Carn.*

Hæmato- 44. P. ( de l'autour ) abdomine ovato albo; pus, margine pedibusque rubris.

*Fab.* 14.

*Hab.* in falcone palumbrio & strige ulula.

*Desc.* *Caput* subcordatum, obtusum, antice declive, nudum, splendens, spadiceo-fulvum. *Antennæ* mobiles, capiti concolores. *Abdomen* linea dorsali nigra utrinque.

*Obs.* In strige idem prorsus, sed dorsum absque macula nigra.

*Insect. Tomus IV.*

C

Maximus. 45. P. ( de la buse ) abdominis incisuris 9 marginatis, prope marginem punctatis.

*Fab. n. 13.* abdomine marginato, segmentis utrinque punctis duobus impressis.

*Hab. in falcone buteone.*

*Desc.* Fuscescens. *Caput* Subcordatum, antice truncatum, postice in medio macula fusco-ferruginea, antice ad apicem punctis duobus fuscis. *Thorax* subrotundatus, lævis, lineis tribus fuscis longitudinalibus, media ad marginem posticum non protensa. *Abdomen* lanceolatum marginatum, margine obscuriore, punctis duobus impressis prope marginem in singulis segmentis.

Dolichocephalus. 46. P. ( du loriot ) albus, capite longo.

*Fab. 19.* albus abdomine linea dorsali fusca.

*Hab. in coracia oriolo.*

*Desc.* Glaber totus. *Abdomen* subtus marginatum, supra linea fusca dorsali. *Pedes* antici breviores.

Fasciatus. 47. P. ( du coucou ) abdomine albido, fasciis fuscis.

*Fab. 20.* abdomine oblongo albido, fusco fasciato.

*Hab. in cuculo canoro.*

*Desc.* Oblongus, depressus, nitens, linea brevior. *Caput* cordatum, thorace latius. *Abdomen* pilis longis raris adspersum. *Pedes* æque diffiti, pallidi, anticis pallidioribus. *Oculi* fusci.

Ocellatus. 48. P. ( de la corneille ) abdomine maculis conicis lateralibus pallido puncto ocellatis fasciato.

*Fab.* 16. abdomine ovato pallido, maculis lateralibus nigris, pupilla alba.

*Hab.* copiosus in capite corvi coracis & cornicis.

*Desc.* Pilosus, lividus & albidus. *Caput* subcordatum, obtusiusculum, antice nitens. *Antennæ* quadrinodiæ, capite paullo breviores. *Oculi* nigri. *Pedes* nigro fasciati. *Ova* circa oculos corvi, in circulum disposita. Sub abdomine prope apicem, macula lanceolata transversa binis punctulis ocellata, rufa, uno latere plana, altero convexa.

*Auritus.* 49. P. ( l'auriculé ) ad basin antennæ singulæ nervulo auriforme.

*Hab.* in pico majore & martio.

*Desc.* *Caput* subcordatum, obtusum, dilute fulvum, *subtus* ad latera oris pilosum. *Antennæ* longitudine thoracis, valde mobiles. *Corpus* ovatum, lateribus albis. *Anus* fetosus. *Pedes* anticæ antennis breviores.

*Dentatus.* 50. P. ( du canard ) abdominis incisuris sex, lateribus dentatis.

*Hab.* in anate.

*Desc.* Fusco-ferrugineus. *Caput* subtri-lobum; latere postico singulo tripili. *Thorax* lateraliter acuminatus. *Femora* crassiuscula.

*Grassicor-* 51. P. ( du canard sauvage ) antennis crassis  
*nis.* pedum instar, pedibus mediis anticis fere duplo longioribus, posticis a reliquis remotioribus.

*Enum.* n. 1026 ?

*Red. opusc. physiol. col. tom. I. f. 10.* figura superior ?

*Hab.* in anate boschate.



*Desc.* Longus valde, albus, fere linearis. *Caput* oblongum obtusum, basi rotundatum. *Os* & *caput* rufa. *Abdomen* lanceolatum, capite quadruplo longius, segmento primo longiore, superne canali medio, seu sulco exaratum. *Pedes antici* posticis triplo breviores.

*Obs.* Descripsit hoc insectum præclarissimus *Redi*, ut videtur, delineavitque, sed minus accurate. Maximorum sui generis unus. *Caput* ovatum, antrorium angustius, extimo apice muris instar mistaces gerit; nullibi præterea pili videntur in toto capite. *Antennæ* ex articulis pluribus moniliformes, æquabiles. *Abdomen* elongatum & fere lineare; segmentum primum, quod cum secundo thoracis loco est, orbiculare, antice posticeque truncatum; secundum, cylindricum, longissimum, ita diaphanum uti manifeste transpareat segmentum tertium apici segmenti secundi insertum. Segmenta reliqua, quorum fere numerus septenarius est, breviora primo, sed, dempto ultimo, tantillo latiora; latere segmenti quarti, si prima duo in segmentis non numeres, incipiunt brevissimi pili in conspectum venire, ii que usque ad apicem continuantur. *Apex* acumine lanceolato instruitur. *Color* insecti albidus, linea a capite usque ad mucronem lanceolatum abdominis pallidiori decurrente. *Pedes* primorum duorum parium segmento primo, tertii paris segmento secundo inserti, constant partibus tribus, quarum prima brevis, secunda elongata cylindrica, tertia elongata cylindrica latere interno setis tribus & apice unco duplici armata. *Enum.*

Colymbi- 52. P. ( du grebe de riviere ) abdomine  
nus. ovato , macula elliptica nigra dorsali.

*Hab. in colymbo aurito.*

*Desc. Caput postice angulatum , angulis  
posticis obtusis. Adultus rufescit.*

Ovalis. 53. P. ( du courly ) abdominis segmentis  
octo , corpore depresso , ovato.

*Hab. in scolopace arcuata.*

*Desc. Pediculo humano minor. Antennæ  
capite breviores , thorace longiores.  
Color rufo-brunneus.*

funceus. 54. P. ( du vaneau ) thorace valde tenui  
ad initium abdominis.

*Hab. in tringa vanello.*

*Desc. Totus pallide brunneus , nitens.  
Caput margine subrubro , pubescente.  
Abdomen oblongum. Pedes primi a  
reliquis remotiores. Differt a pediculo  
crassicorni , quod brevior , pilosior ,  
magis fuscus & lucidior , quod pedes  
antici non tam remoti a reliquis , quod  
abdominis futuræ fere æquales inter  
se , denique quod antennæ non sin-  
pedibus anticis longiores.*

Cuspida- 55. P. ( du râle d'eau ) cuspidè recta ad basin  
tus. antennæ cujusque.

*Hab. in rallo aquatico.*

*Desc. Oblongus. Caput lucide rufum ,  
nitidulum , læve , antice attenuatum ,  
oblongum , depressum. Corporis latera  
pilosa. Pedes subæquali inter se dis-  
tantia ; ergo non idem cum pediculo  
ralli crectis. Linn.*

Bidentatus. 56. P. ( du ramier ) capite hemisphærico ,  
angulis posticis bifetis , thorace marginæ  
postice bidentato.

*Hab. in columba palumbo.*

*Desc. Caput* in medio foveam habet ;  
lucidum , thorace latius. *Abdomen*  
ovatum , albidum , depressum , mar-  
gine ciliatum. *Pedes* albi.

Albiven- 57. P. ( du roitelet ) capite rufo cordato ,  
tris. oculis fuscis , abdomine albo attenuato.

*Fab.* 39.

*Hab. in motacilla troglodyte.*

*Desc. Caput* nitens , læve. *Abdomen* sub-  
ovatum , latere ciliatum , supra con-  
vexum. An vere diversus pediculo  
*passerum*. Linn. ?

Rostratus. 58. P. ( du taupe-grillon ) abdomine &  
thorace hemisphaericis rubris , pedibus  
albis , rostro nigro inflexo.

*Fab.* 41. sanguineus , pedibus albis.

*Hab. in acheta grylotalpa.*

*Desc. Corpus* cinnaberinum. *Rostrum* non  
videtur nisi in obverso corpore , quod  
utrinque cavernosum est. *Pedes* postici  
a reliquis remoti sunt.

Coccineus. 59. P. ( des hémérobés ) corpore ovato cocci-  
neo , oculis fuscis , pedibus pallidioribus.

*Hab. in hemerobiis , musca cynipsea ,*  
*leptura melanura , phryganea bicaudata.*

*Desc. Corpus* ovatum , postice obtusum  
& villosulum ; antice puncta duo nigra.  
*Pedes* pallidiores , æque diffiti. *Situs*  
*quiescentis* vere singularis , infidet  
enim capiti pedesque retrorsum ex-  
tensos gerit , quorum numerus fena-  
rius genus indicat , licet habitu &  
figura *acaris* accedat.

Ceramby- 60. P. ( de l'abeille - violette ) antennis  
cinus. corpore longioribus.

*Hab. in api violacea.*

*Desc.* Albus, minutus, fegnis. *Corpus* ovale. *Antennæ* assiduo & lente mobiles. *Pedes* sex breves, pilosi, æque diffiti.

*Ex spec. D. Fab.*

Phasiani. 61. P. ( du faisan ) capite ovato magno, abdomine globoso obtuso.

*Red. oper. 1.*

*Hab. in phasiano motmot.*

*Desc.* *Corpus* medium. *Caput* magnum; ovatum, obtusum. *Thorax* brevissimus. *Abdomen* magnum, globosum.

*Ex Enum.*

Musculi. 62. P. ( des fouris ) muris musculi.

*Hab. in muris musculi* varietate alba; bulbis pilosis sese adfigit fortissime, ore in bulbum inserto.

*Desc.* Minimus, ac quem lente destitutus vix reperias, albus, lentissimus. *Corpus* ovatum lobatum. *Thorax* magnus, postice in lobos duos magnos uberiformes divisus. Reliqua *abdominis* segmenta, quæ mox leves in lateribus sinus, mox magnos anum versus curvatos dentes efformant; thorace angustiora, postremo fere rhomboide, in ejusque apice setæ duæ divergentes, longitudine corporis totius. Antice in loco capitis, in medio *corpusculum* lanceolatum, acutum; in cujus utroque latere *corpus* forcipiforme; corpus hoc basi angustius, apice nonnihil latius, latere interiori pollice fixo brevi, latere vero exteriori unco mobili instructum; si uncus iste apertus sit, postest enim insectum ejus apicem pro-

lubitu pollicis fixo admovere, non inepte cultros hortulanorum purgandis noxiis furculis inservientium refert. Hoc maxime instrumento sese infectum istud muris pilis adfigit. Pilis corpus fere desituitur; in unco mox dicto breves sunt. *Totum* infectum adprime diaphanum, intestinis nullis visibilibus, corde excepto, quod in medio thorace conspicitur palpitare maculamque obscuriusculam constituit. *Antennæ* nullæ. Nec oculos vidi. *Enum.*

*Observavit* Cl. Goeze post ill. D. Geer, acaros nondum adultos pedibus tantum sex instruit; an ergo præsens animal acarus? sed cum pedes acarorum miris modis variant variasque in variis speciebus figuras repræsentent, quid, si putemus uncus illos falcatos pedes esse? Quidquid sit, rostrum acari est, *corpus* papillosum *thoraxque* pediculi. *Enum.*

*Ortygome*. 63. P. ( du roi de caille ) ralli crex.  
træ.

*Hab.* in rallo crex dicto.

*Desc.* Infectum oblongum. *Caput* cordatum, parte acuminata ab abdomine averfa. *Antennæ* breves, moniliformes. *Thorax* angustus, longus, apice latior, apicis medio productiore. *Abdominis* segmenta, demto thorace, octo setosa, utrinque spiraculis magnis maculatis instructa. *Pedes* thoraci affixi, articulis tribus elliptoidibus constant, articulo tertio acuto breviori. In capite varia transparent intestina, ejusque apices utrinque setam longiusculam emittunt. *Enum.*

*Alaudæ*. 64. P. ( de l'alouette des champs ) *alaudæ* arvensis.



*Beytr. Zur. nat. p. 115.*

*Hab. in alauda arvensi.*

Curvirof- 65. P. ( du bec croisé ) loxiæ curvirostræ.  
træ.

*Beytr. Zur. nat. p. 117.*

*Hab. in loxia curvirostra.*

Chloridis. 66. P. ( du verdier ) loxiæ chloridis.

*Beytr. Zur. nat. p. 118.*

*Hab. in loxia chloride.*

Citrinellæ. 67. P. ( de l'ortolan ) imberizæ citrinellæ.

*Beytr. Zur. nat. p. 116.*

*Hab. in imberiza citrinella.*

Curruçæ. 68. P. ( de la fauvette babillarde ) mota-  
cillæ curruçæ.

*Beytr. Zur. nat. p. 113.*

*Hab. in motacilla curruça.*

Rubeculæ. 69. P. ( de la rouge - gorge ) motacillæ  
rubeculæ.

*Beytr. Zur. nat. p. 115.*

*Hab. in motacilla rubecula.*

*Ex oper. D. de Geer.*

Humanus 70. P. ( de la tête ) cinereus, thorace  
capitis. abdomineque fascia interrupta nigra  
marginatis.

*Obs.* An species propria? An P. humano  
species diversa. Uterque prodigiose  
multiplicatur; duæ enim pediculi fœ-  
minæ sobolem ultra decem millia per  
hebdomadas octo propagatam vident.



## GENUS V.

PULEX. *Pedes* VI saltatorii.

*Oculi* II.

*Antennæ* filiformes.

*Os* rostro inflexo, setaceo, aculeum recondente.

*Abdomen* compressum.

Irritans. 1. P. ( la puce ) proboscide corpore brevior. \* t. II. f. 5.

*Scop. carn.* 1055.

*Raj. inf.* 7.

*Alb. man. t.* 41.

*Bonan. micr. f.* 56.

*Anon. Angl. p.* 204. f. 12.

*Hook. microgr.*

*Joblot. micr. I. pp. I. p.* 3.

*Frisch. inf. II. p.* 8.

*Vallisn. oper. I. t. 25. f. I.*

*Leuwenb. epist. 76. f. I.-20.*

*Baker. micr. t. 13. f. 6.*

*Lederm. micr. 4. t. 20.*

*Sulz. inf. t. 22. f. 146.*

*Schæff. elem. t. 105.*

*Fab. I. rostro corpore brevior.*

*Geoff. tom. 2. p. 616. n. I. t. 20. f. 4.*

*De Geer tom. 7. p. 8. n. I. t. I. f. I.-4.*

*vulgaris castaneus nitidus, proboscide corpore breviori.*

*Adam. microgr. t. 27. n. 158.*

*Raf. inf. 2. musc. & cul. t. 2, 3, 4.*

*Enum. n. 1040.*

*Faun. Fridr. n. 813.*

*Hab. ubique in Europa, in America.*

*Kalm. pellitur satureja, pulegio.*


*perficaria*, *cotula*, *alno*. *Oves* eo destituuntur; *lepores* maxime obnoxii ideoque ramento vestimenti *leporini* capitur & avertitur a *Dalekarlis*.

Larva *apoda*, *cauda bifurca*, *net*. Pupa, *pedata*, *immobilis*. Mas sub *fœmina* jungitur, *affinis hemipteris*.

*Desc.* *Antennæ* fere *filiformes*, *capite* vix *longiores*. *Caput* *circulare*, *lateraliter depressum*. *Oculi* in *cavitate laterali* positi. *Corpus* *incisuris plurimis*, quarum *prima thoracis locum tenet*. *Pedes anteriores* *capiti ligati*, quod huic insecto *proprium*. *D. de Geer*.

*Obs.* 1. Larva *apoda* erravit igitur *D. Geoff.* in *nidis*, imprimis *columbarum*, frequentissima. Ex ovo ad statum perfectum dies *viginti quatuor* tempore *æstivo*. Ad *metamorphosin* terra eget, inde in *sordidis cubiculis* abundat. *V.*

*Obs.* 2. Vidit etiam *D. Scop.* in *tuguriis* *pastorum summis in Alpibus*. Extirpatur *frequenti scopatione*, *foliis alni eorumque decocto*, *lavando sæpe strata cubilium & lectorum lixivio cinerum saturatione*. Vidit etiam in *sciuris*, sed *sciurorum pulex longior, gracilior, attentis proportionibus*.



## G E N U S VI.

ACARUS. *Pedes* VIII.*Oculi* II ad latera capitis.*Tentacula* duo, articulata, pediformia.Elephanti- 1. A. ( l'éléphant ) orbicularis depressus,  
nus. macula baseos ovata.*Fab.* 1.*Enum. n.* 1041.*Beytr. Zur. nat.* 128: 29. t. 6. f. 14, 15.  
ovatus, macula baseos nigra, tri-  
loba, utrinque sulcis tribus longitu-  
dinalibus.*Müll. Lin. Nat. cl.* v. p. 1044.*Pall. spicil. Zool.* 9. 43. f. 12. an dis-  
tinctus?*Hab.* in India. In testudine orbiculari.  
*Schrank.**Magnitudo seminis lupini albi, depressus,*  
*lividus, margine crasso, subtus utrin-*  
*que 3 sulcis. Macula baseos nigra*  
*ovata, trifida.*Enumeratus inter insecta Austriæ loco  
citato. V.Reduvius. 2. A. ( la reduve ) obovatus planus, macula  
baseos obovata.*It. Oeland.* 62. 126.*Raj. inf.* 9.*Fab.* 3.*De Geer tom.* 7. p. 101. n. 5. t. 6.  
f. 1. - 3. obovatus planus, corpore  
antice clypeo nigro rotundo, pedibus  
nigris.*Frish. inf.* t. 19.

*Enum. n.* 1043.

*Hab.* in bobus, canibus, in sylvis.

*Desc.* *Corpus* depressum, magnitudine cimicis lectularii. *Abdomen* in dorso anterieus macula ovata, in medio pallida, cincta fuscedine strias retrorsum emittente.

*Obs. 1.* Variat colore: semper depressus & planus margine laterali prominente.

*Faun.* 1966.

*Obs. 2.* Lentus, cimici lectulario similis & concolor. *Corpus* depressum. *Pedes omnes* æquales, non crassi, articulis multis compositi apiceque pulvillo instructi ex quo unguis duo minuti prominent. Descripsimus in alio opere acaros quosdam pedibus apice vesicula instructis præditos; credibile est, vesiculas illas pulvillos esse unguiculis subtilissimis armatos, sed unguiculis eo minus utique visibilibus, cum ii in hac gigantea specie tam exigui sint. *Rostrum* breve, cui *antennæ* clavatæ adplicantur. *Color* nonnihil variat. *Alia* specimina basi macula cinerea & per reliquum corpus minutioribus aliis notata sunt; alia basi macula nulla, sed *corpus* totum ex fusco-testaceo cinereum, maculis quibusdam lineolisque nigris sparsis. Et hæc quidem nudo oculo videntur. Ad lentem puncta excavata sparsa comparent; *abdomen* antice crenatum, ex qua crena *rostrum* & *antennæ* prodeunt. Lineæ præterea duæ excavatæ divergentes in basi lateraque totius *abdominis* margine supra subtusque introrsum denticulato cincta. *Oculi* anusque etiam microscopio sese subducunt, *Enum.*



**Ricinus. 3. A.** ( la tique des chiens ) globoso-ovatus, macula bascos rotunda, antennis clavatis. \*

*Scop. carn.* 1057.

*Aldr. inf.* 550.

*Raj. inf.* 10.

*Frisch. inf.* 5. t. 19.

*Fab.* 2.

*De Geer tom.* 7. p. 98. n. 4. t. 5. f. 16.-19; acarus ricinoides violaceo-niger, capite pedibusque fuscis, corpore globoso-ovato.

*Geoff. inf. paris. tom.* 2. p. 621. n. 1. lividus, antennis brevibus subclavatis, abdomine antice macula ovata fusca nitente.

*Enum. n.* 1042.

*Faun. Fridr. n.* 814.

*Hab.* in bobus, canibus. In canibus venaticis; etiam alia animalia diutius in sylvis morantia, ac per dumeta ambulantia infestat, ipsum adeo hominem.

*Enum.*

*Desc.* Corpus ovato-globosum, luteo-albidum, macula nigra rotunda ad basin abdominis in tergo. Anus infra abdomen. Thorax vix conspicuus. Caput minimum. Os bifidum. Caput & pedes nigri. Antennæ clavatæ, longitudine rostri. *Faun.* 1967.

*Obs.* Rostrum dentatum s. ferratum, inde canum pelli firma adhæsiō. Satiata lendis volumen æquat. Pedes vesicula flexibili terminati.

**Crassipes. 4. A.** ( la crassipede ) pedibus secundariis crassissimis. \*

*Fab.* 14.

*Enum. n.* 1049. corpore toto testaceo.

*Beytr. Zur. nat. p.* 123. 23. t. 6. f. 4.

*Faun. Fridr. n. 816.*

*Hab. in Europa. Sub ollis hortulanorum, podurarum focius. Enum.*

*Desc.* Magnitudo minoris pulicis. Color totius corporis castaneus. Femora secundi paris monstrose crassa, cheliformia, desinente tamen chela in tenuem pedem reliquis similem; hinc pes secundi paris juxta basin & femur valde crassus, quatuor denticulis sive ramis aut spinis armatus; apex *chela* flexilis est, ut eo melius apprehendat; hoc pede tamen non incedit.

*Obs.* Huic ad anum adhærentem reperi alium acarum, *castanei coloris*, *minimum*, *testudinarium* sive depresso, margine undique acuto, pedibus brevissimis, æqualibus adeoque forte diversæ speciei, ni singularem aliquam metamorphosin fubeat. *Faun. 1969.*

Vespertilio-5. A. ( des chauve-souris ) thorace angulato - cruciato, pedibus unguiculatis, corpore longioribus.

*Scop. carn. 1058. acarus vespertilionis.*

*Frisch. inf. 7. t. 7.*

*Fab. 15.*

*Hab. in vespertilione murino, insolitæ figuræ, phalangio similis, in plano non procedere videtur, haud a sequenti diversus. In Gallia Aust. V.*

*Desc.* Corpus rotundatum. Pedes æque distiti, apice obtusi. *Scop.*

Passerinus. 6. A. ( des moineaux ) femoribus tertiis crassissimis. \*

*Red. viv. t. 2. f. 4.*

*Geoff. paris. 2. p. 627. acarus vespertilionis.*

*Baker. micr. t. 15. pediculus vespertilionis.*

*Fab.* 16.

*De Geer tom.* 7. *p.* 109. *n.* 7. pedibus  
tertii paris magnis & crassissimis. *t.* 6.  
*f.* 12.

— *Ad. Stockh.* 1740. *p.* 341. *t.* 1. *f.* 2.  
*Enum.* *n.* 1059.

*Beytr. Zur. nat.* *p.* 7.

*Müll. Lin. Nat. cl.* v. *p.* 1048.

*Hab.* in passeribus variis. In fringilla  
montifringilla. *Enum.*

*Conf.* acarum *vespertilionis*.

*Obs.* An *D. Geoff.* *tom.* 2. *p.* 627.  
*n.* 14? V.

*Desc.* Est minimus, punctum nigrum in  
dorso. *Pedes* tertii paris magni; *femora*  
enim hujus ambo simul mole ipsum  
corpus fere adæquant, reliquis mini-  
mis: his monstrosi pedibus non ince-  
dit, sed modo sese adfigit pennis  
vivacissimæ & agilissimæ avis, ne  
excutiatur, vide plura in actis *Stockh.*  
*L. C.* Hunc male delineavit *Red.*  
egregie vero *D. de Geer. Faun.* 1970.

**Motatorius.** 7. A. (la mobile) pedibus primis longis-  
simis motatoriis. \*

*Fab.* 17.

*Faun. Fridr.* *n.* 817.

*Schrank. Beytr.* 8. 4. *t.* 1. *f.* 8, 9. acarus  
rufus, pedibus primi paris longissimis,  
abdomine postice crenato.

*Hab.* in umbrosis. In fungis agilis, pe-  
dibus anticis vibrans. *Fab.*

*Desc.* Magnitudo lendis. *Color* cereus,  
exalbidus vel subflavus. *Pedes ante-*  
*riores* longissimi, hos erigit sæpe  
inter cursitandum & motitat instar  
antennarum, suntque hi corpore lon-  
giores & reliquis pedibus pallidiores.  
*Faun.* 1071.

Aphidioides.

Aphidioi- 8. A. ( l'aphidioïde ) pedibus primis longioribus curforiis, abdomine postice bicorni. \*

*Fab.* 19.

*Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 625. n. 102*  
petrarum ruber, pedibus anticis longitudine corporis.

*Enum. n. 1081.*

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1048.*

*Hab. in Europa. In plantis variis putrescentibus. Gregarius. Enum.*

*Desc.* Parvus ruber. *Pedes* primi parvis reliquis longiores, quos non erigit, sed iis uti reliquis currit. *Abdomen* postice duobus corniculis instructum uti aphidum. *Faun.* 1972.

Coleoptra- 9. A. ( la coléoptère ) ater, lateribus nigro-  
tus, subcoleoptratis. \*

*Fab.* 18. ater, lateribus angulato-  
acutis.

*De Geer tom. 7. p. 133. n. 20. t. 8. f. 6.*  
*marginatus* ovatus, crustaceus, fusco-  
castaneus, nitidus, corporis lateribus  
margine plano angulato.

*Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 626. n. 12.*  
ater, lateribus abdominis antrorsum  
acutis.

*Enum. n. 1069.* integumento coleoptrato  
anguloso.

*Beytr. Zur. nat. p. 12.*

*Hab. in Europa, sub arborum cortice.*

*Desc.* Minimus est, magnitudine vix se-  
minis papaveris, octo pedibus, dorso  
glabro nitido. Latera versus caput acuta  
quasi coleoptra brevia nigra; hinc  
*abdomen* caput respiciens, quasi an-  
trorsum bicornis & ad latera auctum  
membranula nigra, non tamen mobili  
ut in coleoptratis. *Faun.* 1973.

*Telarius*. 10. A. ( la tisserand ) rubicundo hyalinus ;  
abdomine utrinque macula fusca.

*Scop. carn.* 1075.

*Geoff. parif.* 2. p. 629. acarus fuscus  
autumnalis textor.

*Fab.* 20.

*De Geer tom.* 7. p. 128. n. 18. t. 7.  
f. 20.-24.

*Enum.* n. 1077. elliptoideus , pedibus  
secundis tertiisque distantibus.

*Beytr. Zur. nat.* p. 35.

*Hab.* in Europæ plantis , minus ventis  
expositis , caldario inclusis , tela ducens  
filis parallelis , quibus plantas suffocat  
hybernaculorum ; in tiliæ foliis averfis  
autumno frequens.

*Desc.* Nudis oculis vix conspicuus. *Totus*  
hyalini coloris , utroque latere ferru-  
gineo.

*Obs.* Nent ut araneæ , foliorum superfi-  
ciem seta velant , inde foliorum defsi-  
catio. Vento raptæ setæ errant , inquit  
*D. Geoff.* sed in his setis vagabundis  
araneæ sæpe reperiuntur harum setarum  
textores. *D. de Geer.* V.

*Siro.* 11. A. ( de la farine ) lateribus sublobatis ,  
pedibus quatuor posticis longissimis ,  
femoribus capiteque ferrugineis , abdo-  
mine setoso.

*Blank. inf.* t. 14. f. A. B.

*Lederm. micr.* 68. t. 33. f. 2.

*Bonan. micr.* f. 112.

*Leuw. epist.* 77. t. 370. f. 9 , 10.

*E. N. C. dec.* 2. ann. 10. ap. 34.

*Fab.* 21.

*De Géer tom.* 7. p. 97. n. 3. t. 5. f. 15.  
oblongus albus , capite rufescente ,  
pedibus conicis , crassioribus æqualibus.

*Enum.* n. 1056.



*Hab.* in caseo, farinaque Europæ, Americæ. In Gallia Aust. V.

*Inter sirones farinæ, scabiei, phthiæcos, hemitritæi vix etiamnum reperiri alias differentias, quam a loco petitas.* Amæn. acad. 3. p. 333.

*Desc.* Minimus, magnitudine vix lendis; subrotundus, capite vix conspicuo, ore, ut & pedibus rufis sive testaceis. *Abdomen* ovatum, hyalinum, in dorso duplici linea lunari s. pari linearum fuscarum recurvatarum notatum & quasi lobo utrinque. *Faun.* 1975.

Lactis. 12. A. ( du lait ) abdomine ovato obtuso postice setis quatuor longitudine corporis declinatis.

*Fab.* 23.

*Hab.* in lactis cremore antiquo & in lactis vasis.

*Desc.* Corpus hyalinum, postice valde obtusum, setis 4, quæ sub incessu repunt. Rostrum pedesque subtestacea.

Dysentericæ. 13. A. ( la dyssentérique ) pedibus setis duabus, abdominis ovati postica parte setis quatuor longitudine corporis horizontalibus.

*Fab.* 24.

*Enum. n.* 1051.

*Hab.* in doliis cerevisia acida infectis; imprimis in stillicidio siphonis vasis; sæpe in cantharis ligneis ad rimas æstate, obambulans ab hora 10 noctis in diei 10 supra cerevisiam, ceterum latitans sub cerevisia in rimis. *Amæn. acad.* 57. p. 97.

Corpus hyalinum. Pedes singuli postice armati duobus pilis, altero in medio, altero ad plantam, Abdomen ovatum,

glabrum, terminatum setis 4 corpore  
fere longioribus distantibus, 2 supe-  
rioribus, 2 inferioribus.

Obs. Præsens insectum cum acaro *D. Schrank.* convenit, sed differt defectu  
setæ, quæ apici pedum infideat, quam  
nulla arte *D. Schrank.* videre potuit.  
Juniores hujus speciei acari hexapi  
sunt. *Enum.*

Exulcerans. 14. A. ( de la gale ) pedibus longissimis  
setaceis, anticis duobus brevibus.  
*t. 11. f. 6.*

*Fab. 22.* albus, pedibus rufescentibus ;  
posticis quatuor seta longissima ?

*De Geer tom. 7. p. 94. n. 2. t. 5. f. 12.-15.*  
acarus scabiei, subrotundus albus,  
pedibus rufescentibus brevibus, posticis  
quatuor seta longissima, plantis quatuor  
anticis fistulatis capitulo terminatis.

*Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 622. n. 2.*

*Baker. microscop. chap. 18. p. 193. t. 13.*  
*f. 2. a, b, c.*

*AÆ. Angl. abbr. 5. 197. 283. t. 9. f. 127.*

*Bonan. microsc. 113.*

*Rivin. prur. 18. f. A. B.*

*AÆ. Lips. 1682. p. 319.*

*Allen. comp. xi. 8.*

*Hab. in scabie ferina.* Sub cute hominis  
scabiem cauflans, ubi vesiculum exci-  
tavit, parum recedit, corporis rugas  
fecutus, quiescit iterum & titillationem  
excitat; nudis oculis sub cuticula de-  
litescens observatur ab assueto, acu  
facile eximitur, ungui impositus vix  
movetur, si vero oris calido halitu  
affietur, agilis in ungue cursitat.

Obs. Acaro *sirone* minor & distinctus &  
forte acaro *exulcerante* non diversus.  
*Fab.*

*Desc.* Albus diaphanus. Corpus rotundatum, scabrum, nigro non lineatum uti acarus *firo*.

*Obs.* 1. In Fauna Suec. edit. 1. acarum *farinæ* & *scabiei* separaverat *Linnæus*, postea conjunxit, sed *DD. Geoff. Fab. de Geer* pro diversis speciebus rite habuerunt; ergo vere distincti. V.

*Obs.* 2. Scabiei certe hic acarus causa est. In Encyclopedia parisi. edit. 1. legitur : On peut, sans manquer à la Médecine ne pas se déclarer partisan de cette opinion, & regarder la gale comme une indisposition de la peau, par l'altération de l'humeur des glandes de cette partie, dont le vice se communique bientôt à toute la masse du sang. L'humeur cutanée peut être viciée par contagion en couchant avec un galeux ou dans le même lit où il a couché : on a même des exemples de personnes qui ont gagné la gale, parce que leur linge avoit été lavé avec celui d'un galeux. tom. 7. art. Gale. Phenomena quæ Entomologorum opinionem confirmarent, etiam si insectum visum non fuerat. V.

**Genicula-** 15. A. ( la géniculée ) niger, femorum geniculis subglobosis.

*Fab.* 25.

*Enum.* n. 1071. femoribus omnibus clavatis.

*Beytr. Zur. nat.* p. 126.

*Hab.* in arborum ramis emortuis, subcorticibus, in foliis abietis pinique.

**Aquaticus.** 16. A. ( l'aquatique ) abdomine sanguineo, depresso, tomentoso, postice obtuso.

*Geoff. parisi.* 2. p. 625. n. 8.

*Frisch. inf. 8. t. 3.*

*Ræf. suppl. 1. t. 25.*

*Sulz. inf. t. 22. f. 147.*

*Fab. trombidium 7.*

*De Geer tom. 7. p. 141. n. 24 t. 9.*  
f. 4.-6, forte t. 9. f. 7.-10. aquaticus  
ruber, corpore subglobofo, tentaculis  
longis, pedibus approximatis.

*Pod. gr. p. 121.*

*Enum. n. 1063.*

*Beytr. Zur. nat. p. 12.*

*Faun. Fridr. n. 818.*

*Hab. in Europæ aquis dulcibus, velociter  
natans, ova rubra in nepis ponens.*

*Desc. Corpus ovatum, parum in dorso  
depressum, coccineum. Faun. 1978.*

*Obs. 1. Pedes ut araneorum pedes abdo-  
mini adfixi. D. de Geer.*

*Obs. 2. Dantur aquaticorum acarorum  
plurimæ species a D. de Geer. obser-  
vatae, ut infra videbitur; sed quod  
fere incredibile, hujus speciei ova,  
teste eodem Entomologo, crescunt  
succumque animalis sugunt. V.*

Holoseri- 17. A. ( la fatinée ) abdomine sanguineo,  
ceus, depresso, tomentoso, postice retuso.

*Scop. carn. 1068.*

*Geoff. paris. 2. p. 624. n. 7.*

*It. Øl. 84.*

*List. Aran. f. 38.*

*Ræf. inf. 41. n. 38.*

*Blank. inf. t. 14. f. J.*

*Fab. trombidium 2.*

Acari minimi insectorum, fertilitate immensa ubicumque obvi, plu-  
rium calamitatum causæ sunt.

M. A. C. D. gallus Système d'un Médecin Anglois Paris. 1726.  
8 mala sapiens effluxit integram centuriam acarorum, ridens  
contagia, posteris ipse ridendus.



*De Geer tom. 7. p. 136. n. 22. t. 8.  
f. 14. - 17. terrestris ruber, ovatus,  
depressus, rugoso-tomentosus, pedibus  
posticis remotis.*

*Faun. Fridr. n. 819.*

*Enum. n. 1064.*

*Pod. gr. p. 121.*

*Müll. Lin. Nat. el. v. p. 1034.*

*Hab. in Europæ & Americæ siccis. In  
aqua perit.*

*Desc.* Præcedenti quam ovum ovo simili-  
lior. *Totus* ruber, holosericeus & cocci-  
neus. *Caput* minimum : *oculi* duo.  
*Pedes* utrinque quatuor multis articulis.  
*Abdomen* magnum, depressum, pone  
& lateribus gibbum, postice sulcatum.  
Magnitudo antecedentis. *Palpi* duo  
apice desinentes in unguem & articu-  
lum ovatum. *Faun.* 1979.

*Obs.* Ill. *Linnaeus* acarum hunc des-  
cripturus eum priori plane similem  
dicit, *simillimus præcedenti* ; idem jam  
in *Fauna* sua dixerat de eodem, *præ-  
cedenti quam ovum ovo similior*. Etiam  
celeberrimus *Scopoli* tantum inter utrum-  
que differentię non statuit ; & quam  
ponit, a re, quæ plerumque abest,  
& tantum in junioribus obtinet, de-  
sumit ; ab aquatico, teste viro hoc  
clarissimo, differt *lateribus pectoris  
cinereo veluti colore tinctis*. Sed vereor  
ne uterque Vir clarissimus, dum ita  
loquitur, non parum hallucinetur.  
Ab ipso *Linnaeo* non pauca insecta ut  
omnino sufficienter distinctę species  
enumerantur, quæ multo magis sibi  
invicem similes sunt, quam acari *holo-  
sericeus aquaticus*que. Data partium des-  
criptione brevem utriusque dabimus  
comparationem.



Major præcedentibus, ac fere magnitudine acari *ricini*. Corpus rotundatum antice latius, subtruncatum, postice emarginatum, lateribus leviter sinuatum; *totum* lamellis rubris minutis pilorum loco iisque erectis vestitum, hinc insecto byssi rubri facies. *Pedes* utcumque longi, dense pilis seu lamellis rubris tecti, articulis sex constant; extremo articulo unguis duplex infixus est. Novit infedum hunc unguem retrahere, uti feles suum apicesque pedum crassiores reddere.

*Antennæ* seu potius tubi suctorii articulis quinque constant; ab insecto deorsum inflectuntur. Illud in illis singulare, quod articulo eorum tubulorum tertio subtus corpus ovatum rubrum affixum sit.

## C O M P A R A T I O.

*A. Aquaticus.*

*A. Holofericeus.*

*Hab.* in aqua pura.

*Hab.* in terra, ac præsertim in humo nigra.

Natat celeriter.

Incedit lente; in vitro prorsus nescit ingredi.

*Pedes* natatorii.

*Pedes* ambulatorii.

*Oculi* duo nigri.

*Oculi* nulli visibiles.

*Antennæ* sine adpendiculo.

*Antennæ* adpendiculatæ.

*Corpus* globosum, læve, levissime depresso.

*Corpus* sinuatum, supra depresso, postice profunde emarginatum.

Habitat in terra, plerumque solitarius; primo vere, si terram vertas, passim,

sed fere semper solitarius occurrit.  
Clarissimus *D. Scopoli* unica vice  
gregarium deprehendit.

Color coccineus; incessus lentus; victus  
cadavera minuta putrescentia.

Varietas: pedibus longioribus, colore  
fuliginose rubro.

Visa hæc varietas Viennæ ad radices  
arborum verno tempore inter folia  
congesta; celeriter currit, cum prior  
lente gradiatur; vivit gregaria, cum  
prior solitaria. An vere varietas tan-  
tum. *Enum.*

Baccarum. 18. A. (des baies) abdomine discento rubro,  
lateribus obscurioribus. \*

*Scop. carn.* 1074.

*Fab.* 26.

*Schæff. icon.* t. 27. f. 1.

*Enum. n.* 1066. ovatus ruber, pedibus  
æqualibus verticillato-setosis.

*Beytr. Zur. nat. p.* 34.

*Hab.* in baccis ribis aliisque frequenter  
cursitans.

*Desc.* Præcedentibus multoties minor:  
minime dorso depresso, nec rugosus,  
nec sericeus s. villosus, sed glaber &  
undique tumidus. Punctum obscurum  
utrinque ad thoracem. Pili hinc inde  
enati. *Faun.* 1980.

Muscarum. 19. A. (des mouches) abdomine rufo;  
pedibus posticis longissimis filiformibus.

*Geoff. paris.* 2. p. 624. n. 6.

*Fab.* 28.

*De Geer tom.* 7. p. 114. n. 10. t. 7.  
f. 1.-3.

*Hab.* in muscis.

*Desc.* Rubellus. Corpus ovatum. Pedes  
quatuor primi crassiusculi, articulis

plurimis : *posteriores* filiformes , longissimi ; *omnes* pilosi. Ante rostrum pili duo longiusculi. *D. de Geer.*

Gymnopte-20. A. (des gymnopteres) abdomine rubro , lateribus punctis binis coccineis.

*Reaumi. inf. 5. t. 38. f. 1.-3.*

*Fab. 29.*

*De Geer tom. 7. p. 119. n. 14. t. 7. f. 9. - 11. acarus libellulæ globosus ruber , pedibus brevissimis , stigmate dorsali concavo.*

*Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 623. n. 5. ruber , punctorum coccineorum utrinque pari.*

*Faun. Fridr. n. 820.*

*Enum n. 1083? coccineus , corpore papilloso , pollice fetis aliquot , pedibus sex.*

*Hab. in apibus aliisque.*

*Desc.* Ruber , minimus , ut *oculi & pedes* nudo oculo distingui nequeant. *Abdomen* globosum , læte rubrum , pilis quibusdam hispidum. In anteriore abdominis parte , ad latera , utrinque par punctorum obscurius rubrorum , quorum punctum alterum anterius , alterum posterius. *Faun. 1082.*

*Obs. 1.* Pedes cum ætate explicantur , inde modo quatuor , modo sex , denique octo numerantur. V.

*Obs. 2.* Ex corporis formæ variatione à *D. Schrank.* observata , natum fuit synonymiæ dubium. Ea enim *D. de Geer.* incognita. V.

*Obs. 3.* Corpus oblongo-ovatum , illud privum habet , quod latera varie sinuare possit , unde , cum hoc facit , circumferentiam lobatam nanciscitur. Hinc inde ad latera corporis verrucæ niten-

tes minutissimæ. Pili fere nulli, vix lobus abdominis seu corporis quivis pilo unico instruitur; postice pili tres quatuorve longiores. *Pedes* moniliformes, utcunque pilosuli. Velox an tardum sit animal, non definitio, nec enim nisi in quiete vidi.

In actis Academiæ Scientiarum Parisinæ ad annum 1693. a cl. *de la Hire* insectum describitur, nostro apprime simile; illud in insectis dipteris culiciformibus habitare dicitur, id est in tipulis: & nostrum in tipulis habitat; illud colore est lucido rubro flavescente; nostrum gaudet colore coccineo; illud magnitudine lendis, nec nostrum lende majus. Fors quam descripsimus speciem, larva illius est, quam *de la Hire* loco laudato descripsit. *Enum.*

Coleoptra-21, A. ( des coleopteres ) rufus, an-  
torum. albicante. \*

*Scop. carn.* 1064.

*Geoff. paris.* 2. p. 623. n. 4.

*Blank. inf. t.* 14. f. H.

*Frisch. inf.* 4. t. 10.

*Reaum. inf.* 6. t. 4. f. 13, 14.

*Rœf. inf.* 4. p. 26. t. 1. 10.-15.

*Fab.* 30.

*De Geer tom.* 7. p. 112. n. 4. acarus  
fuscus pallide fuscus, flavescent,  
macula dorsali triangulari obscura,  
pedibus anticis longioribus.

*Enum. n.* 1047. ano pallidiore, tarsis  
pedum intermediorum vesiculosus.

*Beytr. Zur. nat.* p. 10.

*Pod. gr.* p. 122.

*Schæff. icon. t.* 27. f. 2.

*Faun. Fridr. n.* 821.

*Hab.* in scarabæis & in apibus hirsutis

similibusque, sub pectore vel intra femora.

*Desc.* Corpus subrotundum, rufum, convexum, durum. *Caput* & *collum* vix manifesta; versus anum albicans. *Pedes* veloces, anteriore; longiore. *Sutura* transversalis distinguit corpus supra. *Faun.* 1983.

Rupestris. 22. A. ( des pierres ) fuscus, linea dorsali bicolore. \*

*Fab.* 33.

*Hab.* in Europa. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Magnitudo & figura acari *aquatici*, sed *curfus* obscurus. Abdominis linea dorsalis longitudinalis utrinque dilatata, antè in aliis alba, in aliis rubra, communiter antè albida, postè rubra; ceterum *abdomen* nebuloso - nigrum est. *Pedes* rubri. *Faun.* 1984.

Longicor- 23. A. ( la longicorne ) ruber, antennis bifidis rostro longioribus. \*

*Geoff. paris.* 2. p. 618. t. 20. f. 5. chelifer totus ruber, antennis extremo bifetis.

*Fab.* 34.

*Enum. n.* 1062. antennis longis, apice bifetis.

*Beytr. Zur. nat. p.* 9.

*Müll. Lin. Nat. cl. v.* p. 1056.

*Desc.* Facile hic ab omnibus aliis dignoscitur *antennis* rostro longioribus; *antennæ* enim in reliquis vix manifestæ sunt; has *antennas* numero præter octo ordinarios *pedes* adeoque non *pedes* primores pro antennis habeo. Rostrium, *antennæ*, *pedes* corpore pallidiora sunt. *Faun.* 1985.



Littoralis. 24. A. ( des rivages ) fusco-rufus , pedibus sanguineis. \*

*Fab.* 35. ovatus ruber , rostro porrecto subulato.

*Hab.* in Europæ littoribus , in petris.

*Desc.* Corpus glabrum , ovatum. *Antennæ* filiformes quadriarticulatæ. *Caput & thorax* sanguinea. *Abdomen* valde obtusum , magis obscurum , utrinque punctis aliquot impressis. *Fab.*

Fungorum. 25. A. ( des champignons ) fusco-rufescens abdomine subglobofo glabro. \*

*Fab.* 37.

*Schrank.* *Beytr.* 127. 27. t. 6. f. 11 , 12. abdomine glabriusculo , sub incessu globofo.

*Desc.* Magnitudo lendis. *Totus* ferrugineus s. triste rufescens , undique valde glaber , absque lateralibus maculis. *Faun.* 1987.

Tremellæ. 26. A. ( de la tremelle ) subglobosus atro-cærulescens nitidus.

*Fab.* 38.

*Hab.* in tremella Juriperina.

Scaber. 27. A. ( la chagrinée ) cinereus depressus ; lateribus scabris. \*

*Hab.* in terra primo vere.

*Desc.* Est minimum animalculum. *Corpus* depressum , obscure cinereum. *Abdominis* latera a tergo punctis elevatis scabra. *Anus* depressus , bidentatus. Tergo impositus , pedes undique proutendit. *Faun.* 1988.

Salicinus. 28. A. ( des saules ) ruber , linea dorsali duplici fusca , antice bifurca. \*

*Fab.* 39.

*Hab. in falicibus frequens, velox. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Aquatico simillimus magnitudine. Linea dorsalis duplex parallela longitudinalis fusca, versus thoracem bifurca. Faun. 1989.*

Croceus. 29. A. ( la safranée ) fulvus, thoracis lateribus puncto rufo. \*

*Fab. 40.*

*Hab. in falicis rosa monstrosa.*

*Desc. Corpus vix conspicuum nudis oculis, croceum sive dilute fulvum, thorace utrinque puncto rufo saturato. Faun. 1990.*

*Ex Entom. Carn.*

Radiatus. 30. A. ( des tortues ) corpore ovato fusco; margine fulvo postice striato, striis octonis unipunctatis.

*Hab. in testudine mida.*

*Desc. Paulo major aut æqualis cimici lechulario. Os ferrugineum, truncatum, bifidum. Macula dorsalis excavata, ferruginea. Corpus margine subtusque fulvum, postice lineis 8 marginalibus, in quarum qualibet punctum impressum. Verrucæ duæ postice, punctulo nigro notatæ. Pedes fusci, albo annulati. Posticis partibus testudinis alte infixus est ut acarus ricinus in canibus.*

Cornicis. 31. A. ( de la corneille ) pedibus æqualibus, abdomine postice bicorni, cornibus bifetis.

*Hab. in humeris corvi cornicis.*

*Desc. Magnitudo pulvisculi nicotianæ. Color dilute brunneus. Pilus plumosus*

ad latus abdominis utrinque unus.  
*Pedes* pilosi : *postici* & *medii* ab aliis  
 remotiores : *antici* filo brevi, apice  
 palmato. *Cornua* ani teretiuscula ,  
 bifeta divergentia.

**Locusta. 32.** A. ( de la mésange bleue ) abdomine  
 setoso, lateribus sublobatis, pedibus  
 posticis longissimis.

*Schränk. Beytr. Zur. nat. p. 120.*

*Hab. in paro ceruleo.*

*Desc.* Albus, sed caput & femora ferru-  
 ginea. Corporis pars antica fere qua-  
 drata convexiuscula. Abdomen apice  
 valde setosum, setis parallelis. *Pedes*  
*antici* sapius palmati, *medii* longiores,  
 tenuiores minusque pilosi.

**Collurio- 33.** A. ( du lanier écorcheur ) rostro late-  
 nis. ribus denticulatis palporum longitu-  
 dine, pedibus anticis & posticis lon-  
 gioribus.

*Hab. in lanio collur.*

*Desc.* Lineam longus, rotundus. *Dorsum*  
 rufum, nitens. *Abdomen* glabrum,  
 supra cinerascens. *Pedes* rufi, æque  
 diffiti, vix villosi. *Palpi* porrecti.

**Pici. 34.** A. ( du pic moyen ) corpore oblongo,  
 acuminato, pedibus anticis remotis-  
 simis, posticis brevioribus.

*Hab. in remigibus pici medii.*

*Desc.* Corpus adolescens ovatum, adul-  
 tum lanceolatum. Seta una utrinque ex  
 apice thoracis.

**Turdi. 35.** A. ( du merle à collier ) corpore sub-  
 rotundo, antennis teretibus, obtusis,  
 villosis, extrorsum leniter dilatatis,  
 rostro crassioribus,

*Hab. in turdo faxatili.*

*Desc.* Fuscus, lucidus, depressus, glaber;  
*Rostrum* longum, acuminatum. *Pedes*  
æque diffiti. *Cursus* celer. *Statura* est  
tertia pars lineæ.

Coccinel- 36. A. ( des coccinelles ) thorace rufo,  
læ. abdomine albedo, sericibus binis punc-  
torum impressorum longitudinalibus.

*Hab. in coccinella populi.*

*Desc.* Ovatus. *Pedes* æque diffiti, vil-  
losuli.

Muscarum, 37. A. ( des mouches ) ovatus nitidus ;  
ferrugineus, pedibus pallidioribus.

*Enum. n. 1086.*

*Hab. in muscis, sub ventre.*

*Desc.* *Palpi* longi. *Corpus* glabrum ;  
subtus pallidius. *Pedes* æque diffiti,  
*medii* & *postici* crassiores.

*Obs.* Ab acaro muscarum Linn. differt,  
nam pedes nec longissimi nec filiformes.  
*Scop. V.*

Formica- 38. A. ( des fourmis ) ovatus, albidus ;  
rum, superne villosus, antennis motatoriis.

*Hab. in formicis aratis.*

*Desc.* Junior albus, adultus obscurior est,  
agilis valde. *Antennæ* aut *palpi* abdo-  
mine longiores.

Nepæfor- 39. A. ( la cimicoïde ) totus punctis emi-  
nis, nentibus confertis scaber.

*Hab. inter muscos, ad fagorum radices.*

*Desc.* Oblongus, depressus instar folii  
coloris terrei, iners valde. *Antennæ*  
moniliformes. *Os* ovatum. *Pedes antici*  
& *medii* breviores, *secundi* & *postici*  
corpore longiores.

Muscorum,

Muscorum. 40. A. ( des mouffes ) ovatus , nitidus ,  
niger , pedibus ferrugineis.

*Schrank. Beytr. Zur. nat. p. 40.*

*Hab. inter muscos. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Duplo major acaro coleopratorum ;  
politissimus & longis villis instructus.*

Agarico- 41. A. ( des agarics ) ovatus , subfulvus ;  
femoribus mediis crassioribus.

*Hab. in agaricis.*

*Desc. Statura A. coleopratorum.*

Lichenum. 42. A. ( des lichens ) albus , ellipticus ;  
postice obtusus , pedibus æqualibus  
pilosis.

*Hab. inter lichenes in arboribus.*

*Desc. Minor acaro coleopratorum. Thorax  
binis vel uti tuberculis. Abdomeni pone  
pilosum , superne versus latera fusces-  
cens. Pedes æque diffiti.*

Piger. 43. A. ( du lichen des hêtres ) ferrugineus  
ovatus nitens , macula dorsali ovata  
fusca.

*Hab. in lichene crustaceo. In Galliæ Aust.  
montibus. V.*

*Desc. Valde splendet , tarde incedit ;  
dorso impositus vix se invertere potest ;  
irritatus caput inflectit , ut solent  
onisci. Pedes anticos inflexos gerit.  
Ovo pediculi humani minor est ; huic  
anus infra apicem abdominis fusces-  
cens pilique nonnulli ad apicem ventris.  
Pedes parvi & æque diffiti.*

*Ex op. D. de Geer.*

Domesti- 44. A. ( la domestique ) albus , maculis binis  
cus. fuscis , corpore ovato medio coarctato ,  
pilis longissimis , pedibus æqualibus.

*Insect. Tomus IV.*

E



*Geoff. inf. parif. tom. 2. p. 622. n. 3.*  
casei antiqui.

Synonymia ut in acaro *farinæ* Syst. nam  
acaros *farinæ*, scabiei & domesticos  
sub *A. frone* comprehendit Linn.

*Hab.* in caseo antiquo, pane diutius affer-  
vato, avibus, insectis muscorum, &c.  
In Gallia Aust. V.

*Desc.* Inter minimos oculisque nudis vix  
conspicius. Agilis villosus, fusco-  
albidus, nitens. *Caput* inflectit. *Corpus*  
crassum, ovatum, in medio angusta-  
tum. *Pedes* fere æquales; sed *primi*  
quatuor vesicula modo contracta, modo  
tumefcente. *Pili* mobiles, musculo  
igitur insident. Recens natus hexapos.

Avicula- 45. *A.* ( l'aviculaire ) elongatus albus,  
rum. abdomine setis quatuor longissimis,  
pedibus quatuor posticis remotis.

*Hab.* in aviculis. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Diaphanus. *Caput* infra inflexum.  
*Caput*, *thorax*, *abdomen*que vix sepa-  
rata. *Pedes postici* ab intermediis re-  
moti: *primi* quatuor aliis crassiores.  
Nascens hexapos. In avicula mortua  
facile reperitur.

Squamosus. 46. *A.* ( l'écailleuse ) rubicundus, corpore  
pedibusque squamis albidis rectis.

*Hab.* in cimice *betulæ*. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Inter minimos. *Caput* distinctum.  
*Corpus* ovatum, depresso-convexum. *Pedes*  
æquales. Squamæ corpori pediculo  
adfixæ.

Phalangii. 47. *A.* ( des faucheurs ) ovatus ruber,  
rostro porrecto, pedibus longioribus.

*Fab.* 31.

*Hab.* in phalangiis araneisque, arte pedibus

aliisque corporis partibus adhærens.  
In Gallia Aust. V.

*Desc.* Rostrum porrectum. Caput corpusque minime distincta. Pedes pilosi, pilis obtrusis, hirsutis.

Culicis. 48. A. ( des cousins ) globosus ruber, capite porrecto lateribus inflato, pedibus longioribus.

*Hab.* in culicibus.

*Desc.* Ruber, globosus. Corpus antice truncatum, ibi caput elongatum, quod insectum curtat & elongat. Nascens fex pedibus diaphanis, rubeolis.

Parasitus. 49. A. ( la parasite ) oblongus ruber, rostro brevissimo sub capite pedibusque brevioribus.

*Hab.* intra pedes muscarum aliorumque insectorum. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Sanguineus. Caput indistinctum. Rostrum brevissimum. Pedes rubelli, articulis pilosis brevibus.

Aphidum. 50. A. ( des pucerons ) ovatus ruber, oculis nigris, pedibus anticis extremo clavatis.

*Hab.* in aphidibus. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Minimus, sanguineus, globosus. Caput distinctum, tuberculis lateralibus oculiformibus. Rostrum inflexum. Pedes anteriores aliis longiores, extremitatibus crassiores.

Corticalis. 51. A. ( la corticale ) subrotundus crustaceus fusco-castaneus, nitidus, pedibus pallide fuscis.

*Geoff. inf. parisi.* tom. 2. p. 626. n. II. petrarum niger, abdomine globoso lucido, femoribus subclavatis.

*Hab.* sub cortice pyri.

*Desc.* Araneiformis. *Caput* horax & *abdomen* distincta. *Caput* conicum, antice acuminatum, pilis duobus supra. Thoracis longitudo latitudinem superat. *Abdomen* ovato-globosum. *Pedes* longi, *femoribus* crassis, unguibus tribus.

Phalangoi-52. A. ( la phalangiforme ) ovatus obscure ruber, macula dorsali oblonga, flavo-aurata, pedibus longissimis.

*Hab.* in Europa.

*Desc.* *Pediculi vulgaris* magnitudiŋe. *Capus* non distinctum. *Corpus* ovatum, lateraliter pilis brevibus. *Pedes postici* tenuissimi, longissimi, *posteriores* remoti. *Omnes* articulis sex.

Caudatus. 53. A. ( la prolongée ) aquaticus fuscus; rufo maculatus, abdomine caudato cylindrico.

*Fab.* trombidium 4. abdomine fusco, rufo maculato, postice porrecto cylindrico.

*Beytr. Zur. nat. p. 5 ?*

*Hab.* in Europæ aquis, celerrime natans.

*Desc.* Rufus supra, infra citrinus lagænæ inversæ similis. *Corpus* globuliforme, in medio supra ellipsi elevata. *Caput* non distinctum, punctis 2 nigris, forsan oculis. *Pedes* longi, flexiles, articulis plurimis; *postici* reliquis longiores crassioresque.

Aquaticus-54. A. ( l'aquatique ronde ) aquaticus rubro-globosus. fuscus, corpore globoso, tentaculis brevioribus, pedibus rubris approximatis.

*Fab.* trombidium 5. fuscum corpore globoso, pedibus rubris.

*Hab.* in Europæ aquis.

*Desc.* Magnitudo variat. *Corpus* fere sphaericum. *Caput* nec *thorax* distincta. *Pedes* pilosi, natatorii, articulis sex; anteriores reliquis breviores.

Aquaticus-55. A. ( l'aquatique tachetée ) aquaticus maculatus. fuscus macula rubra, corpore globoso, tentaculis brevioribus crassis, pedibus viridi-griseis approximatis.

*Hab.* in Europæ aquis. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Præcedente minor. *Corpus* globosum, macula dorsali rubra maculaque ovali, scabrum, pilosum. *Pedes* viridigrisei; anteriores breviores.

*Obs.* Species certe propria. V.

Aquaticus-56. A. ( l'aquatique à ailerons ) aquaticus marginatus. subrotundus crustaceus niger, pedibus rufis, corporis lateribus marginatis.

*Hab.* in Europæ aquis.

*Desc.* Niger. *Caput* conicum antice acuminatum, pilis longis. *Corpus* squamosum, nitens, appendice utrinque laterali diaphano-rufa. *Pedes* rufi, articulis plurimis pilosis, unguibus tribus.

*Ex spec. D. Fab.*

Pallipes. 57. A. ( la pallipede ) ovatus fuscus, antennis pedibusque pallidis.

*Hab.* Kiliæ. D. Kerstens.

*Desc.* Magnitudo fere A. ricini. *Corpus* totum ovatum, depressum, planum, fuscum, pilis rarioribus pallidis adpersum, antennis pedibusque pallidis.

Sanguisugus-58. A. ( la sangsue ) ovarus planus niger, abdomine ferrugineo, antennis clavatis.

*It.* Norwag.

*Hab. in hominibus animalibusque Nor-*  
*wagiæ.*

Lipnensis. 59. A. ( la Saxonne ) ovatus fuscus , margine  
incrassato.

*Hab. Liptiæ.*

*Desc. parvus , statura A. Ægyptii , at*  
*totus fuscus.*

Zosteræ. 60. A. ( de l'algue marine ) subrotundus  
albidus , abdomine rufo.

*It. Norwag.*

*Hab. in fucis oceani Norwagici.*

Fucorum. 61. A. ( du varec ) pallidus , lineis duabus  
flexuosis nigris , pedibus posticis bre-  
vissimis incurvis.

*It. Norwag.*

*Hab. in oceani Norwagici fucis.*

Hispanus. 62. A. ( l'Espagnole ) ovatus niger , pedibus  
ferrugineis , peniculis albis.

*Hab. in Barbaria. D. Vahl. In Gallia*  
*Aust. prope Massiliam captus. V.*

*Desc. Major A. sanguisugo. Antennæ*  
*breves , extorsum crassiores. Corpus*  
*planum , ovatum , nigrum , pedibus*  
*omnibus ferrugineis , geniculis albis.*  
*Mant. 5.*

Holstæus. 63. A. ( l'aplanie ) ovatus planus ferrugi-  
neus , thorace fusco.

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc. Corpus rotum ferrugineum , thorace*  
*solo fusco. Pedes obscuriores. Mant. 14.*

*Ex Enum.*

Natator. 64. A. ( la tique nageur ) globosus coc-  
neus , pedibus posticis natatoriis.



*Beytr. Zur. nat. p. 6.*

*Hab. in Europæ aquis.*

**Lichenis.** 65. A. ( du lichen de terre ) pedibus  
primi quartique paris longioribus,  
secundi crassiusculis.

*Beytr. Zur. nat. p. 40.*

*Hab. in lichenis canini facie averfa.*

**Leucurus.** 66. A. ( la blanchâtre ) pedibus secundis  
crassissimis, corpore testaceo, au pal-  
lidiores.

*Beytr. Zur. nat. p. 124.*

*Hab. in cadaveribus.*

**Conservæ.** 67. A. ( de la conserve ) fuscus ovatus;  
pedum geniculo minimo, tertio seta  
longa armato.

*Hab. in conserva; extra aquam moritur;  
in aqua superficiem nunquam petit,  
nec vagatur, sed in filamentis con-  
servæ sub finem Martii obambulat.*

*Desc.* Minimus, vix nisi ope lentis visi-  
bilis, fuscus, pedibus pallidioribus.  
Figura globosa, antice acuminata.  
*Pedes* æqualis longitudinis & structuræ.  
Si bases pedum non computes, arti-  
culis constant quinque; primus, tertius  
quartus teretes, in apice tertii seta  
longa porrigitur. Articulus secundus  
brevis, fere globosus; quintus itidem  
brevis, sed oblongus, apice ungui-  
culis armatus. *Pedes omnes* pilis non-  
nullis brevibus sparsis leviter horrent,  
sed corpus nudum, nec nisi ad rostrum  
setis duabus, quasi antennis, brevibus  
instructum.

**Cadave-** 68. A. ( des cadavres ) corpore subtilebo;  
postice setis quatuor longioribus.

E iv.

*Beytr. Zur. nat. p. 128.*

*Hab. in cadaveribus insectorum.*

**Destructor. 69. A.** ( la mite destructeur ) ovatus, antetis longis pluribus, pedum seta unica.

*Hab. in insectorum exuviis loco humido adservatis, veram inducens cariem.*

*Desc.* Minimus, oculo nudo prorsus inconspicuus, hyalinus vitri instar, albens, sed sæpe ab esca transparente mire variegatus; hinc aliqui occurrunt albi, alii nubeculas obscuras gerunt, uti ille, quem depinximus, alii ferruginei. *Corpus* nitens totum, etiam pedibus, glaberrimum, sed setis in utroque latere inter pedum par secundum & tertium duabus fere ad angulum rectum corpori insidentibus, setis duabus in singulo pede, quarum una in medio ad angulum acutum prodit longior, altera basi insidet brevior; pollice post se trahit setas plures inæqualis longitudinis. Antice ex corpore articulus angustior procedit & ex hoc rostrum, qui basi oculis duobus prominentibus instruitur, sed hyalinis, nec coloratis; supra oculos seta brevis antrorsum porrecta; setæ duæ aliæ breves in medio rostri, antennas mentientes, cum rostrum desceditur.

Insectum ptino fure pertinacius ac magis pertimescendum; molliora, ac succulentiora insecta præsertim inquirit. Arcetur, si arcas, quibus insecta inclusa sunt, in loco sicco colles, nec per hyemem in cubiculis calefactis ad muros communes cum cubiculis frigidis, aut quibus in altero latere aer externus frigus inducit, adserve,

Quod nisi feceris, muro frigido communicatus a cubiculo calor humores in ejus superficie deponit, sensim in arcam penetraturos, ac primo mucori, paullo post acaro destructori viam paraturus.

Eruditus. 70. A. ( le bibliomane ) pedibus primi paris crassissimis chelatis, secundis longissimis, apice biferis.

*Hab.* in libris humido loco adservatis. Insidiatur uti præcedens glutini bibliopegorum. Præsens species præsertim adest ad oras chartæ librorum integumento adglutinatæ, ore pedibusque suis cheliformibus glutini immensis illudque remouentibus. Non facile per libri superficiem discurrit, nisi inquietata, tum vero currit celeriter.

*Desc.* *Abdomen* ovatum, pallidum, hyalinum, ut in acaro *sirone*, sæpe transparente costæ figura. Hinc inde pili quidam minuti, & ad utrumque latus, inter par pedum alterum tertiumque seta brevicula curva fere ad angulos rectos corpori insidens. *Pedes* hinc inde fetis longioribus subtilissimis armantur, sed earum numerus magnus non est; fere cuius articulo una obtingit. *Pedes* quatuor posteriores mediocres, hyalini, graciles; primi paris vix posticorum longitudine, sed mirum in modum crassi, ac structuræ peculiaris; non pectori affixi, sed lateri thoracis antice inserti videntur; hoc enim insectum contra morem generis peculiari thorace instruitur. *Pedes* ipsi genicula non habent, quod si illos insectum moveat, id tantum in basi fit, sed insecti non vidi; prorsus sunt teretes,

sed circa medium cubito quodam inf-  
 truuntur, post quem nonnihil angus-  
 tiores evadunt, ac denique in acumen  
 inflexum desinunt, cui latere interiori  
 pollex mobilis obvertitur. Intra acumen  
 pollicemque duo tresve pili sui singuli,  
 apophysis ac bulbulis insidentes di-  
 gitosque non inepte mentientes. *Pedes*  
 hi cursui non inserviunt, sed ab in-  
 secto antrosum protenduntur, dum  
 currit; alius a cursu illorum finis est.  
*Pedes* secundi paris, uti cæteri, abdo-  
 mini inserti, exiles, graciles, longis-  
 simi, diaphani, apice setis duobus  
 armati & per totam longitudinem pilis  
 nonnullis sparsis.

*Thorax* abdomini insertus, in illudque  
 nonnihil retractilis, subrhomboidalis;  
 ad latera, ubi in angulum solidum  
 desinunt, corpus utrinque minutum,  
 rotundum, hyalinum, fors oculus;  
 antrosum in proboscidem desinit bifi-  
 dam, acuminatam. Per medium tho-  
 racis lineæ tres longitudinales tenues  
 mobiles decurrunt, intestinum fortasse  
 quoddam.

Cæterum insectum ita parvum, ut nudo  
 oculo cerni prorsus nequeat; nisi forte  
 in vitro, quod lumini obvertas, aut  
 cui corpus atrum supponas.

Juniores recens ex ovo exclusi per om-  
 nia, etiam pedum numero, ac vix  
 non magnitudine matribus similes,  
 contigit enim mihi ex ovis a matre  
 me inspectante positis, sub meis prope  
 oculis ut suboles prodierit propagatura  
 hanc speciem.

*Alaudæ*. 71. A. ( de l'alouette ) ano pollice emar-  
 ginato.



*Beytr. Zur. nat. p. II.*

*Hab. in alauda arvensi.*

**Graminum.** 72. *A.* (des graminées) rufus, pedibus primi paris longissimis, abdomine postice crenato.

*Beytr. Zur. nat. p. 8.*

*Hab. in graminum foliis; ea maculans.*

**Appendicularus.** 73. *A.* (l'appendiculée) subglobosus cinereus, pedibus longis pallidioribus, posticis longioribus.

*Hab. sub lichene pulmonario rarior.*

*Desc.* Inter majores sui generis, globosus, cinnabarinus, nitens. *Pedes* graciles, longi, corpore pallidiores; *postici* reliquis notabiliter longiores. Huc usque, uti oculo inermi adparet.

*Ad lentem corpus* fatis pilosum, *antice rostrum*, quod fere intra *abdomen* aliqua sui parte reconditum videtur; ad latera rostri *antennæ* inæqualis structuræ, nec, ut in aliis insectis, secum similes. Earum una, tubo theatri non abssimilis, articulis tribus constat, ex quibus primus articulus cylindricus, alter fusiformis, acutusque est; *subtus* adfixus ei est tertius articulus, f. corpus ovatum, ut fere in *A. holosericeo*. *Antenna* altera claviformis est, f. *corpus* ovatum crassum petiolo angustiori insidens, subtus corpore illo ovato destitutum. *Antenna* utraque fatis pilosa, pilis aculeos mentientibus, quod de pilis quoque pedum & de iis, qui per corpus sparsi sunt, valet. *Pedes* articulis sex constant, quorum duo priores breviores ovati: reliqui longiores, ac teretes; par pedum quartum reliquis longius, articulo unico



ovato, reliquis longis teretibus, ex quibus penultimum omnium longissimum. *Pedes omnes* apice ungue duplici armantur.

*Vitis.* 74. A. (de la vigne) ovatus ruber fetosus, pedibus æqualibus sparsim fetosis.

*Hab.* in vite vinifera; currit, ut præcedens, celerrime.

*Desc.* *Corpus* ovatum, magnitudo grani milii. Color scarlatinus, pedibus tamen pallidioribus. *Pedes* extensi, longi, ut in araneis. *Corpus pedesque* pilis rectis longis horrent. Nec hæc species, nec ei simillima species prior thoracem habet, quem *Müllerus* in versione *Linnaei* Germanica describit. Differt insectum præsens a priori solis pedibus. Prior ad basin cujusvis articuli verticillo pilorum cingitur; hoc pilos temere sparsos gerit.

*Denticula-* 75. A. (la dentelée) corpore antice dentatus.

*Beytr. Zur. nat. p. 125.*

*Hab.* sub ollis hortulanorum.

*Testudi-* 76. A. (la tortue) abdomine glabriusculo; neus. sub incessu globoso.

*Beytr. Zur. nat. p. 127.*

*Hab.* in terra.

*Rubens.* 77. A. (le rougeâtre) ruber ovato-oblongus; pedibus subæqualibus.

*Beytr. Zur. nat. p. 40.*

*Hab.* sub musco.

*Prægnans.* 78. A. (la printanière) ruber globosus aterrimus pedibusque pallidioribus, anticis longioribus.

*Hab. in humo prægnañti primo vere.*

*Desc.* Minimus, invisibilis futurus, nisi læte coccineus esset; totus lævis, nullis pilis nec in pedibus conspicuis, nec in antennis, nec in reliquo corpore. Color pedum & antennarum dilutior quam in reliquo corpore.

Musci. 79. A. ( de la mouffe ) corneus pilosus niger.

*Beytr. Zur. nat. p. 40.*

*Hab. in musco.*

*An Scop. 1071.*

Limacum. 80. A. ( des limaçons ) limacum.

*Beytr. Zur. nat. p. 13.*

*Reaum. ac. gall. 1710.*

*Hab. in helice pomaria.*

Foliorum. 81. A. ( des feuilles ) ovatus hyalinus fetosus, pedibus omnibus æqualibus.

*Beytr. Zur. nat. p. 33.*

*Hab. in variarum plantarum foliis per æstatem.*

Putrescen-82. A. ( de la fermentation ) ovatus hyaliniæ.  
linus fetosus, pedibus subæqualibus.

*Beytr. Zur. nat. p. 34.*

*Hab. in terra prægnañte. Copiosus obtinetur, si fæces caffèæ misceantur humo & humore excitetur fermentatio.*

Carduelis. 83. A. ( du chardonneret ) ovatus subhyalinus nigricans nudus, pedibus subæqualibus, omnibus physapodibus.

*Beytr. Zur. nat. p. 38.*

*Hab. in fringilla carduele.*

Coccineus. 84. A. ( l'écarlate ) ovatus, coccineus; pedibus sex, corpore simplici.

*Scop. carn. 1053.*

*Hab. in insectis variis.*

*Desc. Corpus* ovatum oblongum. *Pedes* longi, filiformes, æque distiti. *Antennæ* longiusculæ apice connivent, ut figuram cordis referant. *Oculi* prominuli, nigri. *Color* insecti scarlatinus, pedibus antennisque pallidioribus. Magnitudo lendis. Corpus, pedes, antennæ pilis brevibus teguntur.

Observavit celeberrimus *D. Scopoli* insectum hoc, dum quiescit, capiti antennisque inniti, pedibus in partem averfam otiose protentis, quod & nos vidimus. Insecto huic *pedes* tantummodo sex, unde a *Corniolico Plinio* pediculis accenseri fustinuit; ego habitum secutus potius, ad acaros retuli. Et observat *cl. Goeze*, quosdam acaros juniores non nisi provecta aliquantulum ætate pedibus octo instrui. Forte tamen præsens species nunquam plures, quam sex nanciscitur. Vidit illam *cl. Scopoli* in hemerobiis variis, in phryganea quadam, & leptura; vidi ego illam in phryganeis variis & araneis nonnullis, nunquam pedum numerus senarium excessit.

**Sambuci. 85. A.** ( du sureau ) ruber, pedibus palpisque pallidioribus, corpore pedibusque setis longiusculis conspersis.

*Hab. in foliis sambuci nigræ, rarus.*

*Desc. Oculi* duo nigri. *Motus* non festinus.


**Acarorum. 86. A.** ( des mites ) acarorum.

*Hab. in acaro crassipede* adulto. Specimen, cui insidebat hæc species magnitudine seminis cheiranthi annui fuit,

*Desc.* hemisphæricus, pallidus, glaber, pilis tantum in corpore aliquot brevibus, in pedibus nonnihil numerosioribus. In secundo *pedum* pari haud procul a basi seta longiuscula. *Pedes omnes* æquales, breviculi. Antice *corpus* minutum, cui setulæ duæ antrotrorsum porrectæ insident divergentes. Enumerat *Linnaeus* acarum quemdam, quem scabrum vocat; an non eadem species ac *acarus crassipes* acaro *acarorum* infestatus? Certe minutus noster acarus in acaro majori quietissimus, numerosusque adest, ita ut fere duodecim infestum unicum obsideant; nec facile etiam a mortuo discedit, sed cum illo moritur.

**Vegetans. 87. A.** ( la végétante ) crustaceus fuscus marginatus, convexus, subtus planus. *Linn. addit. ad Syst. n. Shaw's misc. Pl. 64.*  
*Hab. in variis coleopteris.*

*Obs.* Licet acari plerique oculis vix sint conspicui, aliis insectis periculosiores experientia constat. Vivipari sunt omnes. In quibusdam cibis diutius asservatis mirifice multiplicantur & non sine periculo cum alimentis in stomachum descendunt; hinc morbi nonnulli contagiosi forsan oriuntur. Scabiei enim, luis venereæ, cujusdam dysentericæ, pestis etiam causæ an injuste judicarentur? V.



## G E N U S   V I I.

PHALANGIUM. *Pedes* VIII.

*Oculi* verticis duo contigui, duo laterales.

*Frons* antennis pediformibus.

*Abdomen* rotundatum.

Grossipes. 1. P. ( le grossipede ) corpore minuto  
cylindrico humeris tuberculato, pe-  
dibus longissimis. †

*Strom. sondm.* 208. t. 1. f. 16. phalan-  
gium marinum.

*Hab.* in mari Norwegico : tardissimum,  
mytilorum testasque penetrat & exhaurit.

*J. G. König.*

Corpus cylindricum, minutum, articu-  
latum, articulis antice supra tuberculo  
notatum. Antennæ capitis 2, setaceæ.  
Os palpis 2, biarticulatis, chelatis.  
Pedes 8, setacei, longissimi, ut in  
ph. opilione. Tentacula pectoris 2,  
filiformia, corpori parallela, pone  
anum patentia, in medio chelata  
( unde cancris affinis videtur ). Cauda  
linearis, angusta. Mirum tam parvum  
corpus regere tam magnos pedes.

Opilio. 2. P. ( des murailles ) abdomine ovato ;  
subtus albo.

*Scop. carn.* 1122.

*Mouff. inf.* 234. f. 4.

*Aldr. inf.* 602. f. 4.

*Gæd. inf.* 2. t. 49.

*List. Gæd. f.* 143.

— *Angl. t.* 1. f. 35.

*Hæffn. inf.* 2. t. 9.

*Raj. inf.* 39. n. 35.

*Bradt;*



*Bradl. nat. t. 24. f. 2.*

*Clerck. aran. t. 6. f. 10. 3.*

*Sulz. inf. t. 22. f. 140.*

*Geoff. paris. 2. p. 629. t. 20. f. 6.*

*Fab. 2.*

*De Geer. tom. 7. p. 166. n. 1. parietinum*  
corpore ovato, supra griseo - fusco,  
subtus albo.

*Hook. microg. p. 198. t. 31.*

*Enum. n. 1088.*

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1060.*

*Faun. Fridr. n. 823.*

*Hab. in Europa, America. Nocte vagatur.*  
Oculi 2. Antennæ *Angulosæ. lenticula*  
2 longa.

*Obs. Mas minor. Abdomen brevius.*  
*Brachia pedesque longiora. Ubique*  
errant, præsertim muros & umbram  
amant. V.

**Cornutum. 3.** P. ( le cornu ) abdomine depresso,  
rostro bicorni, palpis pediformibus.

*Schæff. elem. t. 13. f. 9.*

— *icon. t. 39. f. 13.*

*De Geer tom. 7. p. 173. n. 2. t. 10.*  
*f. 12. - 15. corpore ovato, supra*  
griseo - fusco fascia nigra, subtus  
albo, tentaculis longissimis, chelis  
cornutis.

*Fab. 3. abdomine depresso, mandibula*  
conica adscendente, palpis pediformibus.

*Enum. n. 1089.*

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1061.*

*Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 629. n. 1.*  
phalangium abdomine ovato subtus  
albo.

*Hab. in Germania. D. Schreber. In Galliæ*  
Aust. hortis. V.

Corpus depresso, Pedes longissimi ut in

*Insect. Tomus IV.*

F

*ph. opilione*. Rostrum cornibus 2 subulatis parallelis. Palpi pedibus similes, paullo breviores.

Obs. DD. Linn. & Schrank. hoc phalangium Geoff. ad præcedens retulerunt; sed vere cornutum Linn. uti optime observaverunt DD. Geer, Fabriciusque; a præcedenti brachiis & forcipibus manifeste differt. V.

**Cancroides. 4.** P. (faux-scorpion) abdomine obovato depresso, chelis lævibus, digitis pilosis. *Acarus cancroides*. t. II. f. 7.

*Scop. carn.* 1067.

*It. Œl.* 84.

*Seb. mus.* I. t. 70. f. II.

*Frisch. inf.* 8. t. I.

*Raf. suppl.* t. 64.

*Schæff. elem.* t. 38.

*Clerck. aran.* t. 6. f. 10. I, 2.

*Geoff. paris.* 2. p. 618. *chelifer abdomine lineis transversis*.

*Fab. scorpio* 7. abdomine ecaudato, ovato, depresso, fusco.

*De Geer tom.* 7. p. 355. n. I. t. 19. f. 14, 15. *chelifer obscure fuscus*, corpore ovato depresso, chelis elongatis.

*Hook. micogr.* t. 33. f. 2.

*Enum. n.* 1090.

*Pod. gr.* p. 122?

*Hab.* in umbrosis suffocatis, cellulis mephiticis, victitat termetibus, acaris; retrogradus. Intrans curtim, inde pupula magnitudine pisi dolore summo.

*Pedes* 8 præter antennas cheliferas Syst.

Obs. phalangium hoc inter scorpiones ordinavit D. Fab. sed pectines desunt. Genus novum apud DD. Geoff. de Geerque.

D. Geoff.

D. de Geer.

Chelifer.

Pedes octo.

Pedes 8.

Oculi duo.

*Antennæ* chelifor-  
mes rostro lon-  
giores.

*Antennæ* nullæ, che-  
læ 2 parvæ.

Palpi 2 chiliformes  
ad latera capitis.

Balænarum. 5. P. ( des baleines ) abdomine dilatato  
muricato, rostro subulato.

*Mart. spitz.* 85. t. Q. f. d. pediculus ceti.

*Baxter. subf.* v. 2. t. 3. p. 146. t. 12. f. 3.  
pediculus ceti.

*Strom. sondm.* 209. t. 1. f. 17. phalan-  
gium littorale.

*Brunnich. inf.* t. 1. f. 17.... pycnogonum.

*Fab.* pycnogonum 1. palpis duobus cor-  
pore ovato. *It.* Norwag.

*Hab.* in oceano Norwegio sub lapidibus  
*Konig.*

*Simillimus onisco ceti, sed pedes omnes  
pluribus articulis, omnes perfecti, nec  
plures quam octo. Dorsum rubrum plu-  
ribus segmentis, singulis 3 mucronibus.  
Cauda cylindrica, brevissima, trun-  
cata. Rostrum membranaceum, subu-  
latum, longitudine pedum. Genus du-  
bium, facie onisci ceti, rostro a reli-  
quis diversum. Cum solo rostro absque  
maxillis sit, forte aptius acaris aut  
proprio generi subjiciendum.*

Tricarina- 6. P. ( la tricarene ) abdomine elliptico  
depresso tricarinato, femoribus anticis  
subcristatis.

*Fab.* 6. fuscum abdomine depresso carinato, pedibus anticis ante apicem unidentatis. *Mantiss.*

*Hab.* Dresdæ-Saxonum. *D. Heise.*

Corpus ovale, fuscum, depressum, tricarinatum, incisuris quinque obsoletis: carina una media longitudinalis; una utrinque supra marginem lateralem. Pedes corpore duplo longiores. Femora primi pari sursum dilatata, carina subcrenata.

Corpus magnitudine *P. opilionis*, at depressum, planum, abdominis dorso carinato. Pedes octo mediocres, anterioribus fere palpiformibus ante apicem unidentatis. Reliqui inermes. Mandibulæ chelatæ, nigræ. *Mantiss.*

*Ex spec. D. Fab.*

**Bilineatum.** 7. *P.* ( le rayé ) pallidum, lineis duabus dorsalibus punctatis atris. *It. Norwag.*

*Hab.* in Norwagiæ rupibus submarinis. Forte mera *ph. opilionis* varietas.

**Diadema.** 8. *P.* ( le diadème ) thoracis tuberculo dorsali elevato spinoso. *It. Norwag.*

*Stoem. act. Hafn.* 9. 583. t. 6. phalangium corpore ovato, tuberculo thoracis spinoso.

*Müll. zool. dan. prodr. add.* 280. 192.

*Hab.* sub muscis rupium Norwagiæ.

*Desc.* tuberculum dorsale elevatum, apice spinosum, utrinque magno oculo instructum.

**Bimacula-** 9. *P.* ( le bimaculé ) abdomine atro, maculis duabus albis.

*Hab.* in Anglia, Norwagia.

*Desc.* Parvum. Corpus ovatum, atrum;

maculis duabus oblongis albis ad basin abdominis. Linea submarginalis tenuissima, alba. *Abdomen* ungit. *Pedes* elongati, atri.

**Araneoi- 10. P.** ( l'aranéοide ) chelis dentatis villosis, corpore oblongo.

*Hab.* in Russia meridionali morfu venenato hominibus pecoribusque lethalis.

*Obs.* 1. Genus forte proprium insectum nondum rite examinatum.

*Obs.* 2. Ab araneis phalangia primus distinxit primusque sub genere proprio condidit *Linn.* anno enim 1758, in edit. *Syst.* decima Holmiæ publicata genus hoc enunciatum fuit : definitio tamen emendanda videtur. Oculis tantum duobus gaudent phalangia, caput & thorax adeo indivisa, ut situs oculorum prorsus sit incertus. Veris antennis frons non armatur abdomenque potius ovale quam rotundatum iudicabitur. Definitio *D. Geoff.* non magis recipienda, ut patet ex *D. Fab.* definitione. *Antennæ*, quantum videre licet, omnino nullæ.

*Larva* octopoda, omnibus partibus completa, imagini simillima.

*Puppa* octopoda, agilis, currens, imagini simillima.

Victus & *larvæ* & *puppæ* & *imaginis* e rapina aliorum insectorum vermiumque.

*Ova* in locis humidis deponunt.





## GENUS VIII.

ARANEA. *Pedes* VIII.*Oculi* VIII*Os* unguibus f. retinaculis duobus.*Palpi* duo articulati; masculis genitalibus capitata;*Anus* papillis textoriis.

*Diadema*. 1. A. ( porte-croix ) abdomine subgloboso  
rubro-fusco, cruce albo-punctata. \*

*Scop. carn.* 1077. aranea *Linnaei*.

*Mouff. inf.* 233. f. 1.

*Aldr. inf.* 608. f. 9.

*Jonst. inf.* 1. 18. f. 17, 16, 20.

*Raj. inf.* 18. n. 2.

*List. aran.* f. 2.

*Frisch. inf.* 7. t. 4.

*Clerck. aran.* 25. t. 1. f. 4, 5.

*Fab.* 21.

*De Geer tom.* 7. p. 218. n. 1. t. 11. f. 4.-8.

retiaria, abdomine rubro fusco f. rufo,  
tuberculis duobus, cruce dorsali tri-  
plici albo punctata.

*Geoff. inf. paris. tom.* 2. p. 647. n. 10.  
livido rufa, abdomine cruce triplici  
lutea.

*Faun. Fridr.* n. 824.

*Enum.* n. 1091.

*Pod. gr.* 122.

*Hab.* in betulis.

*Desc.* Colore rufo & magnitudine & ovato  
abdomine ab omnibus differt, in dorso

---

*Aranea* insidis pascuntur rapinaque vivunt; propriam in speciem  
etiam faciunt; a spregibus & ichneumonibus plectuntur; senec;  
tam exuunt; athera scandunt.

abdominis crux alba ex articulis tanquam diadema. *Faun.* 1993.

*Obs.* Araneam à croix papale solus *D. de Deer.* synonymam hujus credidit; in enumeratione contra, aranea diadema ad araneam porte-feuille refertur. In *Systemate* autem uti in *D. Fab.* speciebus *ins. parif.* non citata fuerunt. Ex consensu fere omnium Entomologorum aranea diadema est illa quæ a *Lijtero* descripta fuit *tit.* 2. *f.* 2. *araneus rufus*, sive *avellaneus*, cruciger cui utrinque ad superiorem alvi partem quasi singula tubercula eminent; pro aranea autem dumetorum, à feuille coupée *D. Geoff.* *list.* t. 1. *f.* 1. *Fab.* citavit. *Araneus subflavus*, alvo præcipue in summa sui parte & circa latera albicante plena, oculis nigris pellucidis in capite albicante t. 1. *f.* 4. & 5. *Clerck.* citaverunt *DD. Linn.* & *D. de Geer*; sed *D. Fab.* t. 1. *f.* 2. ejusd. sed ibi certe error typographicus, ut patet citatione t. 21. *f.* 2. insuper in t. 4. t. 35, 36. *Ræf.* delineata picta fuit; aranea igitur diadema *Syst.* & aranea papalis à croix papale *D. Geoff.* una eademque species mihi videtur. Abdomen colore, macularum numero, cruce minus magisve distincta variat. In omnibus oculi nigri situ quadragono, oculis lateralibus contiguus. Brachia pedesque spinosa, fusco interscita. Thorax aqueus, lineola nigricante in medio. V.

Reticulata. 2. A. ( la réticulée ) abdomine globoso reticulato, supra purpurascente fusconebuloso. \*

*Hab.* in hortis.

*Desc.* *Corpus* albicans. *Thorax* hyalini coloris; a tergo macula oblonga nigricans; lateribus puncta nigra. *Abdomen* tenuissime reticulatum album, vasis nigricantibus, in dorso nebulosum e fuco & versus latera obscure purpurascens. *Pedes* nigris maculis. *Faun.* 1994.

**Cucurbitina. 3. A.** ( la cucurbite ) abdomine subglobofo flavo, punctis quibusdam nigris. \*

*Raj. inf.* 20. n. 8.

*List. aran.* f. 5.

*Clerck. aran.* 44. t. 2. f. 4.

*Enum.* n. 1092.

*Faun. Fridr.* n. 825.

*De Geer tom.* 7. p. 233. n. 8. t. 14. f. 1, 2. viridis, punctata, abdomine subglobofo viridi, punctis aliquot nigris, postice macula rufa.

*Schæff. icon.* t. 124. f. 5.

— *icon.* t. 196. f. 6.

*Hab.* in arboribus foliatis, assidens reti laxo ova obvolventi. In Gallia Aust. V.

*Desc.* *Thorax* & *pedes* pallidi, linea nigra ad thoracis latera utrinque. *Pedum* articuli spinosi, ad apices omnes nigricantes. *Abdomen* ovatum, viride, utrinque versus unum punctis quatuor nigris & in disco abdominis, versus ejus basin, punctorum 3 paria nigricantia excavata. *Anus* sæpe fulvus. *Faun.* 1995.

**Calycina. 4. A.** ( la fleuriste ) abdomine globoso pallido flavescente. \*

*Scop. carn.* 1099. aranea kleynii.

*Faun. Fridr.* n. 826.

*Hab.* in calicibus florum, a corolla

decidua vacuis, apes muscasque mel collecturas jugulans.

*Desc.* Media. *Abdomen* albidum vix manifeste flavescens, supra punctis excavatis; 1 ad basin; dein 2 parva; tum 2 media. *Thorax* lateribus linea virecente. *Pedes* longi, ad latera protensi. *Faun.* 1996.

**Octopunctata.** 5. A. ( la huit ponctuée ) abdomine subrotundo flavo, stigmatibus utrinque quatuor nigris, ano rufo.

*Enum. n.* 1102.

*Hab.* in Suecia rete horizontali geometrico. *Corpus pallidum, excepto abdomine.*

*Obs.* In enumeratione describitur aranea quæ in fenestris rete parat perpendicularare, eadem species videtur. V.

*Desc.* *Abdomen* ovatum. *Thorax* obsolete castaneus. *Pedes* albo nigroque variegati, spinosi. *Abdomen* flavescens, punctis impressis octo, per paria dispositis; puncta primi paris subapproximata: postremi minutula. Pectus abdominisque medium subtus nigra.

**Bipunctata.** 6. A. ( la biponctuée ) abdomine globoso atro, punctis duobus excavatis. \*

*De Geer tom.* 7. p. 255. n. 16. t. 15.

f. 1. textoria, nigro-fusca nitida; abdomine globoso, punctis excavatis, antè fascia grisea.

*Blanck. inf. t.* 13. B. A.

*List. aran. tit.* 11. f. 11. araneus pullus, glaber, domesticus.

*Enum. n.* 1093.

*Pod. gr. p.* 3.

*Hab.* in fenestris rete disperso.

*Obs.* A numero punctorum hæc species minime est determinanda. *Pedes anteriores*

longiores, quatuor intermedii breviores.

Oculi duo lucidi, alii nigri. V.

*Desc.* Tota atra. Pedes testacei. Abdomen globosum, glabrum, nitidum, punctis duobus non coloratis a tergo in medio impressis notatum, & si probe attendas, aliis adhuc duobus, paullo anterioribus, sed minoribus. A capite per thoracem & abdomen ducitur linea inter punctorum paria ad anum usque sordide testacea. *Faun.* 1997.

*Obs.* Oculi subæquales in quadrum dispositi sunt duoque utrinque laterales conspicuuntur. V.

Arundina- 7. A. ( des roseaux ) abdomine subgloboso  
cea. albo, maculis dilute fuscis. \*

*Faun. Fridr. n.* 827.

*Hab.* in arundinum paniculis.

*Desc.* Est inter minores generis sui. Abdomen albidum maculis fere ut domestica, sed dilutioribus & magis distinctis. Thorax lividus sive griseus. Caput supra canum. *Faun.* 1998.

Angulata. 8. A. ( l'angulaire ) abdomine ovato, antice lateribus angulato-acuto. \*

*It. Gotl.* 216.

*Clerck. aran.* 22. t. I. f. I.

*Fab.* 20. abdomine ovato, antice lateribus angulo acuto, thoracis centro excavato.

*De Geer tom.* 7. p. 221. n. 2. t. 12..

f. I, 2. retiaria, abdomine ovato nigro, supra tuberculis magnis conicis.

*Enum. n.* 1094.

---

*Penes in palpis, vulvæ ad axillas, ancipitia conjugia, ubi repulsa & peracta, cum periculo vitæ fiant. Palpis clavis mares sunt, adeoque sexus, nec speciei differentia.*



*Scop. carn. n. 1094. aranea Rolandri an?*

*Hab. in arboribus rete perpendiculi.*

*In Gallia Aust. V.*

*Desc.* Maxima, ut pote ultimum articulum pollicis sæpe æquans. Differt ab omnibus figura abdominis, quæ antice quali bicornis, prominentiis valde distantibus, differt etiam colore abdominis maculato ex albo, luteo & atro. *Pedes* albo & nigro variegati. Rubedo in toto corpore nulla. *Faun. 1999.*

*Obs. 1.* Visum insectum prius perlustrat, it, redit; tandem torrente florum illud dense involvit; involucrum relinquit quietem captura. Capta nonnulla in recessu quiete; prædam exsugit. *Enum.*

*Obs. 2.* Oculis quadratis, lateralibus distantibus. V.

**Domestica. 9. A.** ( la domestique ) abdomine ovato fusco, maculis nigris quinque subcontiguïs, anterioribus majoribus. \*

*Scop. carn. 1104. aranea Derhamii.*

*Raj. inf. 27. n. 17.*

*List. aran. 59. f. 17.*

*Clerck. aran. 76. t. 2. f. 9.*

*Fab. 13.*

*De Geer tom. 7. p. 264. n. 19. t. 15.*

*f. 11, 12. vestiaria griseo-fusca, abdomine ovato tomentoso, maculis nigris marmoratis.*

*Enum. n. 1095.*

*Faun. Fridr. n. 828.*

*Hab. in fenestris & domibus frequens.*

*In foribus laxos suspendit aranea casses*  
*Virg.*

*Desc.* Caput & thorax pellucida. Abdomen pallidum, maculis oblongis, transversalibus, longitudinaliter digestis, nigris, quinis, fere contiguïs, anticis

lterioribus, versus posteriora sensim angustioribus factis. *Faun.* 2000.

- 3-Lineata. 10. A. ( la trirayée ) abdomine ovato albidō, lineis tribus longitudinalibus punctorum nigricantium. \*

*Faun. Fridr. n.* 829.

*Hab. in nemoribus.*

*Desc.* Pedes lividi, annulis nigris. *Thorax* lividus, linea longitudinali & lateribus nigra. *Abdominis* tres lineæ longitudinales ex punctis nigricantibus concatenatæ. *Faun.* 2001.

- Riparia. 11. A. ( des rivages ) abdomine ovato nigro-æneo, ano subluteo bicorni.

*It. Œl.* 145.

*Hab. in littoribus sabulosis, rete horizontali.*

- Labyrin- 12. A. ( la dédale ) abdomine ovato fusco, thica. linea exalbida pinnata, ano bifurco. \*

*It. Œl.* 251.

*Raj. inf.* 27. n. 18.

*List. aran.* 60. f. 18.

*Clerck. aran.* 79. t. 2. f. 8.

*Fab.* 30.

*Schæff. icon.* t. 19. f. 8.

*Hab.* super terram, tela horizontali cum puteo cylindrico. In Gallia Aust. V.

*Obs.* Rete extendit super gramina pratorum, horizontale, album, margine puteo cylindrico extrassiore rete contexto, in cujus fundo occultatur aranea ab avibus secura radiisque solis minus exposita; quam primum quis tangit rete, mox ex spelunca exit in spem prædæ.

*Desc.* *Thorax* griseus, lineis tribus pallidis longitudinalibus. *Abdomen* fuscum,

nitidum, linea dorsali exalbida, longitudinali, minima, strias albas oppositas pinnatim utrinque exferens. *Anus* sive cauda duplici furca seu mucronibus, superioribus inferioribus brevioribus, sub abdomine fasciis tribus longitudinalibus pallidis. *Faun.* 2003.

**4-Lineata. 13.** A. ( la quadrirayée ) abdomine subrotundo flavo, punctis quatuor lineaque utrinque purpurascens.

*Hab.* in Suecia. In Europæ domibus. In Gallia Aust. V.

*Magnitudo media.* Corpus *hyalinum*. Frons *s. area oculorum lutea*. Abdomen *pallide flavissimum*, in medio punctis 4 in quadrangulum dispositis, purpurascens; ad latera utrinque plaga *s. linea ferrugineo - purpurea*, abdomine brevior.

**Redimita. 14.** A. ( la couronnée ) abdomine oblongo-ovato flavo, annulo ovali dorsali rubro. \*

*Raj. inf.* 24. f. 12.

*List. aran.* 51. f. 12.

*Frisch. inf.* 10. t. 4.

*Clerck. aran.* t. 3. f. 9.

*Faun. Fridr.* n. 830.

*De Geer tom.* 7. p. 242. n. 11. t. 14. f. 4.-12. textoria, abdomine oblongo-ovato albo, annulo dorsali rubro.

*Schæff. icon.* t. 64. f. 8.

*Clerck. pl.* 3. t. 9.

*Hab.* in hortis. In foliis arborum plicatis Galliae Aust. V.

*Desc.* *Magnitudo muscæ.* *Pedes* satis longi, albi, diaphani, anterioribus geniculis nigris instructis. *Thorax* aqueus. *Abdomen* sulphureum, a tergo

macula annulari ovata sanguinea, intra quam linea oblonga, fulca, longitudinalis. *Faun.* 2004.

*Obs.* Nidorum amore insignis.

**Corollata.** 15. A. ( des fleurs ) abdomine ovato nigro, annulo dorsali ovali albo. \*

*It. Œl.* 126.

*Clerck. aran.* 124. t. 5. f. 13 ?

*Faun. Fridr. n.* 837.

*Hab.* in plantis.

*Desc.* Tota nigra. Abdomen ovatum; linea alba bifurca includens spatium ovale a tergo abdominis, margine interiore variis denticellis picto. *Faun.* 2005.

**Fumigata.** 16. A. ( l'enfumée ) abdomine ovato fusco, basi punctis duobus albis. \*

*Clerck. aran.* 104. t. 5. f. 6.

*Fab.* 39.

*Enum.* n. 1098.

*Pod. gr. sp.* 2.

*Faun. Fridr. n.* 832.

*Hab.* in campis; ante nidum larvarum incubans, ad exitum capit unam post alteram, exfugit, rejicit, aliam prehendit, &c. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Aranea mediæ magnitudinis. Pedes longi. Abdomen oblongum. In dorso, versus basin abdominis, puncta duo alba ovata apicibus longius a se invicem dehiscentia. *Faun.* 2006.

Species araneorum variant ætate sæpe & sexu; senectam exuunt; difficillime perfectæ in museis asservantur; plures itaque videndæ apud Listerum, Albinum, Clerckium (aranei Suecici Holm. 1757. quart.) qui ultra 60 habet. Videas, quam nulli mortalium imitabilis sit illa araneæ textura? quanti operis fila disponere; alia in rectum immissa firmamenti loco; alia in orbem currentia! Nascitur ars ista, non discitur. Senec.

Montana. 17. A. ( la renversée ) abdomine ovato albo maculis cinereis. \*

*List. aran.* 36. f. 6?

*De Geer tom.* 7. p. 251. n. 13. *resupina domestica* textoria, abdomine ovato, maculis lateralibus flavo-albidis, pedibus nigro maculatis.

*Clerck. aran.* t. 3. f. 6.

*Hab. in arboribus.* In domibus Galliae Aust. V.

*Desc. Abdomen* ovatum, lateribus niveis in dorso e cinereo & albo nebulosum, *subtus* abdomen cinereum est totum. *Thorax* & *pedes* pallidi; *anteriores* longi, quos dum tranquille sedet, recta protendit. *Faun.* 2007.

*Obs.* Oculi in quadratum dispositi.

Sanguino- 18. A. ( la sanguinolente ) abdomine ovato coccineo, linea longitudinali atra.

*Hab. in Hispania. Fr. Lögie.*

*Corpus mediocre, nigrum.* Palpi *antice cinerei.* Oculi 4 *anteriores albid.* Abdomen totum saturatissime coccineum, excepta linea longitudinali & ano nigris.

Notata. 19. A. ( la fasciée ) abdomine ovato fusco; lineis albis transversis arcuatis. \*

*Hab. in Europa.*

*Desc. Abdomen* subglobosum, magnitudine feminis erucæ, supra fuscum, macula ad basin alba subrotunda, dein ovali, tum lineari, demum lineari; utrinque lineæ 4 albæ, recurvæ. *Corpus* & *pedes* pallidi. *Faun.* 2008.

Rufipes. 20. A ( la rufipede ) abdomine fusco, pedibus rufis.

*Faun. Fridr. n.* 833.



*Hab.* frequentius in urticis. In Gallia  
Aust. V.

*Desc.* Magnitudo media ; an maior facta  
colores mutet, me fugit? *Faun.* 2009.

Nocturna. 21. A. ( la nocturne ) abdomine nigro ,  
punctis duobus albis basique lunula  
alba. \*

*Enum.* n. 1096.

*Hab.* in Europa. In domibus rara.

*Desc.* Magnitudo mediocris. *Tota* corpore  
& pedibus nigra. In medio dorso  
*abdominis* puncta duo alba minima  
vix conspicua, in singulo latere sin-  
gula ; gibbum anteriorem *abdominis*  
lineola alba anterieus cingit in modum  
lunulæ. *Anus* prominens, compressus.  
*Faun.* 2010.

Extensa. 22. A. ( la patte-étendue ) abdomine longo  
argenteo-virescente , pedibus longitu-  
dinaliter extensis. \*

*Geoff. paris.* 642. n. 3.

*Raj. inf.* 19. n. 3.

*List. aran.* f. 3.

*Fab.* 1.

*De Geer tom.* 7. p. 236. n. 10. t. 19.  
f. 1.-4. retiaria , abdomine elongato ,  
griseo-fusco , pedibus longitudinaliter  
extensis.

*Faun. Fridr.* n. 834.

*Enum.* n. 1097.

*Scop. carn.* n. 1095 aranea *Solandri* an?

*Hab.* in uliginosis , pedibus ad ramos  
arcte & longitudinaliter extensis. In  
Gallia Aust. V.

*Desc.* *Pedes* lividi. *Abdomen* subtus linea  
longitudinali atra , utrinque flava ,  
extus grisea , a tergo vero venis  
nigris. *Faun.* 2011.

*Obs.*

*Obs. 1. Pedes 4 anteriores* antrorsum ,  
*posteriores* retrorsum recta extendens,  
 inde positio singularis valdeque elon-  
 gata.

*Obs. 2. Setæ in aerem fluctuantes* ex his  
 araneis oriuntur.

*Obs. 3. Abdomen sæpe* luteo-virescens. V.

**Fimbriata. 23.** A. ( des marais ) abdomine oblongo  
 nigro, linea utrinque laterali alba,  
 pedibus fuscis. \*

*Clerck. aran. 102. t. 5. f. 9.*

*Fab. 40. nigra* linea laterali alba.

*De Gêr tom. 7. p. 278. n. 23. t. 16.*

*f. 9.-12. aranea lupus*, corpore oblongo  
 fusco; thorace abdomineque fascia  
 utrinque laterali alba, pedibus fuscis.

*Scop. carn. n. 1118. Knorrii?*

*Enum. n. 1098.*

*Pod. gr. sp. 2.*

*Hab. in aquis*, super aquas currens.

*Desc.* Satis magna est. *Pedes* subgrisei  
 sive ex pallido fusci. *Thorax & abdo-*  
*men* nigra, utrinque linea lata nigra,  
 quæ coit ad caudam. *Anus* bifurcus.  
*Palpi* apice globosi & valde magni,  
 hinc mas procul dubio: In *abdomine*  
 supra lineam lateralem albam utrinque  
 ordo longitudinalis punctorum minu-  
 tissimorum alborum. *Faun. 1012.*

*Obs. Inf. paris. n. 15. solus* citavit D.

*Fab. de synonymia* dubitandum aut  
 variat hæc aranea. In aranea *fimbriata*  
 oculi diverse dispositi ac in aranea  
*D. Geoff.* insuper puncta abdominis alba  
 non prætermisisset *D. Geoff.*

**Sexpunctata. 24.** A. ( la 6 ponctuée ) abdomine oblongo,  
 punctorum excavatorum paribus tribus. \*

*Fab. 35.*

*Insect. Tomus IV.*

G

*Enum. n. 1100.*

*Pod. gr. p. 123.*

*Faun. Fridr. n. 835.*

*Hab. in sylvis acerosis. In Galliæ Aust. foliis pini abietisque. V.*

*Desc. Inter majusculas numeranda est.*

*Thorax cinereus. Abdomen ovato-oblongum, teretiusculum, pilis glaucis, aliis rarioribus nigris; in tergo abdominis tria paria punctorum excavatorum conspiciuntur. Faun. 2013.*

**Bimacula-25. A. ( la bimaculée ) abdomine subrotundo castaneo, punctis duobus albis.**

*Hab. in Europa.*

*Corpus pulice minus, totum castaneum s. obscure testaceum. Abdomen ovatum, depressiusculum, inæquale, maculis 2 albis, anteriore majore ex binis punctis albis connatis; posteriore fere minore, etiam e binis punctis albis conflatis.*

**Quadri-26. A. ( la quadriponctué ) abdomine punctata. oblongo nigro, punctis quatuor excavatis. \***

*It. Œl. 34.*

*Fab. 23. abdominis dorso plano nigro, punctis excavatis quatuor.*

*Hab. in fenestris. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Thorax fuscus. Abdomen nigrum, pilis cinereis. Pedes ferrugineo-fusci. Anus appendiculis 5 vel 6 subulatis truncatis. Faun. 2014.*

**Holoferi-27. A. ( la satinée ) abdomine ovato-oblongo holofericeo, basi subtus punctis duobus flavis. \***

*Raj. inf. 31. n. 23.*

*List. aran. 71. f. 23.*

*De Geer tom. 7. p. 266. n. 20. t. 15.*

*f. 13.-16.* griseo - murina , abdomine ovato oblongo villoso , basi subtus maculis binis flavescens.

*Faun. Fridr. n. 836.*

*Enum. n. 11.1.*

*Hab. in Europa* , intra folia convoluta plantarum. In Gallia Aust. domibus subque arborum cortice.

*Desc. Corpus* totum , caput , pedes , thorax fusco-livida , hirsuta ; *pedes* insuper pilis adspersi. *Forceps oris* robusta. *Abdomen* ovato-oblongum , atrum , holosericeum s. impalpabili hirsutiae tectum , apice duobus appendiculis truncatis ; sub abdomine juxta basin duo tubercula flava adeoque *A. aquaticae* simillima , sed dimidio minor & terrestris longeque minori forficula oris. *Faun. 2015.*

*Obs. Faemina* mare major pedesque longiores.

**Senoculata. 28.** *A. ( à six yeux )* oculis tantum senis.

*List. aran. 74. f. 24.*

*Raj. inf. 32. n. 24.*

*Fab. 49.* abdomine virecente , lateribus flavis.

*Scop. carn. 1119.* Hombergii ?

*De Geer tom. 7. p. 258. n. 18. t. 15.*

*f. 5.-10.* textoria , abdomine ovato-oblongo griseo , fascia longitudinali laciniosa fusca , thorace fusco.

*Faun. Fridr. n. 837.*

*Hab. in Europa.* In Germaniae & Galliae Aust. hortis. *Fab. V.*

*Desc. Caput* , thorax & pedes pallide ferruginea. *Pedes* tertii paris breviores , reliqui aequales. *Abdomen* virecens , linea laterali flavicante , punctis quinque nigris. Puncta quatuor nigra

dorso impressa & infra hæc maculæ quatuor pallidæ, obsoletæ. *Anus sanguineus. Fab.*

*Obs.* Singulare quod sex oculis tantum gaudeat hæc aranea. Primus hanc observavit *Lister*. Similem aut eandem memoravit *Hombert a.d. acad. paris. 1707.* Hujus speciei forceps longa crassaque. *Mas* foemina minor pedesque longiores.

\* \*

*Tarentula. 29. A. ( la tarentule )* subtus atra, pedibus subtus atro fasciatis.

*Bagliv. Tarentula ( monographia ).*

*Bocc. mus. 1. p. 101. t. 2. tarentula.*

*Bradl. nat. t. 24. f. 10.*

*Olear. mus. 21. t. 12. f. 4.*

*Fab. 45.* abdominis dorso maculis trigonis nigris, pedibus nigro maculatis.

*Hab. in Italia, imprimis in Apulia, Barbaria, Oriente.*

*Corpus cinerascens. Oculi 8 : horum 2 majores, rubri, frontis; 4 ordine transverso sub prioribus versus os; 2 remotiores in tergo. Thorax cinereus, divisus in areas nigras, ad centrum concurrentes. Maxillæ, pectus, femorum basis ventrisque anterior pars subtus atra. Tibiæ omnes cinereæ, subtus nigro fasciatæ. Abdomen helvolum, supra nigro fasciatum.*

*Rabida sub canicula morfu excitat famosum tarantismum musica medendum.*

*Species hujus plures sistunt authores; quæ accuratius inquirendæ, & distinguendæ, cum colore diversæ forte etiam specie differant.*

---

*Araneæ fila nunt, plurimæ retia, diversa diversis, nec simplicia, quibus piscantur insecta, imprimis teneriora; at ultimæ \*\* fila ducunt tantum prout incedunt per integram vitam.*



*Obs.* Quot de hujus aranæ morfu fabulæ narrantur ! V.

Scenica. 30. A. ( la parée ) faliens nigra , lineis semicircularibus tribus albis transversis.\*

*List. aran. f.* 31.

*Raj. inf.* 37. n. 31.

*Bradl. nat. t.* 24. f. 5

*Clerck. aran.* 117. t. 5. f. 13.

*Geoff. paris.* 2. p. 650. n. 16.

*Fab.* 42.

*De Geer tom.* 7. p. 287. n. 27. t. 17.

f. 8. - 10. aranea - phalangium ( albo fasciata ) nigra , abdomine oblongo , fasciis tribus transversis semicircularibus.

*Schæff. icon. t.* 44. f. 11.

*Enum. n.* 114.

*Faun. Fridr. n.* 838.

*Hab.* in parietibus. In arborum truncis , prope Lugdunum frequens. V.

*Desc.* Supra nigra , grisea infra. *Thorax* linea alba marginatus , maculis tribus albis in triangulum dispositis. *Abdomen* tribus fasciis albis transversis fere semicircularibus , in dorso fere interruptis. *Pedes* nigri pilis albis , inde grisei apparent. Saltat saltuque prædam rapit. Oculorum unum par ita minutum , ut vix ope lentis visibile.

*Obs.* Nidum ovale construit.

Truncorum. 31. A. ( des troncs ) faliens nigra , dorso punctis albis.

*Scop. carn.* 1115. an ? Olearii ?

*Enum. n.* 1105.

*Hab.* in parietibus , truncis.

*Desc.* Saltatrix. Oculorum par tertium minutissimum. Oculi primi paris magni , iride lutea. Supra insectum coloris est

cinerei. *Pedes primores* crassi. *Antennarum* clavæ subtus adpendiculatæ. *Enum.*

Rupestris. 32. A. ( des pierres ) saliens , abdominis macula nigra , margine rubra , medio alba. \*

*Enum. n.* 1106.

*Hab. in* parietibus , lignis.

*Desc.* Macula dorsalis ovalis nigra margine rubra & in centro sive medio alba. *Faun.* 2019.

Aquatica. 33. A. ( l'aquatique ) livida , abdomine ovato , linea transversa punctisque duobus excavatis. \*

*Clerck. aran.* 143. t. 6. f. 8.

*Geoff. paris.* 2. p. 645. n. 7.

*Fab.* 32. fusca , abdomine ovato cinereo , dorso fusco , punctis duobus impressis.

*De Geer tom.* 7. p. 303. n. 33. t. 19. f. 5.-13. aquatica f. nigro-fusca.

*Mémoires pour servir à l'histoire des araignées aquatiques.* Paris , 1749.

*Faun. Fridr.* n. 839.

*Hab. in* aquis Europæ dulcibus , urinatoria. Hybernât in vacuis cochleis , quas rete artificioso claudit. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Est inter maximas generis sui. *Tota* livida sive fusco-pallida. *Abdomen* ovato-oblongum , cinereum , ano obtuso seu truncato , duobus appendiculis ; a tergo gibbum , versus basin linea excavata transversa notatum & sub hac duobus punctis excavatum. *Pedes* longi ; *tibiæ* versus basin velut geniculatæ. *Oris forceps* omnium aranearum nostrarum maxima , nigra , dura , hians , saepe mordens , at arripiens objecta ; verbo ,

oris forcipe omnino tarentulam refe-  
rens. Hinc si quæ alia, hæc certe  
venenata, ex colore, struatura, figura  
oris, &c. *Faun.* 2020.

*Obs.* 1. Non supra aquam sed in & sub  
aqua habitat. *Linn.*

*Obs.* 2. *Mas* fœmina major. Dum natat,  
argentea adparent thorax abdomenque,  
atmosphæra enim aerea has partes  
tegit. Campanulam sericeam in aquis  
habitat; sed aeream & in qua non  
pervenit. Artificio mirabili anum extra  
aquas extendit, bullam aeream ano  
adhærentem in aquas ducit, dein in  
campanam ex qua aqua necessario  
egreditur. *D. de Geer.*

Saccata. 34. A. ( la porte-fac ) abdomine ovato fer-  
rugineo fusco.

*List. aran.* 82. f. 28.

*Frisch. inf.* 8. t. 2.

*Fab.* 38.

*Enum.* n. 1107.

*Scop. carn.* 1116. aranea Lyonetti.

*Geoff. inf. paris. tom.* 2. p. 650. n. 15.  
tota cinereo villosa, thoracis linea  
triplici alba.

*Müll. Lin. Nat. cl.* v. p. 1084.

*Hab.* in terra, circumferens ubique fac-  
cum suum ovorum.

*Desc.* Color multum variat, sed *thorax*  
supra longitudinaliter pallidior est.  
Ad angulum baseos *abdominis* superne  
fasciculus pilorum alborum antrorsum  
porrectus. *Enum.*

Palustris. 35. A. ( des prés marécageux ) abdomine  
oblongo nebuloso, lineis lateralibus  
albis. \*

*Fab.* 31. fusca, thorace abdomineque utrinque linea nivea.

*Scop. carn.* 1093. aranea Listeri an?

*Faun. Fridr.* n. 844.

*Hab.* in paludibus cespitosis exsiccatis, affinis *A. saccata*. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Thorax aliis niger, aliis utrinque linea alba longitudinaliter notatus. Abdomen nigrum, maculis nigerrimis quasi nebulosum. *Faun.* 2023.

*Obs.* Affinis *A. fimbriata*, at oculorum situ omnino differt. Apex thoracis ante oculos terminatur linea nivea. *Fab.*

Virefcens. 36. A. ( la verdâtre ) abdomine oblongo flavo-viridi, lineis lateralibus albis. \*

*Jonst. inf. t.* 18. f. 42.

*Enum.* n. 1108.

*Faun. Fridr.* n. 841.

*Hab.* in hortis. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Oculi octo nigri viridesve, æquales; parvi. Color virefcens; linea diaphana longitudinalis per totum corpus aut obscurior. Sæpe hæc species candida est. Objecta insecta absque filis necat & devorat. *Enum.*

Viatica. 37. A. ( la voyageuse ) abdomine subrotundo plano obtuso, pedibus quatuor posticis brevissimis. \*

*Raj. inf.* 35. n. 29.

*Frisch. inf.* 7. t. 5.

*Clerck. aran.* 128. t. 6. f. 5.

*List. aran.* f. 29.

*Geoff. parif.* 2. p. 641. n. 1.

*Fab.* 12.

*De Geer tom.* 7. p. 301. n. 31. t. 18. f. 23, 24. *cancroides*, grisea s. fusca, abdomine ovato plano, fascia laterali nigro-fusca lineaque albida.



*Schæff. icon. t. 189. f. 7.*

*Enum. n. 1109.*

*Faun. Fridr. n. 842.*

*Hab. in arboribus, lignis, ovis incubans.*

*Desc. Corpus breve, depressum. Maris abdomen griseum, maculis fuscis, foeminae luteo-fuscum, in utroque sexu linea alba lateraliter marginatum. Oculi nigri.*

*Lævipes. 38. A. ( la tigrée ) abdomine rhombeo depresso, pedibus transversaliter extensis variegatis. \**

*Frisch. inf. 10. t. 14.*

*Fab. 16.*

*Clerck. aran. t. 6. f. 3.*

*De Geer tom. 7. p. 302. n. 32. t. 18.*

*f. 25. cancroides, abdomine obtuso plano albido, maculis nigris, pedibus quatuor posticis brevioribus.*

*Hab. in truncis, parietibus.*

*Desc. Cinerea, mediæ magnitudinis. Abdomen rhomboides s. depressum, pone rotundatum, ano acutiusculo. Pedes transversim expanduntur, remotiusculi, fusci, annulis albis; filum sæpe post se trahit. Pedes 2, 1, 3, 4 longitudine se excipiunt. Faun. 2025.*

### *Ex Entom. Carn.*

*Reaumurii. 39. A. ( la Réaumur ) abdomine subrotundo, turgido valde, albido, lateraliter flavescente, supra tredecim paribus punctorum nigrorum impressorum, subtus unico.*

*Hab. in Europa, in folio inulæ helenii convoluto.*

*Desc. Maxima, ventricosa, ventre crasso post mortem crepante, subvillosa.*



*Papillæ* nigræ. *Thorax* lineis tribus fuscis.

*Pedes* pallidi, geniculis nigris. Immerſa ſpiritui vini, vixit decem minuta.

*Palpi* A. *diadematis*.

Swammer-40. A. (la Swammerdam) fulceſcens, thorace abdomineque albis pilis marginatis, pedibus longis, tibiis teſtaceo-ſaſciatis.

*Hab.* in Europa.

*Deſc.* *Facies* araneæ *Friſch. inf. 12. t. 13*, ſed oculi laterales non diſjuncti. *Abdomen* ovatum cum thorace villoſum, margine linea repanda albida, in medio foveis rotundis nitidis binis. *Femora antica* longiora tota fuſca; alia baſi teſtacea. *Pedes* *antici* unicam & lineam unam longi.

Raji. 41. A. (la Rai) abdomine ovato fuſco, maculis didymis dorſalibus & quinque aliis in ſingulo latere flavis.

*Hab.* in Europæ arboribus.

*Deſc.* *Rete* laxum obliquum, cui loco putei eſt folium ab aranea convolutum. *Palpi* articulis pluribus. *Thorax* fulvus. *Abdomen* quatuor fere lineas longum, tres craſſum, baſi ſubtus arcu flavefcente maculisque duabus flavis clavatis. *Pedes* fulvo fuſcoque varii.

Leuwen-42. A. (la Leuwenhoeck) fuſco - ruſa, abdomine ovato, ſupra ad baſin macula ovata fuſca, ſubtus ibidem pari uno punctorum albidorum.

*Hab.* in Europæ gramineis, primo vere.

*Deſc.* *Palpi* æquales. *Corpus totum* lineas  $3 \frac{1}{2}$  longum. *Thorax* fulceſcens. *Pedes* fuſco-ruſi.

- Aldrovand-43.** A. ( l'Aldrovande ) fulva , abdomine subrotundo , fovearum paribus quinis , fasciis quatuor fuscis , una interrupta.  
*Hab.* in Europæ collibus , inter frutices.  
*Desc.* *Palpi* æquales. *Abdomen* lin. 2 longum , prope basin lineis binis arcuatis , obliquis , oppositis , albidis. Puncta impressa insident fasciis integris , quibus contiguum est punctum luteum.
- Redii. 44.** A. ( la Redi ) rufa , abdomine ovato , fasciis sex fuscis , primis duabus remotioribus punctoque albo in medio signatis.  
*Hab.* in Europæ sylvis.  
*Desc.* *Palpi* æquales. *Abdomen* lig. I  $\frac{1}{2}$  longum , basi lineam latam , *subtus* punctis duobus albis posticis.
- Merianæ. 45.** A. ( la Mérian ) fusca , abdomine ovato , pedibus pallidioribus , fusco fasciatis punctatisque.  
*Hab.* inter Europæ muscos , præsertim hypnum complanatum.  
*Desc.* *Abdomen* lineam cum dimidia longum , parvis villis pubescens. *Thorax* pedibus concolor. *Palpi* æquales , fusco fasciati vel punctati. *Femora* versus genua fasciis duabus , versus basin nonnullis punctis fuscis. *Tibiæ* fasciis quatuor fuscis.
- De Geeri. 46.** A. ( la de Geer ) abdomine albido elliptico , fasciis arcuatis flavis lineisque tribus nigris.  
*Hab.* in Europæ plantis.  
*Desc.* *Thorax* cornei coloris , margine laterali fusco. *Palpi* æquales. *Abdomen* duas lineas vix longum , superne

lineolis tribus parvis anticis quatuor-  
que lateralibus obliquis, *subtus* nigro-  
flavoque varium. *Pedes* pilosi, colore  
thoracis.

Frischii. 47. A. ( la Frisch ) flavicans, abdomine  
ovato, punctorum nigrorum paribus  
quinque sub marginalibus.

*Hab.* inter Europæ corylos, Majo M.

*Desc.* *Thorax* concolor pedibus sordide  
flavescentibus. *Palpi* clavati. *Abdomen*  
viridi-luteum, punctis binis pallidio-  
ribus in dorsi medio, *subtus* apice  
macula rubra notato. *Variat* thorace  
lateribus margine fusco, *pedibus* fulvis  
articulis nigris, *tibiis* fascia nigra.

Rœselii. 48. A. ( la Rœsel ) thorace rufescente,  
linea media dorsali & lateribus albidis,  
abdomine oblongo supra nigricante,  
punctorum albidorum albescentium ob-  
soletorum paribus quatuor.

*Hab.* in Europæ graminibus.

*Desc.* *Palpi* æquales. *Papillæ* textoriæ  
superiores longiores. *Pedes* fusces-  
centes.

*Obs.* Rete parat horizontale, puteo obli-  
quo longo ad terram usque producto,  
cui cadavera concredit.

Gœdartii. 49. A. ( la Gœdart ) fusca, abdomine  
ovato, lateribus albidis, pedibus rufis  
fusco fasciatis.

*Hab.* in Europæ pratis.

*Desc.* Non confundenda cum A. *hypno-*  
*rum*, hujus enim rete perpendicu-  
lare est.

Albini. 50. A. ( l'Albin ) abdomine ovato nigro,  
linea alba laterali, pedibus rufis.

*Hab. in Europæ ericetis.*

*Desc. Palpi* æquales, punctum rufum ad basin abdominis inter extremitates linearum albarum lateralium conni-ventes. Rete horizontale, sparsum, absque puteo. Aranea sub reti in medio quiescente.

*Obs.* Aranearum species luridæ, ingratae nec adhuc rite determinatæ. Varietates, metamorphosis & sexus plures adhuc reducendæ, at nomen viri de scientia bene meriti in Entomologia deleatur; nomina enim hæc trivialia minime placent. *Fab.*

Clerckii. 51. A. ( la Clerck ) abdomine subrotundo, duobus paribus punctorum impressorum.

*Hab. in Europa*, inter folia plantarum.

*Desc.* Duas lineas longa. *Palpi* æquales.

*Abdomen* villosulum, subtus ad lentem sublividum.

Malpighii. 52. A. ( la Malpighi ) palpis clavatis petiolatis, petiolo abdominis longitudine, maxillis longis, falcatis, tenuibus.

*Hab. in Europæ domibus.*

*Desc. Oculi* medii antici protuberantes.

*Abdomen* ovatum fuscum, villosum, punctis 4 albidis, obsoletis, longitudinalem seriem facientibus. *Pedes* villosi, pallidiores, geniculis fuscis.

Schæfferi. 53. A. ( la Scheffer ) fusco-rufa, thoracis abdominisque lateribus albidis.

*Hab. in Europæ gramineis.*

*Desc. Palpi* æquales. *Abdomen* oblongum, subtus fusco-ferrugineum, superne paullo obscurius, linea albida a basi ad apicem excurrente. *Pedes* fuscescentes, pilosi; *postici* lineas 8.-9



longi. *Oculi* seriei posticæ majores omnes.

Mouffeti. 54. A. ( la Mouffet ) abdomine cylindrico subargenteo, linea media fusca, lateribus luteis.

*Hab.* in Europa, inter frutices.

*Desc.* *Thorax*, *pedesque* testacei. *Palpi* clavati *Maxillæ* longæ, crassæ. *Abdomen* pallide argenteum, lineis lateribus repandis aquosissime luteis: idem in medio lineam impressam habet, cui antice incumbit alia transversa crucem faciens.

Forskælii. 55. A. ( la Forschael ) cinerascens, abdomine ovato, macula lanceolata nigra, thorace antice rugis tribus.

*Hab.* in apricis collibus Carniolæ Superioris.

*Desc.* *Oculi* medii seriei posticæ valleculis plicarum impositis. *Palpi* æquales.

Petiverii. 56. A. ( la Pétiver ) nigra, abdomine ovato.

*Hab.* in Europæ herbidis sylvestribus. Martio M.

*Desc.* *Palpi* æquales. *Abdomen* basi planiusculum foveola notatum.

Osbekii. 57. A. ( l'Osbek ) albida aut lutea, abdomine punctorum impressorum paribus duobus & tribus cum impare majore ad basin.

*Enum.* n. 1110.

*Hab.* in umbellis angelicæ - archangelicæ & heraclei sphondylii.

*Desc.* Hæc deorsum se demittens, *pedes* longiores expansos & deflexos tenet, cæteros vero contractos; eadem vitæ



adeo tenax, ut acu transfixa vixerit a die 27 Julii ad 6 Septembris. Habitus A. *Calycinæ*, sed colores diversi. *Abdomen* subtus inter papillas & basin sex paribus punctorum exiguorum impressorum.

Kalmii. 58. A. ( la Kalm ) fuscescens, abdomine ovato, lateribus fasciisque abruptis albis.

*Hab. in Europæ sylvis.*

*Desc. Palpi clavati. Dorsum lineis duabus albidis postice coeuntibus. Irritata retroit ut cancer.*

Hasselquisti. 59. A. ( l'Hasselquist ) virens, abdomine albo-luteo, lateribus fuscescentibus.

*Hab. in Europa, in cortice pruni hortensis, M. Aprili.*

*Desc. Palpi æquales. Oculi nigri. Abdomen ovatum. Tibiæ punctis nigris piliferis.*

Udmani. 60. A. ( l'Udmann ) flava, abdomine fulvo.

*Hab. in Europa. Inter frutices; rarior.*

*Desc. Abdomen ovatum lineam longum.*

Jonstoni. 61. A. ( la Jonston ) thorace pedibusque testaceis, maxillis longis, crassis nigris, abdomine oblongo subfusco.

*Hab. in sylvestribus Carnioliae.*

*Desc. Oculi medii antici majores. Abdomen villosum, subtus pallidius, supra punctis binis impressis.*

Wilkesii. 62. A. ( la Wilkes ) cinereo nigroque varia, pedibus cinereis, nigro annulatis.

*Enum n. II. III.*

*Hab.* in Europæ herbidis collibus ;  
*Aprili M.*

*Desc.* *Thorax* antice macula laterali utrinque nigra. *Palpi* nigro annulati, æquales. *Abdomen* ovatum, paribus tribus punctorum nigrorum & fulco antice exaratum.

Roberti. 63. A. ( la Robert ) abdomine oblongo villoso fusco-rubro, basi subtus punctis binis flavescentibus.

*Hab.* in Europæ pratis.

*Desc.* *Palpi* æquales.

Sloanii. 64. A. ( la Sloane ) nigra, abdomine subrotundo rubro, macula media lanceolata nigra.

*Pod. gr. p.* 123. aranea chrysops.

*Hab.* in Europa, circa hortos & agros.

*Desc.* *Palpi* clavati. *Abdomen* petiolo brevissimo nitido. *Tibiæ* supra obscuro quodam rubore tinctæ, subtus nigrae. Statura A. *saccifera*. Hæc una cum fororibus, palpos continuo movet, inquieta, antice retroque incedens, saltu ab hoste fugiens, rete non extruens; in saxosis habitat.

Catesbæi. 65. A. ( la Catesby ) tota cinerea pubescens, thoracis dorso fusco, abdomine ovato fusco, lineis dorsalibus binis longitudinalibus albis.

*Hab.* in muris siccis, s. faxis prata sepientibus.

*Desc.* Statura prioris. *Palpi* æquales. *Abdomen* subtus fordide flavum. *Papillarum* regio nigra.

Rumphii. 66. A. ( la Rumphius ) griseo fuscoque varia, abdomine elliptico, linea albida

albida dorsali , margine utrinque dentata.

*Hab. in Europæ truncis arborum.*

*Desc. Caput* inter oculos fulvum, subtus fulvis pilis. *Abdomen* barbatum subtus ad latera fuscum.

Margravii. 67. A. ( la Margrave ) corpore fusco ; palpis pedibusque nigris, lineis duabus transversis albis palpos inter & oculos.

*Hab. in Europæ plantis.*

*Desc. Minor prioribus. Palpi* clavati. *Oculi* virore aliquo tincti. *Abdomen* ovatum, immaculatum, absque foveis.

Blancardi. 68. A. ( la Blancard ) thorace abdomine-  
que pallide rufescentibus, utriusque margine albo, pedibus albo nigroque variis.

*Hab. in Europæ sylvis.*

*Desc. Thorax* antice & lateribus albus, postice niger. *Abdomen* ovatum, subtus ad latera nigricans.

Joblotii. 69. A. ( la Joblot ) nigra, abdomine fascia femoribusque rufis.

*Hab. in Europa.* In convolutis foliis latet per totam hiemem. Reperi etiam in cotyla glandis tela tecta sub qua latebat.

*Desc. Statura & habitus formicæ minoris. Palpi* clavati, clava pilosa oblonga. *Abdomen* oblongum lucidum subtus fascia pallidiore villosa. *Femora* pallide rufescentia.

Podæ. 70. A. ( la Poda ) fusco - rufa, maxillis crassis, nitidis, nigricantibus, abdomine ovato, in uno sexu superne albido maculato.

*Hab. in Europa. Currit per herbida loca, non infrequens.*

*Desc. Stratura A. Saccata. Palpi æquales. Corpus villosum. Abdomen subtus pallidum.*

*Ex oper. D. de Geer.*

Aurantio-71. A. ( l'orangée ) retiaria, abdomine maculata. globofo flavo, venis fuscis maculisque aurantiis magnis foliaceis. *tom. 7. p. 222. n. 3. t. 12. f. 16, 17.*

*Clerck. aran. t. 1. f. 6.*

*Hab. in falice.*

*Desc. Oculi quadrati, duobus utrinque separatis. Caput, thorax, pedes, brachia griseo-alba, maculis strigisque obscuris. Thorax subtus niger. Abdomen aurantium, lineolis fuscis hastatum, macula rubro aurantia longitudinali laterali maculisque rubris dorsalibus.*

Quadrima-72. A. ( la quadrimaculée ) retiaria, abdomine globofo, virescente s. rufo, dorso maculis quatuor magnis plurimisque minoribus niveis. *tom. 7. p. 223. n. 4. t. 12. f. 18.*

*List. aran. t. 27. f. 8.*

*Clerck. aran. t. 1. f. 3.*

*Hab. in Europa. Frequens in Junioribus pinis. Rete verticali.*

*Desc. Caput, thorax pedesque grisea, nigro maculata. Thorax supra fasciis tribus longitudinalibus nigris. Abdomen virescens vel cinereo-Margaritaceum, maculis quatuor albis in quadrum dispositis, anterioribus propioribus. Inter has maculas, aliæ minores albæ longitudinaliter ordinatæ. Oculi nigri in quadrum dispositi, lateralibus fere con-*

tiguis. *Pedes* intermedii breviores ;  
*antici* omnibus longiores.

Cicatrico-73. A. ( la cicatrisée ) retiaria , abdomine  
 fa. globofo , nigro-fusco , punctis griseis ,  
 dorso maculis excavatis nigris. *tom.* 7.  
*p.* 225. *n.* 5. *t.* 12. *f.* 19.

*Hab.* in Europæ muris.

*Desc.* Inter maximas numeranda. *Thorax*  
 fuscus. *Abdomen* maculis excavatis ni-  
 gris , macula postica nigra dissecta ,  
 subtus in medio macula magna nigra ,  
 strigis lateralibus griseis nigrisque. *Pedes*  
 albido nigroque alternatim maculati.

Tubercu- 74. A. ( la tuberculée ) retiaria , abdomine  
 lata. fusco , nigro alboque variegato , tuber-  
 culis binis dorsalibus convexis. *tom.* 7.  
*p.* 226. *n.* 6. *t.* 13. *f.* 1.-15.

*Hab.* in Europa. In Gallia Aust.

*Desc.* *Abdomen* supra tuberculis magnis  
 duobusque minoribus , tubercula inter  
 & anum plicatum. Nidi ovato-globosi ,  
 filo sericeo suspensi.

Conica. 75. A. ( la conique ) retiaria grisea , tho-  
 race nigro , abdomine postice conico ,  
 maculis binis laciniatis fuscis. *tom.* 7.  
*p.* 231. *n.* 7. *t.* 13. *f.* 16.-20.

*Hab.* in Europæ sylvis.

*Desc.* *Thorax* nitidus , niger. *Abdomen*  
 maculis undisque fuscis , in parte antica  
 gibbum , postice acuminatum. *Oculi*  
 nigri , lateralibus non contiguis. *Papillæ*  
 textoriæ nigrae ultra conum positæ.

Fusca. 76. A. ( la brune ) retiaria fusca , maculis  
 nebuloso - nigris , abdomine ovato ,  
 pedibus longissimis maculatis. *tom.* 7.  
*p.* 235. *n.* 9. *t.* 11. *f.* 9.



*Hab. in Europa. In latrinis Galliae Aust. non rara. V.*

*Desc. Abdomen marmoratum subtus, fasciis duabus longitudinalibus sulphureis. Pedes fulvo nigroque variegati, primi quatuor longissimi; postici minus longi; 5 & 6 breviores. Tarsa, pedes abdomen contra applicat. Maris abdomen parvum & elongatum. Oculi æquales.*

Resupina- 77. A. ( la renversée sauvage ) textoria, abdomine ovato, maculis fasciisque angulatis fuscis albisque, pedibus immaculatis. *tom. 7. p. 244. n. 12. t. 14. f. 13.-22.*

*Hab. in Europæ cespitibus, pinis, juniperis. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Parva. Thorax rufescens, linea longitudinali nigra antice furcata, aliaque utrinque laterali nigra. Abdomen ovato-globosum, maculis fasciisque dissectis albis fuscisque, subtus nigricans, lateraliter album maculis fuscis irregularibus. Pedes anteriores omnibus aliis longiores. Oculi ut in præcedentibus; quinque in macula nigra positi. Mas foemina diversus.*

Viridissima. 78. A. ( la verte ) textoria viridis, abdomine oblongo, flavescente. *tom. 7. p. 252. n. 14. t. 18. f. 6.-16.*

*Clerck. aran. t. 6. f. 4.*

*Hab. in Europa, in foliis betulae capta. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Tota, abdomine excepto, viridis. Thoracis latera luteo marginata. Abdomen luteo-virescens, linea longitudinali viride laminaque squamosa nigra in foeminae genitalibus. Oculi*

pilis albis cincti, transverse positi duas lineas formant. *Posteriores* anterioribus majores.

Atrox. 79. A. (l'atroce) textoria, abdomine ovato fusco, supra macula nigra oblonga flavedine cincta. *tom.* 7. *p.* 253. *n.* 15. *t.* 14. *f.* 24.

*List. aran. tit.* 21. *f.* 21. nigricans prægrandi macula nigra in summis clunibus, cæterum iisdem imis oblique virgatis.

*Hab.* in Europæ murorum cavitatibus. In Gallia Aust. V.

*Desc.* *Thorax* fuscus. *Abdomen* basi macula nigra parallelogrammatica sulfureo-albido cincta. *Pedes* antichi longiores; 5, 6 breviores. *Oculi* lunares, lunula inferiori sex composita, duobus aliis superioribus. *Mas* fœminæ fere similis.

Albo- 80. A. (la 8-maculée) textoria, nigro-  
Maculata. fusca, abdomine globoso, fascia angulata maculisque octo albis. *tom.* 7. *p.* 257. *n.* 17. *t.* 15. *f.* 2.-4.

*Hab.* in Europa. In ripis maris Baltici sub lapidibus capta.

*Desc.* *Abdomen* fere sphæricum, maculis octo albis inæqualibus; 3, 4 majores, lateribus albo dentatis.

Rufo- 81. A. (la fasciée) abdomine elongato, fasciata. griseo-fusco, fascia longitudinali undata rufa, pedibus longissimis. *tom.* 7. *p.* 269. *n.* 21. *t.* 16. *f.* 1.-8.

*Schæff. icon.* t. 172. *f.* 6.

*Hab.* in Europæ sylvis.

*Desc.* *Caput* fere trigonum. *Thorax* rundatus, antice truncatus, cinereus,

linea longitudinali flava lateraliter marginata. *Abdomen* obtuso-conicum, in medio macula elongata undata, luteo-fulva, striga fusca marginata. *Tota* pilosa. *Pedes* longissimi. *Oculi* 4 in quadrum inæquale dispositi. Quatuor alii lineam ante quadrum formant. Non textoria.

**Littoralis. 82. A.** ( des rivages ) abdomine ovato nigro pedibusque griseo maculatis. *tom.* 7. *p.* 274. *n.* 22. *t.* 15. *f.* 17.-23.

*List. aran. t.* 25. *f.* 25.

*Clerck. aran. t.* 4. *f.* 7.

*Hab.* in Europæ locis humidis. In Gallia Aufst. V.

*Desc.* Nigra. *Thorax* abdomenque maculis griseis punctisque albis pilosis. *Thorax* lineis tribus longitudinalibus griseis. *Saccus* ovorum ano ligatus.

**Marginata. 83. A.** ( la bordée ) corpore oblongo fusco, pedibus viridibus, thorace abdomenque fascia utrinque laterali alba. *tom.* 7. *p.* 281. *n.* 24. *t.* 16. *f.* 13.-15.

*Clerck. aran. t.* 5. *f.* 1.

*Hab.* in Europæ plantis arboribusque.

*Desc.* *Thorax*, *abdomen* elongato-ovatum, fascia alba lateraliter nigra, marginata. *Pedes* crassii griseo virides.

**Ruricola. 84. A.** ( la campagnarde ) corpore ovato griseo-fusco obscuro, thorace abdomenque antice fascia longitudinali rufescente. *tom.* 7. *p.* 282. *n.* 25. *t.* 17. *f.* 1, 2.

*Clerck. aran. t.* 4. *f.* 11.

*Hab.* in Europa.

*Desc.* *Thorax* lateraliter rufescens. *Fascia*

rufescente in medio. *Abdomen* antice simili fascia acuminata, lateraliter maculis parvis rufescentibus marmoratum. *Pedes* fusci, *femoribus* fasciatis. *Papillæ* textoriæ acuminato-elevatæ.

Pini. 85. A. ( du pin ) aranea-phalangium, griseo-nigra, abdomine punctis duobus albis, pedibus fuscis nigro maculatis. *tom.* 7. *p.* 285. *n.* 26. *t.* 17. *f.* 3.-7.

*List. aran. tit.* 32. *f.* 32.

*Clerck. aran. t.* 5. *f.* 11.

*Hab.* in Europæ pinis.

*Desc.* Griseo-nigra. *Thorax* caputque fere quadrata. *Abdomen* ovatum, hirsutum, subtus fasciis tribus longitudinalibus nigris. *Pedes* breves, crassi.

Grossipes. 86. A. ( la crassipede ) nigra, capite antice lineis transversis albidis pilosis, pedibus anticis crassioribus. *tom.* 7. *p.* 290. *n.* 28. *t.* 17. *f.* 11.-14.

*List. aran. tit.* 33.

*Clerck. aran. tit.* 6. *f.* 1.

*Hab.* in Europæ sepibus.

*Desc.* Nigra. *Caput thoraxque* ovata supra depressa. *Abdomen* lateraliter fuscorufum. *Pedes antici* aliis longiores, *femoribus* crassis, *tibiis* crassiusculis.

Formica- 87. A. ( la fourmi ) aranea-phalangium, rufa, capite magno nigro, abdomine oblongo rufo, fasciis nigris maculisque binis albis. *tom.* 7. *p.* 293. *n.* 29. *t.* 18. *f.* 1.-5.

*List. aran. tit.* 34.

*Hab.* in Europa.

*Desc.* *Caput* prominens, nigrum. *Thorax* fuscus capitis longitudine; sed minus lator. *Abdomen* petiolatum, fusi-

forme. *Pedes posteriores* longiores ; 4 & 5 breviores. *Oculi* nitentes parabolicam lineam formant.

Citrea. 88. A. ( la citronée ) aranea-cancroides , lutea , abdomine subrotundo plano , fascia utrinque rubra , pedibus quatuor posticis brevissimis. *tom.* 7. *p.* 298. *n.* 30. *t.* 8. *f.* 17.-22.

*Geoff.* *tom.* 2. *p.* 642. *n.* 12. *t.* 21. *f.* 1. citrino-lutea , pedibus quatuor posticis brevissimis , abdomine utrinque fascia ferruginea.

*Clerck. aran.* *t.* 6. *f.* 5.

*Schæff. icon.* *t.* 19. *f.* 13.

*Hab.* in Europæ arboribus.

*Desc.* Incessus cabronum. Luteo-citrina. *Abdomen* breve rotundatum , supra depressum , striga rubra laterali non ultra medium protensa. *Pedes* quatuor posteriores aliis tenuiores brevioresque. *Oculi* ignei in lunula positi.

*Obs.* Variat. *Abdomen* aliquoties totum citreum s. absque strigis rubris.

*Ex spec. D. Fab.*

Latens. 89. A. ( la cachée ) atra , abdomine cinerascens , linea dorsali atra interrupta.

*Hab.* in Anglia , latitans sub parvo reticulo in foliorum pagina superiori.

*Desc.* Parva. *Caput & thorax* atra pubescentia. *Abdomen* basi gibbum , ovatum , tomento cinereo vestitum , linea dorsali atra , postice latiori , interrupta. *Pedes* atri. *Oculi* in duas lineas ordinati.

Signata. 90. A. ( la marquée ) virescens , thoracis lateribus abdominisque lineis duabus nigris.



*Hab. in nemoribus Kiloniensibus.*

*Desc.* Parva *Caput* virescens, atomis aliquot nigris. *Thorax* itidem virescens, lateribus superne late nigris. *Abdomen* globosum virescens, utrinque linea lata e maculis quatuor transverse nigris, quæ tamen lineæ nec basin nec apicem abdominis attingunt. *Papillæ* textoriæ prominent. *Pedes* virides, punctis nigris.

Nigrita. 91. A. ( la négresse ) atra, abdomine subtus punctis duobus testaceis.

*Hab. in Saxonia.*

*Desc.* Media. *Corpus* atrum, nitidum, glabrum. Puncto duo testacea *subtus* ab basin abdominis. *Pedes* apice pallidi. *Oculi* ut in priori.

Globosa. 92. A. ( la globuleuse ) nigra, abdomine lateribus fanguineis.

*Hab. in pratis Lipsiensibus.*

*Desc.* *Corpus* parvum, nigrum. *Abdomen* globosum, lateribus fanguineis, dorso nigro, in medio fascia interrupta alba.

Horrida. 93. A. ( l'horrible ) abdomine subtriangulâri, apice truncato, retuso, pedibus quatuor anticis longioribus.

*Hab. in Lipsiæ hortis.*

*Desc.* Major, singularis structuræ. *Latera frontis* parum elevata. *Corpus* fuscum. *Thoracis* dorsum argenteum cingitur linea alba. *Abdomen* triangulare, basi angustum, apice multo latius, truncatum & valde retusum. *Anus* subabdomine elevatus, albus. *Latera* abdominis rugosa. *Pedes* quatuor anteriores duplo longiores, fusci, *tibiis* albo annulatis; *postici* virescentes.

Dorsata. 94. A. ( la hâlée ) viridis , abdominis dorso fusco.

*Hab. in nemoribus Kiloniensibus.*

*Desc.* Parva. *Caput* , *thorax* & *pedes* viridia , immaculata. *Abdomen* ovatum , subtus pallidum , supra fuscum , limbo pallescente.

Impressa. 95. A. ( l'imprimée ) nigra , abdomine ovato , punctis sex impressis , subtus punctis duobus flavis.

*It. Norwag.*

*Hab. in Norwagiæ rupibus.*

Tricuspi- 96. A. ( la convergente ) virescens , abdomine albo , ano rufescente.

*Hab. in Lipsiæ hortis.*

*Desc.* *Caput* , *thorax* & *pedes* virescentes. *Oculi* , imprimis laterales , elevati. *Abdomen* ovatum , album , ano rugoso , rufescente. Linea longitudinalis abbreviata & duæ obliquæ laterales rufæ , quæ in medio abdominis fere coeunt.

Marmora- 97. A. ( la marbrée ) fusca , abdomine ovato fusco , alboque variegato.

*Clerck. aran. t. I. f. 2.*

*Hab. in Europa* , nidum in fruticibus & graminibus fruens attractis insectorum cadaveribus.

*Desc.* A. *diademati* valde affinis. *Corpus* magnum fuscum. *Abdomen* glabrum , variegatum. *Pedes* fusci , geniculis nigris.

Trigutata. 98. A. ( la triponctué ) flavescens , abdomine nigro , maculis tribus albis.

*Hab. in Alsatia* , capta tempore autumnali in foliis Viburni. *Prof. Hermann.*

*Desc.* *Caput* & *thorax* flavescencia , im-

maculata. *Abdomen* ovatum, postice acutiusculum, subholosericeum, nigrum, in medio tribus punctis albis, quæ fere fasciam constituunt. *Pedes* flavi, tertii paris brevissimi.

Scorpifor- 99. A. ( la scorpiforme ) nigra, abdomine albicante, lineis duabus, pedibus quatuor anticis longissimis.

*Hab.* in Lipsiæ hortis laterigrada.

*Desc.* Parva, nigra. *Frons* parum rufescit. *Abdomen* ovatum, glabrum, albicans, lineolis duabus sinuatis, abbreviatis, nigris. *Pedes* antichi quatuor reliquis duplo longiores, nigri, albo annulati. *Postici* brevissimi, virides.

Carnifex. 100. A. ( la meurtriére ) ferruginea, abdomine cinereo, linea dorsali fusca.

*Hab.* in Angliæ nemoribus.

*Desc.* Media. *Caput* ferrugineum, maxillis atris. *Thorax* ferrugineus, lævis, glaber, margine parum flavescente. *Abdomen* subrotundum, cinereum, linea dorsali lata, fusca. *Subtus* utrinque macula baseos flava. *Pedes* pallidi.

Dorsalis. 101. A. ( la dorsale ) atra, thorace linea dorsali alba.

*Hab.* in Anglia.

*Desc.* Parva, atra. *Thorax* compressus, linea dorsali alba. *Abdomen* ovatum, atrum, basi parum albicans. *Pedes* lividi.

Pubescens. 102. A. ( la cotonneuse ) abdomine ovato fusco, maculis quatuor cinereis, posticis majoribus.

*Hab.* Lipsiæ.

*Desc.* Media. *Corpus* pubescens, fuscum,

cinereo variegatum. *Abdomen* ovatum, dorso fusco, maculis quatuor cinereis distinctis, posticis majoribus. *Palpi* pilosi. *Oculi* secundi paris minutissimi.

Cinerea. 103. A. ( la cendrée ) abdominis dorso fusco, punctis octo cinereis.

*Hab.* ad littora sinus Kiloniensis.

*Desc.* Media. *Maxillæ* cineræ, unguibus nigris. *Oculi* quatuor inferiores minutissimi, quatuor superiores multo majores. *Thorax* cinereus, immaculatus. *Abdomen* ovatum, dorso obscuro, punctis quatuor parium cinereis, minutissimis. *Pedes* cinerei fusco annulati, femoribus immaculatis.

Myopa. 104. A. ( la myope ) virescens, abdominis dorso sanguineo.

*Hab.* in prædio Eckhoff. prope Keel.

*Desc.* *Caput* & *thorax* pallide virescentia, maxillis apice nigris lineisque duabus dorsalibus thoracis obscurioribus. *Abdomen* ovatum, pubescens, supra dorso sanguineo, punctis aliquot nigris, lateribus flavescentibus, immaculatis. *Papillæ* textoriæ apice nigræ, virescentes, *tibiis anticis* apice nigris.

Longipes. 105: A. ( la longipede ) atra, abdomine cylindrico fusco, punctis sex impressis, pedibus longissimis.

*Hab.* in Australasia. *Mus. D. Banks.*

*Desc.* *Corpus* magnum, atrum. *Mandibulæ* dentatæ, apice unguiculatæ. *Palpi* basi ferruginei, apice nigri. *Abdomen* cylindricum fuscum, punctis trium parium dorsalibus impressis nigris. *Pedes*, imprimis anteriores, elongati nigri.

Scopulo- 106. A. ( des écueils ) abdomine fusco, linea  
dorsali pinnata alba.

*It. Norwag.*

*Hab. in rupibus Norwagiæ submarinis.*

*Ex Enum.*

Goezenii. 107. A. ( la Goézen ) saltatoria nigra, ab-  
domine ovato, fronte alba.

*Hab. frequens in arbuftis.*

*Desc.* Abdomini ovato duo puncta im-  
pressa. *Pedes* antichi cæteris crassiores  
& longiores; reliqui successive cras-  
siores & longiores gracilioresque eva-  
dunt. Oculorum situs parabolicus.

*Ex Faun. Fridr.*

Chelata. 108. A. ( la chéliforme ) abdomine thorace-  
que nigro linea dorsali alba, brachiis  
cheliformibus nigris.

*Hab. in Europa passim.*

Brachia- 109. A. ( la difforme ) abdomine oblongo  
ta. obscuro, thorace luteo, brachiis capi-  
tatis, pedibus anticis longis.

*Hab. in Europa, in fruticibus.*

*Ex Inf. parif. Entom.que parif.*

Fasciata. 110. A. ) la fasciée ) fusca, thorace lineis  
quatuor obliquis fuscis, abdomine tribus  
transversis albis.

*Hab. in Europæ hortis.*

*Desc.* *Corpus* fuscum hirsutiusculum.  
*Thorax* lineis quatuor duabus mediis  
prope caput divergentibus, lateralibus  
obliquis. *Abdomen* fuscum, tribus li-  
neis albis, transversis, undatis a medio



ad apicem. Quatuor *pedes anteriores* posterioribus duplo longiores.

Intersecta. III. A. ( l'entrecoupée ) nigra , abdomine ferrugineo-flavo lineis transversis contiguis nigris , pedibus fusco ferrugineoque intersectis.

*Hab. in Europæ agris.*

*Desc.* Nigra. *Abdomen* luteo-rufum , subtus fasciis nigris transversis approximatis , in medio coeuntibus. *Pedes* 5 , 6 breviores fusco rubroque variegati.

Foliata. III. A. ( la porte-feuille ) pallida , abdomine folium longitudinaliter extensum pallide nigrum referente.

*Hab. in Europæ pratis.*

*Desc.* Pallida. *Thorax* pallidior. *Abdomen* fascia longitudinali nigricante , marginibus undata foliumque referente , *subtus* linea longitudinali nigra lineaque lutea utrinque. *Pedes* quatuor anteriores , longiores ; 5 , 6 breviores.

Dumeto- III. A. ( des buissons ) livido-rufa , abdominis pictura foliacea nigra , luteo intersecta , pedum annulis nigris.

*List. aran. t. I. f. I.* araneus subflavus , albo præcipue in summa sui parte & circa latera albicante plena , oculis nigris pellucidis in capite albicante.

*Hab. in nemoribus.*

*Desc.* Pallido-rufa. *Abdomen* folio nigro marginibus piceato , superne maculis plurimis luteis , in medio lutescente albido intersecto , subtus nigrum , lunulis duabus flavis cornubus sese invicem spectantibus anumque involventibus. *Pedes* annulis nigris. *Oculi* octo , licet sex primo intuitu conspiciui.

- Longipes. 114. A. ( la longipede ) pallido-rufa , abdomine pallescente , punctis nigris.  
*Hab. in Europæ arboribus.*  
*Desc. Thorax* pallide fulvus , lateribus obscurioribus. *Abdomen* ovatum , luteum , basi punctis nigris , apice fasciis transversis. *Pedes* longi , tenues , spinosi ; 5 , 6 breviores.
- Vittata. 115. A. ( la bandelette ) pallida , abdomine ovato flavo , fascia longitudinali coccinea.  
*Hab. in horti regii cupresso.*  
*Desc. Thorax pedesque* pallidi. *Abdomen* citreo-luteum supra fascia longitudinali coccinea , subtus striga nigra longitudinali nigro medio angustata.
- Phalangoides. 116. A. ( la phalangioïde ) fusco-flavescentis ; pedibus longis corpore triplo longioribus.  
*Hab. in Europæ domibus.*
- Marmorata. 117. A. ( la déchiquetée ) livido-rufa , abdominis pictura foliacea sæpius interrupta , pedibus nigro maculatis.  
*Hab. in Europæ plantis , filum horizontale construit.*  
*Desc. Fœminæ abdomen* lutescens , supra folium nigrum referens superne truncatum apice lineis transversis sectum. *Oculi* inæquales. *Maris abdomen* medio rufum , folio integro , luteo marginato , lineis duabus tribusve luteis secto. *Oculi* æquales. In utroque sexu *pedes* pallidi , annulis nigris.
- Lupus. 118. A. ( le loup ) tota fusca fuliginea.  
*List. aran. p. 78. t. I. f. 26.*  
*Hab. in arvis. Non textoria.*

*Desc.* Fuliginosa. *Pedes posteriores* aliis longiores. *Oculi* 4 majores, 4 minores nigri uti forceps.

*Ex nost. Mus.*

Monilige-119. A. ( la porte-anneau ) nigra, abdomine supra croceo, pedibus annulis albis.  
t. II. f. 8.

*Hab. in agris.*

*Desc.* Singularis hæc species. *Thorax* niger scaber, gibbus. *Abdomen* supra croceum, punctis quatuor s. maculis 4 ovatis nigris impressis. *Pedes* quatuor primi atri, nitido-sericei, annulis albis variegati. *Postici* quatuor rubescentes, annulis albis intersecti. *Oculorum* situs parabolicus. Affinis A. *Sloanii*. Saltat.

Punctoria. 120. A. ( la dangereuse ) rufa, pedibus pallidis, forcipe punctoria. t. II. t. 9.

*Hab. in Europa.*

*Desc.* *Oculi* nigri. *Thorax* nitido-rufus. *Abdomen* subtus basi flavum. *Pedes* pallidi: *antici* longiores. *Forceps* nigra valida, valde punctoria. Antidotum alkali-fluor. *Oculi* quatuor in quadratum, duo laterales utrinque obliqui, coaliti.

Annularis. 121. A. ( l'annulaire ) rubra, abdomine hirsuto, lineis duabus undatis nigris, tibiis nigro annulatis.

*Hab. in Europa.*

*Desc.* Inter maximas nostratum. *Thorax* rubellus, pilis incumbentibus tectus. *Abdomen* pilis griseis densis vestitum, lineis duabus nigris undatis longitudinalibus. *Pedes* in hac specie crassissimi. *Anteriores* & *postici* longiores; 5 & 6 breviores.

breviores. *Femora omnia* livida, annulo nigro lato versus apicem cincta.

Furcata. 122. A. ( la fourchue ) thorace linea furcata nigra lineolisque duabus nigris, abdomine basi luteo.

*Hab.* in Europæ sepibus.

*Desc.* *Thorax* diaphanus, linea furcata nigra basi versus oculos protensa, lineola nigra utrinque ante oculos laterales. *Abdomen* basi virescente luteum, rubro maculatum, postice rugosum. *Subtus* linea lata fusca, a brachiis ad anum extensa; pars abdominalis luteo marginata. *Pedes* 4 anteriores longiores: omnes punctis nigris variegati.

*Obs.* Nec est *D. de Geer.* aranea resupina sylvestris.

Umbrati- 123. A. ( la délicate ) abdomine margaritaceo, punctis sex impressis.

*Clerck. aran. t. 1. f. 7.*

*Hab.* in Europæ umbrosis. In carpinis circa Lugdunum.

*Desc.* Magna. *Thorax* in medio fuscus. *Abdomen* margaritaceum, spatio in medio lato, linea nigra undata circumdato, punctis sex impressis excavatis; *subtus* linea lata nigra quæ sub thorace fere furcata est. *Pedes* 5, 6 breviores.

Lineata. 124. A. ( la rayée ) nigra, thorace nigro, abdomine nigro tribus lineis albis, pedibus rufis.

*Hab.* in Europa.

*Desc.* *Tota*, exceptis pedibus, nigra. *Thorax* lucidus. *Abdomen* duabus lineis lateralibus unaque in medio albis,

punctis sex excavatis longitudinalibus.  
*Pedes* rufi.

*Obs.* In plurimis speciebus puncta sex reperiuntur excavata; nomen igitur triviale *sex-punctata*, non caracteristicum. *Oculi* quadrati, lateralibus contiguus; nec est aranea *trilineata* Syst.

**Formosa. 125. A.** ( la belle ) capite thoraceque sericeo-argenteis, abdomine supra flavo, argenteo nigroque cincto, pedibus variegatis. t. II. f. 10.

*Hab.* in Europa. In Gallia Aust.

*Desc.* Inter magnas numeranda. *Caput*, *thorax*que sericeo-argenteo alba. *Abdomen* ellipticum fasciis lineisque versicoloribus supra cinctum: 1°. area argentea antica linea nigra in duas areas divisa; 2°. fascia lutea antice posticeque nigro marginata; 3°. area argentea, lineola nigra in medio; 4°. semiannulus luteus utraque parte nigro marginatus; 5°. area argentea; 6°. fascia lateraliter attenuata; 7°. fascia lutea; 8°. fascia argentea quam sequitur argus niger, dein fasciola nigra. In parte postica lineolæ quatuor a medio abdominis ad anum divergentes. *Anus* lateraque abdominis sericeo atra. *Abdomen* subtus rufescens, in medio nigrum, fasciis duabus longitudinalibus luteis. *Oculi* quadrati, nigri lucidi, lateralibus coalitis. *Pedes* pallide flavescentes, nigro variegati. Nidus ellipticus, petiolatus, mira arte constructus, follim inutiliter in aere suspensum non in fauste imitans.





## GENUS IX.

SCORPIO. *Pedes* VIII, insuper *Chelæ* 2 frontales.

*Oculi* VIII, horum 3 ad latus utrumque thoracis ; 2 in tergo.

*Palpi* II, cheliformes.

*Cauda* elongata, articulata, terminata mucrone arcuato.

*Pectines* duo subtus, inter pectus & abdomen.

Europæus. 1. S. ( l'Européen ) pectinibus 18-dentatis ; manibus angulatis. *M. L. U.* 429. t. II. f. II.

*Mouff. inf.* 204.

*Aldr. inf.* 577.

*Raj. inf.* 9.

*Raf. inf. suppl.* 66. f. 1, 2.

*Schæff. elem.* t. 113.

*Sulz. inf.* t. 23. f. 150.

*Fab.* 5.

*De Geer tom.* 7. p. 344. n. 5. t. 41. f. 5.-8. octonoculus fuscus, pectinibus octodecim dentatis, manibus elongatis, digitis filiformibus, cauda corpore longiore ; aculeo basi mucronato.

*Scop. carn.* 1122.

*Enum. n.* 1113.

*Pod. gr.* t. 122.

*Maupertuis. Mém. de l'Acad. des Scienc.* ann. 1731. t. 16. f. 3.

---


*Scorpiorum arma foraminibus 3 scatent.*  
*Genere hoc unica Suecia feliciter caret.*

*Hab.* in Europa, maxime Australi: Tergeſti innocuus *Enum.* In Gallia Auſt. in Italia, &c.

*Deſc.* *Oculi* duo craſſi elevati nigri; ſex alii tranſverſe diſpoſiti. *Chelæ* ſupra angulatæ, ad modum anguſtæ. *Caudæ* nodii ſex ſupra concavi, ſubtus convexi, ultimo ovali pungente. *Cauda* ſub aculeo mucronata.

*Obſ. 1.* *Scorpionum oculorum numerus* variat, nempe modo 8, modo 6. *Pectines* in eadem ſpecie numero variant. *Cauda* in omnibus articulis ſex, quorum quinque primi membranis juncti, caudam mobilem flexibilem reddunt. *Aculeus* curvus, acutiſſimus ſextum articulum terminat. Prope apicem duo foramina lente conſpiciuntur, e quibus liquor diaphanus in plagam jaculatur. *Fæminæ* viviparæ. Inſectum ferox in progeniem ſævit. *Vulnus* vitandum, licet antidotum vulgare. V.

*Obſ. 2.* *Pectines* huic tantum generi proprii inter abdomen & pectus adhærent. Numero dentium differunt, ſed uſus adhuc plane latet. *Fab.*



## GENUS X.

CANCER. *Pedes* VIII, ( 10 f. 6 raro ) insuper manus 2 chelatae.

*Oculi* II, distantes, plerisque pedunculati, elongati, mobiles.

*Palpi* II, cheliferi.

*Cauda* articulata, inermis.

\*a\* BRACHYURI *Thorace lævi lateribus integerrimo.*

Mutus. 1. C. ( le muet ) brachyurus, thorace lævi integerrimo, margine antico transverso brunneo.

*Fab.* 2.

*Hab.* in Mari Mediterraneo. An Europæus?

*Testa* lævis, antice truncata, margine brunneo, postice complanato-truncata; lateribus integra. *Chelæ* læves, carpis unidentatis, brachiis subtus denticulatis.

Pisum. 2. C. ( l'orbiculaire ) brachyurus, thorace orbiculato lævi integerrimo obtuso, cauda corporis amplitudine.

*Fab.* 5.

*Pennant. brit. 1001.* 4. t. 4. f. 1.

*Herbst. cancr.* 2. 95. 15. t. 2. f. 21.

*Hab.* in Barbaria. E. Brander. In Mari Mediterraneo. *Fab.* An Europæus?

*Corpus* magnitudine pisi, undique læve, convexum. *Rostrum* nullum nullaque crenatura. *Cauda* obtusissima, ad os usque tegit totum abdomen. *Chelæ*

*oblongiusculæ digitis æqualibus. Pedes inermes, læves, ungue acuto.*  
*Obs. Corpus fere orbiculatum.*

Hexapus. 3. C. ( l'exapode ) brachyurus, thorace orbiculato lævi integro, pedibus senis, antennis corpore longioribus.

*Baster. subf. 2. p. 26. t. 4. f. 3. cancer thorace lævi orbiculato subdepresso, chelis validioribus, antennis longissimis, pedibus posticis minutioribus.*

*Fab. 14.*

*Herbst. cancer. 98. 19. t. 2. f. 40.*

*Hab. in Oceano Europæo.*

*Thorax convexiusculus, antice inter oculos 3-fidus medio emarginato. Chelæ læves. Pedes præter chelas tantum sex.*

Minutus. 4. C. ( la nourrice ) brachyurus, thorace lævi integerrimo subquadrato, margine acutiusculo, antennis brevissimis. *Mus.*

*Ad. Fr. 1. p. 8.*

*It. Wgoth. 137. t. 3. f. 1.*

*Sloan. Jam. 2. t. 245. f. 1.*

*Gron. zoop. 962.*

*Balm. iter. 2. p. 143.*

*Osbeck. iter. 307.*

*Baster. subf. 2. p. 26. t. 4. f. 12. cancer thorace lævi orbiculato, pedibus hirsutis.*

*Scop. carn. 1133. cancer nutritrix.*

*Fab. 8.*

*Pennant. brit. zoot. 4. t. 1. f. 2.*

*Herbst. cancer. 2. 110. 30. t. 2. f. 32.*

*Hab. in Oceano Europæo & pelagi fucio natante, super aquam cursitans.*

*Desc. Cancris hujus descriptionem hanc communicavit R. P. Wulfen. Si expansus, non longior quam latitudo unguis humanis pollicis; si caudam supra*

ventrem incurvet, uti solet, vix dimidiam latitudinem unguis humani pollicis æquat, & tunc fere rotundus est. Cauda reipsa reliquo corpore longior, sed supra ventrem reclinata, more cancrorum brachyurorum, quibus etiam habitu similis. *Cauda* est ellip-toidica, futuris sex, mediis latioribus & longioribus; subtus concava, supra convexiuscula, rotundata, obtusa, mollis, apice non foliaceo, sed circulariter fere rotundo. *Thorax* subrotundatus, lævis, supra convexiusculus, magnitudine lentis. *Pedes* utrinque tres tantum numeravi. *Manus* chelatae, *chelis* inflatis, latere interiore prope basin villosis. *Digiti* subæquales, latere interiore prope sinum uno dente instructi. *Oculi* sunt puncta duo parva nigra in anteriore thoracis margine. *Antennæ* minimæ capillaceæ. Infra caudam, quæ totum subtus tegit corpus, utrinque sex setæ, versus basin longiores. Autoptæ affirmant ostreis majoribus cibum offerre, admitti a concha apertis valvis. *Scop.*

Longicornis. 5. C. ( la longicorne ) brachyurus, thorace orbiculato lævi chelis minore, antennis longissimis.

Gron. 1700p. 968. *Ad. helv.* 5. p. 363. t. 5. f. 447.

Baster. *subf.* 2. p. 26. t. 4. f. 3.

Seb. *mus.* 3. p. 42. t. 17. f. 14.

Fab. 13.

Pennant. 1700t. *brit.* 4. t. 1. f. 3.

Herbst. *cancer.* 2. 89. 20. t. 2. f. 23.

Hab. in Zeelandia. In Oceano Europæo, Australi. *Fab.*



*Ex Mantiff. D. Fab.*

Granarius. 6. C. ( le grain ) thorace lævi integerrimo, fronte cuspidata, oculis cylindricis. *Mantiff. tom. 1. n. 13.*  
*Herbst. canc. 2. 107. 18. t. 2. f. 28.*  
*Slabbers. microsc. t. 18. f. 1.*  
*Hab. in Europæ aquis.*  
*Desc. Minutus, vix granum tritici magnitudine superat. Antennæ longæ.*

Puillus. 7. C. ( le nain ) thorace lævi quadrato integerrimo tarsis unidentatis.  
*Herbst. canc. 2. 112. 31.*  
*Hab. in Oceano Boreali. An Europæus?*  
*Desc. Statura omnino C. minuti, at quadruplo minor. Totus pallidus depressus.*

\*b\* *Brachyuri thorace lateribus inciso.*

Rhomboi- 8. C. ( le rhomboïde ) brachyurus, thorace  
 des. lævi lateribus antice unispinosis, fronte truncata.  
*Barrel. rar. t. 1287. f. 1.*  
*— t. 1286. f. 1, 2.*  
*Fab. 20.*  
*Herbst. canc. 1. 84. 5. t. 1. f. 12.*  
*Sulz. hist. inf. t. 31. f. 4.*  
*Hab. in Mari Mediterraneo. An Europæus?*

Pelagicus. 9. C. ( de l'Océan ) brachyurus, thorace lævi utrinque unispinoso, fronte sex-dentata, manibus multangulo-prismaticis. \*  
*Obs. iter. 307. C. manuum articulis omnibus dentatis, extimo heptagono.*

---

Cancris perennes, quotannis deponunt crustam senectamque exuunt laboriose. Resupinata farmina coeunt genitali duplici. Branchias sub thorace elevando fovant, uti monoculi. Ova sub cauda adhaerentia racemarim gerunt, visitant plantis, cadaveribus, vivisque animalibus.

*Gron. zoop.* 956. \*

*Rump. musf. t.* 7. f. R.

*Brown. Jam.* 421. t. 41. f. 2.

*Seb. musf.* 3. t. 20. f. 9.

*Fab.* 22.

*Herbst. cancr.* 161. 68. f. 56. 57. vix tamen differre videtur.

*De Geer tom.* 7. p. 427. t. 26. f. 8. thorace lato utrinque unispinoso, lateribus utrinque octo dentatis, fronte dentata, manibus elongatis multangulis, pedibus posticis dilatato foliaceis.

*Valent. ind. vet. & nov. tom.* 3. p. 417. n. 226.

*Hab. in pelagi universi orbis fucis natante.*

*Desc. Thorax* magnitudine insignis, latior quam longus, lævis, punctis minimis, pallido maculatus, dentibus utrinque 8 inter oculos & spinam lateris. *Rostrum* inter oculos brevissimum, dentibus 5, intermedio depresso. *Cauda* inflexa aphylla, articulis 4, quorum 1 brevissimus, latissimus, 2 maximus basi utrinque dilatatus. *Brachia* thorace longiora, latere antico aculeis validis angulata, subprismatica. *Manus* angulata, prismatica, basi spina unica, ad digitum duabus. *Digitus* rectus, longitudine manus, introrsum inæqualiter dentatus. *Pollex* similis digito. *Pedes* inermes octo. *Digiti* solitarii (3 primorum parium) ensiformes f. lanceolati, stria 1. f. 2. *Digitus* ultimi f. 4ti. parvis ovatus, membranaceus, reliquis latior. *M. L. U.* 434.

*Nucleus.* 10. C. (la noix) brachyurus, thorace lævi globofo, antice utrinque unidentato, postice rostroque bidentato.

*Fab.* 24.

*Herbst. cancer.* 2. 87. t. 2. f. 14.

*Hab.* in M. Mediterraneo ad littora Barbariæ. *E. Brander.* E littoribus Hispaniæ nobis missus. V.

*Statura* C. craniolaris, magnitudo glandis, color flavus. Thorax rostro bidentato, & ad postica thoracis margo obsolete bidentatus, at supra pedes posticos dens validior conicus. Cauda glaberrima. Brachia antica punctis eminentibus adspersa. Ungues acuti. Cauda subrotunda, glaberrima. Manus læves, digitis longis, filiformibus, æqualibus, ciliatis.

Mœnas. II. C. ( le fou ) brachyurus, thorace leviusculo utrinque quinquedentato, carpis unidentatis, pedibus ciliatis, posticis subulatis. *M. L. U.* 436. \*

*Scop. carn.* 1123.

*It. Wgoth.* 173.

*Rumph. t.* 6. f. o.

*Pet. amb. t.* 1. f. 5.

*Baster. subsf.* 2. p. 19. t. 2.

*Gron. zoop.* 955. \*

*Fab.* 25.

*Hab.* in Oc. Europæo, Asiatico.

*Desc.* Thorax convexus, subinæqualis, suborbiculatus, postice angustior, scaber. Margo anticus rotundatus acutus. *Serratulæ* 5, validæ, subæquales, utrinque pone oculos. *Rostrum* inter oculos oblitteratum, dentibus quinque. *Cauda* inflexa, aphylla articulis sex, quorum omnes lineares, nec tertius litteram T refert ut in C. pelagi. *Brachia* brevissima, inermia. *Carpi* unidentati. *Manus* ovata, lævis, convexa. *Pollex* latere angulis duobus

obtusis. *Digiti* recti. *Pedes* teretiusculi, inermes. *Digiti* subulati, striati. Postremus digitus lanceolatus, acuminatus, nec ovatus. *M. L. U.* 436.

**Depurator. 12.** C. ( l'élargi ) brachyurus, thorace lævi utrinque subquinqüedentato, manibus apice compressis, pedibus posticis ovatis.

*Mus. Ad. Fred.* 1. p. 85. cancer caninus. \*

*Scop. carn.* n. 1124.

*Gron. zoop.* 954.

*Barr. ic.* 1287. f. 2. cancer ramipes.

*Rond. pisc.* 565. cancer latipes.

*Planc. conch.* 34. t. 3. f. 7.

*Seb. mus.* 3. t. 18. f. 9.

*Fab.* 26.

*Hab. in Oc. Europæo.* In M. Adriatico.

*Frons inter oculos dentibus tribus.*

*Digitus fixus chelarum valde compressus.*

*Apex digitorum posticorum ovatus, membranaceus.*

*Obs.* Differt a priore 1°. thoracis crusta molliore, antice tridentata, postice obtusiore; 2°. pedibus posticis lamina ovali, unguis loco, terminatis. *Scop.*

**Granulatus. 13.** C. ( le granulé ) brachyurus, thorace lævi crenulato angulis posticis dilatato, quinqüedentatis posticeque subtruncato, manibus cristatis.

*Seb. mus.* 3. t. 19. f. 13.

*Catesb. car.* 2. p. 36. t. 36. C. chelis crassissimis.

*Fab* 30.

*Hab. in America.* *Mus. de Geer.* ex Algiria mihi. In M. Mediterraneo.

*Fab.* an Europæus?

*Testa convexa, subtuberculata, margine postico laterali dilatato-quinqüedentato,*

*reliquo crenulato. Rostrum bilobum, obtusum. Chelæ truncatæ, cristatæ, ad basin spina armatæ.*

**Pagurus. 14. C. ( l'officinal ) brachyurus, thorace utrinque obtuse novemplicato, manibus apice atris.**

*Faun. Suec. 1. n. 1244.*

*It. Wgoth. 173.*

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 85.*

*Scop. carn. 1125.*

*Gron. zoop. 967. \**

*Bell. aquat. 368.*

*Rond. pisc. 560.*

*Gesn. aquat. 155.*

*Aldr. exsang. 186.*

*Jonst. exsang. t. 5. f. 2.*

*Brald. nat. t. 3. f. 4.*

*Rumph. mus. t. 11. f. 4.*

*Fab. 29. thorace lævi utrinque quadridentato fronte fissâ, manibus apice atris.*

*Pennant. zoot brit 4. t. 3. f. 7.*

*Hab. in Oceano Europæo, Indico.*

*Desc. Huic brachia crassâ valde. Manus tumidæ, supra tuberculis subacutis villisque interjectis hispidæ, qui in adultis decidunt; aculei vero obtusi fiunt. Digiti castanei, ac demum nigri. Scop.*

*Ex Entom. Carn.*

**Isirianus. 15. C. ( l'Isirien ) thorace suborbiculato lævi, utrinque bidentato, apice inter oculos dentibus tribus, medio majore.**

*Hab. in sinu Liburnico.*

*Desc. In meo specimine testa cimice leâulario paullo major. Canceri totius color obscure rufus. Corpus neque pilosum,*



neque tuberculosum. *Thorax* glaber-  
rimus, modice convexus, ambitu fere  
circulari; postice marginatus, antice  
rotundatus, latere singulo, ubi testa  
convergit, dentibus duobus. *Dens*  
anticus major truncatus, denticulatus.  
*Sternum* subrotundum, basi minime  
excavatum, sulcis transversis parallelis,  
palati in modum, exaratum. *Cauda*  
brevis, fere conica. *Brachia* pedibus  
multo crassiora, articulo primo magno  
dente terminali, secundo subtus biden-  
tato. *Manus* lanceolatæ, brachio lon-  
giores, compressæ, subancipites, punc-  
ratæ, digitis rectis, mobili longiore.  
*Pedum* articulus ultimus subtus spinoso-  
dentatus, ungue parvo concolore.

*Ex Mantiss. D. Fab.*

Angulatus. 16. C. ( l'anguleux ) thorace lævi utrinque  
bidentato, manibus longissimis. *Mantiss.*  
*tom. I. p. 319. n. 37.*

*Herbst. cancr. I. 85. 6. t. I. f. 13.*

*Pennant. zoot. brit. 4. t. 5. f. 10.*

*Hab. in Oc. Anglico, prope Westmouth. 4*

*Mus. D. Banks.*

*Desc. Manus corpore triplo longiores.*

*Obs. Similes in M. Mediterraneo. V.*

Pygmaeus. 17. C. ( le pygmée ) thorace læviusculo,  
utrinque quinque dentato, fronte in-  
tegerrima, carpis unidentatis. *Mantiss.*  
*ibid.*

*Hab. in Oc. Anglico. D. Hudson.*

*Desc. Statura omnino C. mænatis &  
minutis. Thorax antice integerrimus,  
lateribus quinque dentatis, postice  
angustatus. Manus lævis, digitis iner-  
mibus.*

Depressus. C. 18. ( l'aplati ) thorace sublævis , utrinque quadridentato , femoribus unidentatis , unguibus subtus ferratis. *Fab.* 33.  
An Europæus ?

*Herbst. cancer.* 2. 117. 36. t. 5. f. 35.

*Hab.* in Mari Mediterraneo , in Jamaica.  
An Europæus ?

*Desc.* Parvus. Statura præcedentis , depressus , griseo fuscoque varius. *Frons* quadrifida. *Thorax* dentibus utrinque quatuor acutis. *Femora* apice unidentata , medio dorsali macula nigra. *Ungues omnes* valde ferrati. *Chelæ* parvæ.

\*c\* *Brachyuri thorace supra hirto aut spinoso.*

Lanatus. 19. C. ( le velu ) brachyurus , thorace hirto rugoso utrinque unidentato , rostro bidentato.

*Planc, conch.* 36. t. 5. f. 1.

*Fab.* 37.

*Herbst. cancer. fig.* 81. An ?

*Hab.* in M. Mediterraneo. An Europæus ?

*Testa depressa , inæqualis , lacunosa , antice truncata cum dentibus 2 inter oculos , 1 extra oculos , in medio lateris utrinque dens prominens. Chelæ læves. Brachia ciliata. Pedes 2 , 3 longi ; 4 , 5 dorsales , breves , apice adunco.*

Aranæus. 20. C. ( l'araignée ) brachyurus , thorace hirsuto ovato tuberculato , rostro bifido , manibus ovatis. \*

*Iter. Scanic.* 312.

*Jonst. exsang.* t. 5. f. 13.

*Fab.* 40.

*Pennant. zoot. brit.* 4. t. 9. f. 16.

*Hab.* in Oc. Europæo.

*Desc.* Affinis *C. rostrato*, *lanato*, *tribulo*.  
*Testa* ovata convexa, subinæqualis, adspersa punctis inæqualibus prominentibus. *Dens* compressus pone oculos. *Rostrum* prominens instar forcicis, ovatum, bipartitum. *Brachia* inermia, teretia. *Manus* ovatæ, basi retractorum. *Bidentatæ*. *Pedes postici* paullo longiores, adspersi pilis. *Digitus* subulatus rubens. *M. L. U.* 439.

Rostratus. 21. *C.* ( le museau ) brachyurus, thorace pubescente obcordato, dorso spinis duabus erectis, manibus oblongis compressis. \*

*Fab.* 41.

*Hab. in* Oc. Europæo.

*Desc.* Parvus, sordidus. *Thorax* obcordatus supra inæqualis, in medio armatus spinis duabus erectis, validis, quarum altera anterior, altera posterior; antice protensus est *thorax* in rostrum. *Antennæ* setis armatæ. *Manus* oblongæ, læves, digitis linearibus, canaliculatis, compressis. Basis *chelæ* quasi spinis duabus obsoletis & obtusis instructa. *Faun.* 2027.

Hirtellus. 22. *C.* ( le hérissé ) brachyurus, thorace hirtu utrinque quinquedentato, manibus extus muricatis. \*

*Hab. in* Oc. Asiatico.

*Desc.* Minutus. *Thorax* rotundatus, lævis, sed utrinque margine spinis quinque dentatus; antice integer, tenuissime denticulatus. *Manus* læves, sed extus muricatæ & pilosæ. *Pedes posteriores* acuti & villosi. *Faun.* 2029.

Muscosus. 23. *C.* ( l'enveloppé ) brachyurus, thorace

villosa utrinque tridentata, rostro bidentata, lateribus unidentata.

*Hab. in M. Mediterraneo. E. Brander.*

An Europæus?

*Magnitudo glandis. Testa obovata, villis mollissimis incurvis hirsuta, ad utrumque latus spinis 3 subulatis. Rostrum spinis 2 subulatis parallelis cum dente compresso ad utrumque latus rostri. Ungues pedum subulati, curvi, introrsum dentati. Chelæ læves, lineares, carpo utrinque dense obtuso retrorsum spectante.*

*Tribulus. 24. C. ( le tribule ) brachyurus, thorace spinis octo, pedibus filiformibus, rostro bifido.*

*Fab. 42.*

*Hab. Gades. F. Logie.*

*Testa cordata, convexa gibbositatibus 4, quorum 2 laterales; 1 inter laterales, minor; 1 antérieus versus dorsum; harum singula spina erecta armatur; adsunt insuper postice spinæ 2; etiam spinæ 2 versus rostrum. Rostrum bifidum connivens. Pedes filiformes, longi, inermes.*

*Personatus. 25. C. ( le caché ) brachyurus, thorace hirta inæquali utrinque quinquedentato, rostro quadridentato.*

*Hab. in M. Mediterraneo. An Europæus?*

*Testa magnitudine pomi, rubra, uti totum corpus hirta. Rostrum bipartitum subulatum hirtum cum dente ad utrumque latus antico ciliato, brevior. Seta utrinque ad basin caudæ. Pedes duo postici quasi supra reliquos collocati. Thorax ovatus, margine aculeis 5, disco*

*tuberculis*

*tuberculis variis. Manus læves, retro bidentes.*

*Obs.* Cancrorum divisiones in brachyuros thorace supra spinoso, thorace inæquali non admittit *D. Fab.* omnes igitur hos cancros hujus celeb. Entomologi post divisionem 4 & quintam *Syst. ordinavi. V.*

\*d\* *Brachyuri thorace supra spinoso.*

Dodecos. 26. *C.* ( le formidable ) brachyurus, thorace pubescente, spinis duodecim, rostro bifido. *t. II. f. 12.*

*Fab.* 46. thorace aculeato porrecto adscendente, rostro acuto bifido, pedibus longissimis?

*Hab. in Hispania.*

Thorax rotundatus, obovatus, acuminatus, parum pubescens, magnitudine grylli domestici. Spina 1 erecta, ad basin; spina 1 erecta in medio; spinæ 4 obsoletæ ad utrumque latus; spina 1 brevis ad marginem. Rostrum attenuatum, bifidum, subconnivens. Oculi exserti. Cauda ovata, obtusa, hirsuta. Chelæ ovato-oblongæ, utrinque carina ciliatæ. Differt a *C. araneo* corpore non obcordato depresso, sed obovato convexo.

Hastatus. 27. *C.* ( le militaire ) brachyurus, thorace rugoso nudo, margine utrinque octodentato, postico maximo, planis posticis ovatis.

*Hab. in Mare Adriatico. D. Wilke.*

*Desc. Palmæ* antice bidentatæ. *Chelæ* angustatæ.

*Obs.* In spec. *D. Fab.* cancr. etiam *hastatus* reperitur, sed ut optime

*Insect. Tomus IV.*

K



observavit clar. Entomologus in *Mant.*  
*tom. 1. p. 319. n. 34. Cancer. n. 23.*  
 specierum nullo modo cancer *hastatus*  
*Linn.*

Puber. 28. C. ( le cotonneux ) brachyurus , tho-  
 race rugoso villoso utrinque quinque-  
 dentato , palmis posticis ovatis.

*Fab. 49. thorace hirta cordato utrinque*  
*quinquedentato , manibus unidentatis ,*  
*apice nigris.*

*Hab. in Mare Adriatico. D. Wilke.*

Maja. 29. C. ( le Maja ) brachyurus , thorace  
 aculeato , manibus ventricosus spinosis ,  
 digitis penicillato-hirsutis. \*

*Scop. carn. 1126.*

*Iter. scanic. 327.*

*Matth. diofc. 229. maja.*

*Jonst. exsang. t. 5. f. 5.*

*Gesn. aqu. 152. maja foemina.*

*Aldr. crust. 184. mea alia.*

*Gron. zoop. 973. \**

*Fab. 50.*

*Seb. mus. t. 18. f. 12.*

— t. 22. f. 1.

*Hab. in Oc. Norwagico.*

*Desc. Thorax cordatus , undique spinis*  
*muricatus , margine vero majoribus.*  
*Rostrum subulatum , apice bidentatum ,*  
*dentibus horizontalibus æqualibus. Chelæ*  
*spinis muricatæ , sed ipsi digiti læves*  
*præter quam margine , adspersæ fasci-*  
*culis pilorum. Faun. 2031.*

Cornutus. 30. C. ( le cornu ) brachyurus , thorace  
 aculeato , rostro spinis corniformibus  
 barbatis , manibus teretibus. *M. L. U.*  
 445. \*

*Fab. 45.*

*Hab.* in Oc. indico. In Mari Mediterraneo & Norwagico. *Fab.*

*Desc.* *Thorax* ovatus, adspersus punctis acuto-spinosis; latera utrinque ciliata, spinis 6 validis. Disci spinæ 3 transversales & una anterior; omnes erectæ, reliquis æquales spinæ 2 minores, erectiusculæ ad basin thoracis.

*Rostri* loco spinæ 2 inter oculos, reliquis majores, erectiusculæ, distantes, subtus barbata. *Rostrum* subtus, inter oculos, acutum, reflexum & duæ spinæ coadunatæ juxta oculos. *Cauda* inflexa ovata, articulis 7 linearibus. *Brachia* teretia, lævia, glabra, nuda. *Manus* pedibus reliquis minores, basi extrorsum bidentatæ. *Pedes* toti hirsuti, pilosi. *Digitus* hirsutus.

Germanus. 31. C. ( l'Allemand ) brachyurus, thorace inæquali, spina altera frontis, altera supra caudam. †

*Fab.* 58.

*Hab.* ad maris Germanici insulam Fanœ.  
*D. Brunnike.*

*Corpus* vix pediculo majus, glabrum. *Frons* inter oculos prominens, lamina dilatata, ovata, concava, terminata spina porrecta, valida. *Antennæ* spina frontali paullo longiores. *Thorax* inæqualis, e cujus medio spina valida, horizontalis, supra caudam extensa. *Cauda* teres, articulis 5 gibosis. *Chelæ* manuum ovatæ, læves.

\* e \* *Brachyuri* thorace inæquali.

Cruentatus. 32. C. ( l'ensanglanté ) brachyurus, thorace tuberculoso sanguineo, rostro lineari truncato.

*Scop. carn.* 1134. \*

*Hab.* in M. Mediterraneo. *E. Brander.*

An Europæus?

*Testa statura & magnitudine C. aranei, supra admodum nodosa tuberibus inæqualibus, apice maculis albis. Rostrum lineare, truncatum, cum dente utrinque juxta basin. Chelæ oblongæ, læves, ad corpus retrorsum bidentes. Pedes omnes varicofo-tuberculati.*

*Grapfus.* 33. *C. ( le tacheté ) brachyurus, thorace strigis lateralibus, fronte retusa. Amæn. acad.* 4. p. 1252. t. 3. f. 10. \*

*Catesb. car.* 2. t. 36. f. 1. pagurus maculatus.

*Seb. mus.* 3. t. 18. f. 5.

*Gron. zoop.* 966.

*Fab.* 34. thorace lævi utrinque tridentato subrugoso, corpore variegato.

*Hab.* in America, insula Adscensionis. In Mari Mediterraneo. *Fab.* An Europæus?

*Desc. Frons integra. Thorax lateribus & antice subrugosus, utrinque dentibus tribus acutis. Color supra fusco flavescenteque varius, subtus flavescens. Fab.*

*Ex spec. D. Fab.*

*Nafutus.* 34. *C. ( le prolongé ) thorax undique aculeato, rostro bifido, subtus dente unico, supra duobus. Canc.* 35.

*It. Norwag.*

*Hab.* in Oc. Norwegico.

*Condylia-* 35. *C. ( le crochu ) thorace ovato aculeato, supra caudam spinis tribus erectis, chelis muricatis, Mantiss. tom. 1. n. 65.*

*Herbst. cancr. f. 91.*

*Hab. in M. Mediterraneo. An Europæus?*

*Desc. Statura fere C. aranei. Thorax inæqualis, multispinosus. Linea dorsalis postice tubercula gerit tria magna, primo granulato, secundo bi- & tertio minori trispinoso. Femora ante apicem aculeo armato. Chelarum spinæ obtusæ.*

Scorpio. 36. C. ( le scorpion ) thorace pubescente, spinis quatuor erectis, pedibus anticis longissimis. *Cancr. 47.*

*It. Norwag.*

*Pennant. Zoot. brit. 4. t. 9. f. 17.*

*Hab. in Oc. Norwagico.*

*Desc. Statura C. phalangii.*

Chiragra. 37. C. ( le chiragre ) thorace nodoso inæquali, rostro plano retuso, pedibus octo nodulosis. *Cancr. 52.*

*Hab. in M. Mediterraneo. In sinu Lugdunensi. V.*

*Desc. Statura C. horridi, at triplo minor. Rostrum exsertum, planum, apice valde retusum. Ante oculos tuberculum obtusum. Thorax nodis plurimis, imprimis quatuor dorsalibus majoribus & tribus utrinque ad marginem posticum. Pedes omnes incurvati.*

Auritus. 38. C. ( l'auriculé ) thorace antice utrinque unispinoso, dorso canaliculato molliusculo. *Cancr. 59.*

*Hab. in Islandia. D. Koenig.*

*Desc. Parvus. Antennæ brevissimæ. Testa antice pone oculos spina parva, erecta, acuta. Dorsum impressum, molliusculum. Brachia basi apiceque unispinosa.*

Mascaro- 39. C. ( l'aplani ) thorace sublævi ovato  
nius. murico , rostro bifido , lobis dentatis.

*Mantiss. tom. 1. n. 60.*

*Herbst. canc. f. 62.*

*Sulz. inf. t. 13. f. 1.*

*Hab. in M. Mediterraneo. An Europæus?*

*Desc. Statura omnino C. lanati , at magis  
ovatus. Rostrum breve , bifidum , lobis  
duobus obtusis , bidentatis. Thorax  
planus , lævis , hinc inde impressus.  
Pedes rotundati , omnes unguiculati.*

\*f\* *Parasitici cauda aphylla.*

Bernardus. 40. C. ( Bernard - l'hermite ) macrourus  
parasiticus , chelis cordatis muricatis ,  
dextra majore. \*

*Scop. carn. 1130.*

*Matth. diosc. 230.*

*Rond. pisc. 1. p. 553.*

*Bellon. aquat. 362.*

*Gensf. aquat. 161.*

*Aldr. exsang. 218.*

*Jonst. exsang. t. 7. f. 6.-12.*

*Swammerd. bibl. t. 11. f. 1 , 2.*

*Baster. subf. 2. p. 71 t. 10. f. 3 , 4.*

*Gron. zoop. 682.*

*Fab. pagurus 2. parasiticus , chelis muri-  
catis , dextra majore.*

*De Geer tom. 7. p. 405. n. 4. t. 23.  
f. 5. - 13. astacus Bernhardus cauda  
molli recurvata , thorace lævi , pedibus  
chelisque muricatis scabris , dextra  
majore.*

*Pennant. zoot. brit. 4. t. 17. f. 38.*

*Reaum. acad. parisi. act. 1710. t. 10.  
f. 19 , 20.*

*Hab. in Oc. Europæo , intra varias testas  
cochlearum , quas vacuas intrat tra-  
hitque , mutatas prout adolescit ; hinc*



semper eam secum ducit ut Diogenes suum dolium.

*Desc.* *Antennæ* corpore longiores tenues, setaceæ, basi spina magna armatæ: *Oculi* duo, pediculis cylindricis longisque adfixi. *Caput*, *thorax*, *pedes* ut in astacis aliis. *Corpus* semper inflexum. *Caput* lamina squamosa tectum, a thorace infisura separatum. *Chelæ* margine anteriore versus basin barbatae. *Pedes* 10 forcipe terminati, articulis 5, quorum duo ultimi aliis crassiores tuberculisque scabri. *Pedes* 7, 8, 9, 10 depressi, breves, pilosi, angulo terminati. *Cauda* subtus inflexa, membrana tecta. *Ova* sub cauda. In Buccinis frequens.

Eremita. 41. C. ( l'hermite ) macrourus parasiticus, chelis scabris subæqualibus, anterioribus sex-pollicatis.

*Fab.* pagurus 4.

*Hab.* in M. Italico, intra tophum suberosum, subrotundum, apertura transversa ovali, in cujus centro cochlea latitat. *D.* *Vandelli*.

*Desc.* *Pedes* sex antici, porrecti, extra tophum.

*Similis* Bernhardo f. Diogeni, sed minor. *Chelæ* æquales, scabræ & præterea pedes utrinque 2 alii, porrecti extra tophum.

Tubularis. 42. C. ( le tubulaire ) macrourus parasiticus subcylindricus, testa punctis excavatis.

*Fab.* pagurus 8.

*Hab.* intra serpulæ glomeratæ testam maris Mediterranei.

*Magnitudo & facies scolopenderæ* forficatæ. *Testa brevis subovata, punctis*

*excavatis, antico utrinque retusa. Pedes 4 utrinque primi chelati; par 5tum. muticum, reliqua tantum rudimenta. Cauda longa mollis.*

Caput 43. C. ( la tête de mort ) brachyurus tomentum. totus obtectus pileo hemisphærico suberoso.

*Fab. pagurus 9.*

*Hab. Algiriæ. E. Brander. In mari Mediterraneo. Singularis aspectuque horridus, referens caput humanam diu sepultum. An Europæus?*

Corpus magnitudine castaneæ, griseum sordidum, totum tomentosum pilis brevissimis confertissimis, exceptis solis digitorum apicibus. Rostrum obsoletum, vix emarginatum. Manuum digiti aquales. Pedes unguibus acutis. Testa semiglobosa, inermis. Pileus hemisphæricus, quasi ex argilla vel corio antico confectus, distinctus a corpore, tegit totum corpus ad oculos usque, enatus e pedibus postremi paris supra dorsum reflexis & in pileum dictum terminatis.

\*g\* *Macrouri thorace lævi.*

Gammarus. 44. C. ( la langouste ) macrourus, thorace lævi, rostro lateribus dentato, basi supra dente duplici. \*

*Scop. carn. 1127.*

*It. Vesirogoth. 174.*

*Mus. Ad. Fr. 87.*

*Matth. diose. 227.*

*Rond. pisc. 1. p. 538.*

*Gens. aquat. 91.*

*Jonst. exsang. 112.*

*Aldr. exsang. t. 71.*

*Baster. subf. 2. p. 6. t. 1.*

*Fab. astacus* 1.

*Pennant. zoot. brit.* 4. t. 10. f. 21.

*Hab. in* Oc. imprimis Norwagico ; in America septentrionali. *Kalm.* mutans secundum anni tempus loca.

*Desc.* Similis sequenti, profunde cæruleus. *Thorax* lævis, semicylindrico-conicus, sulco transverso ut in *C. astaco*. *Corporis* latera & caudæ maculis albis inordinatis. *Pedes* crassitie digiti humani, prope apicem villosi : *antici* duo apice bipartiti s. sub cheliformes. *Antennæ* longitudine thoracis una cum cauda, ad latera corporis retrorsum projiciendæ, basi bicuspidatæ. *Tentacula* bipartita duo supra *antennas*. *Cauda* futuris 5 ; apex foliaceus, lobis 5, pulchre cæruleis.

*Ent. carn.*

*Astacus*. 45. *C.* ( l'écrevisse ) *macrourus*, thorace lævi, rostro lateribus dentato, basi utrinque dente unico.

*Scop. carn.* 1128.

*Schæff. elem.* t. 32.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 87.

*Gron. zoot.* 977. \*

*Ræf. inf. app.* 1. t. 54, 55.

*Matth. diosc.* 228.

*Rond. pisc.* 2. p. 210.

*Bellon. aquat.* 355.

*Gesn. aquat.* 104.

*Aldr. exsang.* 129.

*Jonst. exsang.* t. 4. f. 1.

*Sulz. inf.* t. 23. f. 151.

*Geoff. paris.* 2. p. 667. n. 1.

*Fab. astacus* 2. *antennis* posticis bifidis, reliqua ut in *Syst.*

*Pennant. zoot. brit.* 4. t. 15. f. 27.

*De Geer tom.* 7. p. 365. n. 1. t. 20.

*f.* 21, 22. *astacus fluviatilis*, thorace lævi, rostro supra dentato, basi utrinque dente unico, chelis maximis papilloso-scabris.

*Enum n.* 1114.

*Faun. Fridr. n.* 847.

*Hab.* in Europæ lacubus, fluviis. Nutritur in domibus hepate bovis; urticæ foliis conservatur diutius vivus aceto adperso. S.

*Desc.* Omnibus cognitus est cancer *astacus*; ætate variat magnitudine. *Oculi* duo, postice anticeque mobiles. *Palpi* numerosi basi mobiles. *Pedes* 10, brachiis computatis; *anteriores* s. brachia crassa, apice forcipata; *posteriorum* maris articulus primus excavatus. *Infra corpus* membranaceum foratum ad seminis dispersionem. Semen per foramen ovale pedum 5 & 6, juculatur ovaque fœminæ ad caudam transeunt subque cauda occultantur. *Cauda* natatoria. Pellem quotannis exuit, sed quod singularius, novus tunc formatur stomachus. Instante vernationis tempestate, lapides duo ad stomachi latera reperiuntur: earum usus ignotus, licet uti canceri *astaci* oculi dignoscantur. *Pedes*, antennæ, brachia fracta, denuo crescunt.

*Pennaceus.* 46. *C.* ( l'arlequin ) *macrourus*, thorace lævi cylindrico, rostro ensiformi, margine superiore ferrato.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 87.

*Fab.* *astacus locusta* 19. antennis posticis trifidis, thorace lævi, rostro porrecto supra ferrato, subtus lævi digitis elongatis filiformibus. *Mantiss. ast.* 21. An Europæus?

*Hab. in calidioribus regionibus.*

*Desc. Rostrum* elongatum supra ferratum, subtus læve. *Thorax* lævis margine utrinque unidentato. *Pedes antici* elongati, filiformes. *Manus* ovatae breves, digitis elongatis, linearibus, acutis. *Fab.*

Squilla. 47. C. ( la squille ) macrourus, thorace lævi, rostro supra ferrato subtus tridentato, manuum digitis æqualibus. \*

*Prawn*

*Scop. carn.* ~~1229.~~ 1129.

*Matth. diofc.* 229.

*Klein. dub.* 35. f. A.

*Rond. pisc.* 549.

*Seb. musf.* 3. t. 21. f. 9, 10.

*Baster. subsf.* 2. p. 30. f. 5. squilla fusca.

*Gron. zoop.* 986. \*

*Fab. astacus* 18. antennis posticis trifidis, thorace lævi, rostro supra ferrato, subtus tridentato, thoracis margine quinque dentato.

*Pennant. zoot. brit.* 4. t. 16. f. 28. *fig. lona*

*Sulz. hist. inf.* t. 23. f. 4.

*Hab. in mari Balthico, Oc. Europæo.*

*Desc. Rostrum* lanceolatum, perpediculare, acutum, supra octo crenis, infra tribus ferratum. *Manus*, quæ tertio pedum pari insident, digitis sunt æqualibus. *Faun.* 2037.

*Obs.* Variat rostro recto & incurvo. *Fab.*

Crangon. 48. C. ( crangon ) macrourus, thorace lævi, rostro integerrimo, manuum pollice longiore. \*

*Shrimp*

*Baster. subsf.* 2. p. 27. t. 3. f. 1. - 4. squilla marina.

*Gron. zoop.* 975.

*Seb. musf.* 3. t. 21. f. 8.

*Ræf. inf.* 3. t. 63. n. 1, 2.

*Fab. astacus* 20. antennis posticis trifidis,



thorace lævi, rostro brevi integerrimo, manuum pollice longiori.

*Pennant. zoot. brit. 4. t. 15. f. 30. fig. bona*

*Hab. in mari Balthico.*

*Desc.* Rostrum integerrimum, absque crenis aut spinis, brevissimum. Pollex in manibus, qui mobilis, chela longior, & ejus apice quasi infixus, chela tamen terminatur mucrone opposito breviori. Hisce chelis & rostro integerrimo facile distinguitur a sequenti, cum quo mixtus venum exponitur & editur pro una eademque specie. Magnitudo dein hujus sequentem parum superat. Olim etiam in Belgio sequenti mixtum sæpe vidi. *Faun. 2038.*

\*h\* *Macrouri thorace inæquali.*

*Carabus. 49. C. ( le carabé ) macrourus, thorace strigis imbricatis oblongiusculo antice ciliato, rostro bidentato mobili.*

*Hab. in M. Mediterraneo. E. Brander.*

*An Europæus?*

*Testa magnitudine extimi pollicis, supra lævis, sed rugis antrorsum imbricatis, margine antice denticulis ciliata. Rostrum dentibus 2 parallelis mobilibus depressis. Antennæ corpore longiores villis ciliatæ. Chelæ latissimæ compressæ cordatæ, anticæ truncatæ, pilis ciliatæ. Pedes unguibus falcatis. Cauda articulis 3 latis, deinde 3 angustis, extremo articulo ovato parvo, basi utrinque pedibus 2 parvis & postice setis aliquot longissimis.*

---

*Chelæ didactylæ gammaro, astaco, Norwagico, pennaceo.*

Strigofus. 50. C. ( le strié ) macrourus, thorace antrorsum rugoso spinis ciliato, rostro acuto septemdentato.

Cancer macrourus thorace chelisque angulatis hispidis. *Mus. Ad. Fr.* 87. \*

*Column. aquat.* 8. t. 6. astacus marinus.

*Jonst. exsang.* t. 2. f. 7. astacus similis pediculo marino.

*Gron. aët. helv.* 4. p. 23. t. 2. f. 1, 2. & 200p. 980.

*Barrel. rar.* t. 1288. f. 1.

*Seb. mus.* 3. t. 19. f. 19, 20.

*Fab. pagurus* 10.

*De Geer tom.* 7. p. 393. n. 2. t. 23.

f. 1.-4. thorace depresso rugoso lateraliter aculeato, rostro acuto septemdentato, chelis spinosissimis, pedibus posticis filiformibus.

*Aldrov. crust.* p. 123.

*Rondel. pisc. tom.* 1. p. 542. leo.

*Hab. in Oc.* Atlantico, Mediterraneo, Norwagico.

*Affines inter se sunt* strigofus, carabus, symnista & dorsipes *ob thoracem antrorsum imbricatum.*

Rostrium 7-dentatum, acutissimum. Thorax obovatus, antice transverse imbricatus, striis ciliatis antrorsum spectantibus. Statura arcuata anteriora thoracis distinguit. Brachia introrsum aculeata. Chelæ oblongæ, margine aculeatæ, latere superiore antrorsum imbricatæ scabritie ciliari. Pedes præterea 3 utrinque; quartum par minutum, apice muticum, villosum.

Symnista. 51. C. ( le secrétaire ) submacrourus, thorace subcylindrico ciliato - ferrato, chelis cordatis, antennis ciliato-pilosis. *M. L. U.* \*

*Fab. hippa* 2. thorace utrinque quadridentato, manibus chelatis. *Mantiss.* tom. 1. p. 329?

*Pennant. zoot. brit.* 4. t. 7. f. 13.

*Hab. in Asia. In Oc. Europæo. Mus.*  
*D. Banks. Fab.*

*Desc. Thorax* semicylindricus, oblongiusculus, rugis transversis inæqualibus: latera inæqualia, aucta spina antrorsum spectante. Margo anticus obtusissimus, ferratus, quasi ciliatus spinis minimis cum emarginatura ab utroque latere. *Folia* 2 (simul ovata) intra emarginaturam antrorsum spectantia. *Antennæ* corpore longiores, utrinque ciliatæ pilis. *Cauda* articulis 6, quorum 2 reliquis latiores; 1 & 4 lateribus brevissimi. *Brachia* inermia. *Manus* cordatæ, pilosæ. *Pollex* subulatus, arcuatus, inermis, acuminatus ad basin anteriorem. *Pedes* octo. *Plantæ* bifidæ, ciliatæ. *Lobus* anterior brevissimus, obtusus: posterior longior, falcatus. *M. L. U.* 453.

\*i\* *Macrouri thorace aculeato.*

Norwagi- 52. *C. (le Norwégien) macrourus*, thorace antrorsum aculeato, manibus prismaticis, angulis spinosis. \*

*It. scanic.* 307.

*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 88.

*Gron.* 200p. 979.

*Seb. mus.* 3. t. 21. f. 3.

*Aldr. exsang.* 113. *astacus mediæ magnitudinis* prior.

*Fab. astacus* 17.

*De Geer tom.* 7. p. 398. n. 3. t. 24.  
thorace convexo, capite aculeato,

chelis prismaticis elongatis, seriebus quaternis spinosis.

*Hab. in M. Norwagico.*

*Desc. Thorax* oblongus, teretiusculus, marginibus integris, antice a tergo adpersus spinis parvis antrorsum spectantibus. *Rostrum* thoracis subulatum, acuminatum, recta protensum, ad latera supra spinosum, sub apice notatum spinis duabus. *Cauda* thorace longior, articulis 6, lateribus acutangulis, pentaphylla, subæqualis. *Foliola* angulo dentata, margine ciliata. *Brachia* dentata. *Chelæ* thorace longiores, tetragonæ, angulis antrorsum obtuse dentatis serie fere duplici. *Pedes* octo inermes, teretes. *Digit*i duo ciliati. *M. L. U.* 456.

\*k\* *Mucrouri* manibus adauctylis, thorace oblongo:

*Arctus*. 53. C. (l'étroit) macrourus, thorace antrorsum aculeato, fronte diphylla, manibus subadauctylis.

*Margr. bras.* 186. poliquiquyixe.

*Jonst. exsang.* t. 4. f. 4, 8, 12.

*Barrel. ic.* 1288. f. 2.

*Rumph. mus.* t. 2. f. C. D.

*Brown. Jam.* t. 41. f. 1.

*Seb. mus.* 3. t. 20. f. 1.

*Fab. scyllarus* 1. antennarum squamis ciliato-aculeatis.

*Hab. in M. Europæ, Asiæ, Africæ, Americæ.*

*Frons* retusa, aculeis inter oculos circiter 10, inæqualibus. *Folia frontis* 2 duplici articulo, anteriore lato, obtuso, 7-fido, ciliato, posteriore acuminato, 7-dentato, subciliato. *Antennæ* longitudine foliorum, articulis 4, ultimo

*bifido, altero obtuso brevior. Thorax oblongus, inæqualis, quinquefariam antrorsum aculeatus. Caudæ articuli triplici area, prima lævi, secunda rugosa, tertia rugosa postice trifariam emarginata; apex pentaphyllus, obtusus. Manus crassiores, læves, longitudine foliorum frontis pollice terminali, digito brevissimo. Pedes læves, unguibus acutis.*

\*1\* *Macrouri manibus adactylis, testa thoracis brevissima, nec thoracem totum tegente.*

Mantis. 54. C. ( la mante ) macrourus articularis, manibus adactylis compressis falcatis ferrato-dentatis.

*Mus. Ad. Fr. 1. p. 86.*

*Scop. carn. 1135.*

*Rumph. mus. t. 3. f. E. C. arenarius.*

*Margr. bras. 186. t. 187. tamaruguacu.*

*Seb. mus. 3. t. 20. f. 2, 3.*

*Gron. zoop. 984.*

*Fab. squilla 1. manibus adactylis compressis, falcatis, ferrato-dentatis.*

*De Geer tom. 7. p. 533. n. 5. squilla mantis marina, corpore elongato, cauda lata depressa spinosa, pedibus anticis chelatis dentatis.*

*Sulz. hist. inf. t. 32. f. 2.*

*Hab. in M. Asiatico, Indico, Mediterraneo, Italis esculentus. spec. p. 514.*

*Thoracis testa membranacea. Pedes utrinque 3. Pollex ferrato-dentatus, terminalis. Dactyli sub abdomine trium parium. Antennæ trifidæ, lamina ovata ad oculos.*

---

*Species 76-87. ob thoracem lorica destitutum & singularem structuram corporis adeo a reliquis canceris recedunt, ut facile genus distinctum constituerent.*

*Obs.*



*Obs.* Genus omnino distinctum, inquit *D. Fabricius*, cujus descriptio sequens.  
*Desc.* *Os* mandibulis palpisque absque maxillis. *Palpi* sex inæquales. *Anteriores* laterales, elongati, compressi, arcuati, filiformes, quinquearticulati, articulo secundo longissimo, ultimo brevissimo, rotundato, ciliato. *Medii* breves, lati, compressi, os obtegentes, quadriarticulati, articulis subæqualibus; ultimo acutiusculo, ciliato. *Posteriores* breves, filiformes, triarticulati, articulis subæqualibus, compressis; mandibulæ dorso adhærentes. *Mandibula* crassa, cornea, apice compressa, concava, dentata, processu laterali elongato, subulato, lateribus dentatis. *Labium* duplex: *exterius* breve, corneum, bifidum, laciniis concavis, fissis, laminis æqualibus, exteriore subulata, acutissima, interiori apice latiori, truncata, ciliata; *interius* breve, subcorneum, bifidum laciniis distantibus, quadratis, angulatis, obtusis. *Clypeus* rotundatus, concavus, fornicatus, integer. *Antennæ* quatuor, subæquales; *anteriores* pedunculatæ, setaceæ, multiarticulatæ, articulis brevissimis, pedunculo triarticulato; extus lamina ovata ciliata basi articulata suffultæ; *posteriores* pedunculatæ pedunculo quadriarticulato, setaceæ multiarticulatæ, trifidæ.

Grossipes. 55. C. ( le grossipede ) macrourus articularis, manibus adactylis longitudine corporis. †

*Gron. zooph.* 989. astacus muticus, pede antico subulato edentulo longissimo crassissimo.

*Fab. gammarus* 4.

*It. Norwag.*

*Pall. spicil. 1001. fasc. 9. 59. t. 4. f. 9.*

*Hab. in Belgii aquis stagnantibus.*

*Pulex.* 56. *C. ( la puce ) macrourus articularis*,  
manibus quatuor adactylis pedibus de-  
cem. *t. 11. f. 13.*

*It. Øl. 42. 96. \**

*Frisch. inf. 7. t. 18.*

*Raj. inf. 44. pulex fluviatilis.*

*Raf. 3. app. t. 62.*

*Baster. subs. 2. p. 31. t. 3. f. 7. pulex  
marinus.*

*Geoff. paris. 2. p. 667. t. 21. f. 6.*

*Gron. 100ph. 990.*

*Fab. gammarus.*

*Scop. carn. 1137.*

*De Geer tom. 7. p. 525. n. 4. t. 33.*

*f. 1.-10. squilla pulex aquatica*, cor-  
pore compresso, pedibus quatuor an-  
ticis chelatis, cauda setis sex bifurcis  
terminata.

*Enum. n. 1115.*

*Hab.* ad maris littora, etiam in fontibus  
& fossis, dorso innatans, consumitur  
a recurvirostra.

*Antennæ* 4. *Pedes* 7 *parium*, quorum  
*paria* 4 *antrorsum versa*; horum duo  
*paria* *antica chelifera digito mobili*,  
*absque pollice. Paria* 3 *posteriora re-*  
*trorsum versa.*

*Obs. 1.* Saliens, piscibus infestus, in  
branchiis aliera caussans. Destruit retia  
piscatoribus invisus. *Fab.*

*Obs. 2.* *La crevette des ruisseaux a cinq  
pattes de chaque côté.* *D. Geoff. tom. 2.  
p. 667.* Si cet insecte n'avoit réellement  
que cinq pattes de chaque côté, il pour-  
roit être placé ou avec les crabes

ou avec les écrevisses ; mais il en a réellement sept paires. D. de Geer. tom. 7. p. 531.

*Obs.* 3. Nec *D. Fab.* nec *D. Schrank.* inf. parif. tab. que *Ræf.* citaverunt ; cancer tamen *pulex* Syft. aſtacusque n. 2 *D. Geoff.* ſynonymi. V.

*Locuſta.* 57. C. ( la fauterelle ) macrourus articu-  
laris , manibus quatuor adactylis , pe-  
dibus quatuordecim. \*

*It. Gotl.* 260.

*Ræf. inf.* 3. t. 62.

*Klein. miſſ.* 5. t. 6. f. A , B , C.

*Sulz. inf.* t. 23. f. 152.

*Fab. gammarus* 5 , manibus quatuor adac-  
tylis , pedibus quatuordecim , femo-  
ribus ſimplicibus.

*Pall. ſpicil. zool. faſc.* 9. 57. t. 4. f. 8 ?

*Hab. in Europæ* maritimis , etiam in fon-  
tibus & ſoſſis.

*Deſc.* Præcedenti major. *Totus* cæruleus.

*Roſtrum* nullum prominens. *Corpus* 14  
articulis. *Cauda* trifaria , intermedio  
ſubulato. *Faun.* 20042.

*Antennæ* 4. *Corpus articulis* 4. *Roſtrum*  
*obtuſum.* *Manus duorum parium* , adac-  
tylæ , breves. *Pedes dein* 7 parium ,  
angusti. *Spurii pedes ſub cauda* 3 pa-  
rium , apice ſetacei. *Pediculi* unius  
paris *caudæ lateribus adſtant* , bidigi-  
tati. *Cauda acuta* , brevis.

*Linearis.* 58. C. ( le linéaire ) macrourus articu-  
laris , manibus quatuor monodactylis ,  
pedibus decem.

*Nartenſ. ſpit.* 56. t. P. f. I.

*Fab. gammarus.* 8.

*Pall. ſpicil. zool. faſc.* 9. t. 4. f. 15.

*Baſt. Sulz.* 1. 32. t. 4. f. 2.

*Hab. in Oc. Europæo. Konig. In insula Terra-Nova. Mus. D. Banks.*

*Corpus lineare, articulis 6 præter caput. Antennæ duorum parium. Oculi sessiles. Pedes decem chelis ovato oblongis, monodactylis, s. in articulo corporis (excepto capite) primo; secundum par proximum, sub articulo corporis secundo. Paria 3, 4, 5 prope caudam sita, chelis similibus.*

Atomos. 59. C. ( l'atome ) macrourus linearis articularis, manibus adactylis, pedibus undecim. †

*Baßer. subsf. 1. 32. t. 4. f. 2.*

*Fab. gammarus 8 a præcedenti vix differt.*

*Hab. in Europæ aquis fluctuantibus dulcibus, nudis oculis vix visibilis, præcedenti affinis.*

Salinus. 60. C. ( des salines ) macrourus articularis, manibus adactylis, pedibus patentibus, cauda subulata.

*Matii. diar. britann. 1756.*

*Fab. gammarus 9, pedibus viginti patentibus, cauda subulata.*

*Hab. in Angliæ Limingtonianis. D. Schlofferus.*

*Corpus pediculo majus, oblongum. Oculi distantes, laterales, pedunculati. Antennæ sericeæ; corpore breviores. Cauda filiformi-subulata, exserta, longitudine corporis. Pedes utrinque 10 patentes & quasi pinnatim digesti.*

Stagnalis. 61. C. ( des étangs ) macrourus articularis, manibus adactylis, pedibus patentibus, cauda cylindrica bifida. \*

*Schæff. monogr. . . . Apus.*



*Fab. gammarus* 10.

*Hab. in* Europæ aquis dulcibus, in fissuris rupium retentis. (An larva cujusdam ephemeræ.)

*Desc. Facies* piscis minimi, longitudo pollicis transversi. *Caput* depressum. *Oculi* parvi, fusci, laterales, distantes. *Antennæ* capillares. *Frons* obtusa. *Rostrum* obtusum, inflexum ut in cicada, angustum, obtusiusculum. *Dorsum* convexum, subincarnatum. *Cauda* teretiuscula, articulata, longitudine fere corporis, pinna horizontali bifida acuta. *Globulus* magnitudine seminis sinapios ad regionem ani, coccineus, auro nitens, splendens ad latera flavus. *Pedes* multi (12 circiter) ad latera corporis, ab utroque latere imbricatum dispositi. *Natat* in dorso uti noto-necta. *Fœmina* solo globulo instruitur, quod forte ovarium, ut peracta metamorphosi, præsto sint ova. *Faun.* 2043.

*Ex spec. D. Fab.*

Oculatus. 62. C. (l'oculé) pagurus parasiticus, chelis muricatis æqualibus, oculorum pedunculis longitudine thoracis.

*Hab. in* murice brandaris.

*Desc. Statura* C. *Bernhardi*. *Corpus* totum ferrugineum. *Oculorum* pedunculi porrecti, cylindrici, basi dente armati. *Brachia* utrinque macula sanguinea. *Chelæ* scabræ.

Alatus. 63. C. (l'ailé) pagurus parasiticus, manibus lævibus trialatis; dextra majore.

*Hab. in* Islandiæ bullis.

*Desc. Chelæ* articulo penultimo scabro,



ultimo five manu lævi, alis tribus prominentibus acutis.

Araneifor- 64. C. ( l'aranéiforme ) pagurus parasiticus, mis. chelis scabris, cauda apice callosa unguiculata.

*Hab. in fissuris rupium maris Edimburgi, intrans helices & turbines.*

*Desc.* Parvus, obscure cinerascens; margo supra oculos spinis duabus parvis. *Chelæ* ovatæ, scabræ. *Pedes* quatuor postici breves, obtusi, reflexi, unguiculo brevissimo. *Cauda* cylindrica, mollis terminatur callo globoso, unguiculato.

Rugosus. 65. C. ( le ridé ) pagurus thorace rugoso, antice ciliato spinoso, rostro tridentato, manibus filiformibus. *Astacus* 8.

*Hab. in mari Mediterraneo.*

*Desc.* Affinitas summa C. *strigosi*, cujus forte varietas. Loco rostri dentes tres acutissimi, intermedio majori. Ad basin dentes duo elevati, oculi. Margo thoracis anticus spinosus.

Narval. 66. C. ( le narval ) astacus antennis posticis bifidis rostro longissimo, adscendente, compresso, utrinque ferrato.

*Mantiss. tom. 1. 331. n. 5.*

*Herbst. cancr. f. 134.*

*Hab. in mari Mediterraneo.*

*Desc.* Statura & magnitudine C. *crangonis*. Rostrum valde porrectum, utrinque subtilissime ferratum. *Cauda* lamellis quinque, intermedia subulata.

Homari. 67. C. ( du homar ) astacus antennis posticis bifidis, corporis segmentis dorso

subspinosis , cauda fasciculata , stylis ferratis. *Astacus* 7.

*It. Norwag.*

*Stroem. act. Hafn. \* p. 5. t. 2.*

*Müll. Zool. Dan. 197. 2358.*

*Hab. in Oc. Norwagico. Minutus.*

Harengum. 68. C. ( des harengs ) *astacus* antennis posticis bifidis porrectis , rostro subulato , oculis globosis prominentibus. *Astacus* 8.

*It. Norwag.*

*Hab. in Oc. Norwagico copiosissime , harengum & gadorum esca.*

*Desc. Minutus. Marum* articulus primus & secundus pedunculi antennarum posticarum apice interiori articulati , forte genitalis.

Histro. 69. C. ( l'arlequin ) antennis posticis bifidis , thoracis margine bidentato , rostro lanceolato ferrato , corpore variegato. *Astacus* 10.

*Hab. in Groelandia.*

*Desc. Statura & magnitudo C. crangonis. Palpi* apice spinosi. *Rostrum* porrectum , subtus in medio dilatatum , unidentatum , supra ferratum. *Thorax* cylindricus , margine antico tridentato. *Corpus* rufo cinereoque variegatum. *Cauda* foliolis quinque , intermedio lineis duabus spinis.

Boreas. 70. C. ( le Boréal ) *astacus* antennis posticis bifidis , thorace aculeato , pedibus secundi tertiiue paris filiformibus. *Astacus* 12.

*Phipps iter. Boreal. 190. t. 12. f. 1.*

*Hab. in Oc. Boreali. Mus. D. Banks.*  
*An Europæus ?*

*Desc.* *Rostrum* breve depressum, utrinque canaliculatum, acutum subtus dente valido.

Groenlan- 71. C. ( le Groenlandois ) *astacus* antennis  
dicus.

posticis bifidis, thoracis margine antico rostroque dentatis, palpis apice spinosis, corpore fusco. *Astacus* 14.

*Hab.* in M. Groenlandico.

*Desc.* *Rostrum* porrectum, supra trisubtus bidentatum. *Palpi* *antici* spinis apice ciliati. *Antennæ* *anticae* longissimæ, albo rubroque variegatæ. *Thoracis* margo *anticus* tridentatus & dorsum carinatum dentibus quatuor. *Abdominis* segmenta inæqualia utrinque spina terminantur. *Cauda* quinque phylla, foliolo intermedio lineis duabus dentatis.

Varius. 72. C. ( le varié ) antennis posticis bifidis, thoracis margine unidentato, rostro utrinque serrato, corpore variegato. *Astacus* 15.

*It.* Norwag.

*Hab.* in Norwagico.

*Desc.* *Antennæ* posteriores breves. *Pedes* secundi paris filiformes, reliquis longiores.

Tettigo- 73. C. ( l'Islandois ) *astacus* antennis pos-  
ticipis. ticipis bifidis, thorace spinoso, pedibus quatuor anticis filiformibus. *Astacus* 21.

*Hab.* in Islandia. Dr. Koenig.

*Desc.* *Rostrum* breve, inflexum, bidentatum. *Thorax* *carinatus*, carina bidentata. Margo unidentatus. *Manus* *adactylæ*, subcylindricæ, spina unica, rigida, acuta & ungue falcato, mobili.

*Obs.* 1. Affinis. *C. Boreæ.*

*Obs.* 2. Varietas minor carina thoracis tridentata vix distincta.

Nugax. 74. *C.* ( le dilaté ) manibus adauctylis , pedibus quatuordecim , femoribus sex potticis compresso-dilatatis. *Gammarus* 2. *Phipps iter. Boreal.* 192. t. 12. f. 2. cancer nugax macrourus , articularis , pedibus quatuordecim simplicibus , laminis femorum sex posteriorum dilatatis , subrotundo cordatis.

*Hab.* in Oc. Boreali. *Mus. D. Banks.*

*Desc.* *Antennæ* quatuor , posterioribus seta minori suffultis.

Cancellus. 75. *C.* ( le Sibérien ) manibus quatuor monodauctylis pedibus sedecim. *Gammarus* 3. *Pall. spicil. zool. fasc.* 9. 53. t. 3. f. 18.

*Hab.* in Sibiria aquis.

*Desc.* Major *C. locusta.* *Antennæ* anticae incurvæ.

Corniger. 76. *C.* ( le porte-corne ) manibus adauctylis , rostro incurvo subulato , thoracis lateribus cornu duplici. *Gammarus* 7.

*It.* *Norwag.*

*Hab.* in Oc. Norwagico.

Gibbosus. 77. *C.* ( le bossu ) oblongus gibbus , antennis plicatis longissimis. *Mantiss.* *Gammarus* 11.

*Oniscus gibbosus* spec. 15.

*Hab.* in Oc. Lusitanico. Fig. pict. in *Mus. Bankiano.*

*Desc.* *Corpus* parvum , glabrum , læve , flavescens , punctis fuscis irroratum. *Caput* crassum , obtusum , oculis duobus maximis approximatis , macula magna

viridi. *Antennæ* duæ setaceæ , sub corpore inflexæ & plicatæ , corpore triplo longiores. *Thorax* gibbus , segmentis septem , primo brevissimo. *Abdomen* segmentis quatuor. *Cauda* foliolis tribus acuminatis. *Pedes* 14 , intermediis sublongioribus.

Esca. 78. C. ( l'utile ) manibus adactylis , cauda articulata apice fissâ.

*It. Norwag.*

*Hab. in* Oc. Norwagico , harengum cibus gratissimus.

Medusa- 79. C. ( des méduses ) manibus quatuor  
rum. monodactylis , capite obtusissimo. *Mant.*  
*Gammarus* 12.

*Oniscus quadricornis* , oblongus , stylis caudalibus senis , antennis quatuor.  
*spec. n.* 16.

*Hab. in* mari Atlantico. *Mus. D. Banks.*

*Desc. Corpus* parvum , gibbum , glabrum.

*Caput* retusum. *Oculi* maximi , macula magna lunata viridi. *Antennæ* quatuor setaceæ , longitudine corporis. *Corpus* segmentis duodecim , ultimo planiusculo , ovato , integro. *Cauda* exserta , stylis sex acutis , integris. *Abdomen* subtus foliatum. *Pedes* 14 subæquales.





## GENUS XI.

MONOCULUS. *Pedes* natatorii.

*Corpus* crusta tectum.

*Oculi* approximati, *testæ* innati.

Piscinus. 1. M. ( le plumet ) *testa* cordata plana.

*Læst. act. Ups.* 1750. p. 42. t.

*Baster. subf.* 2. p. 137. t. 8. f. 9, 10.

*Stroen. fondm.* t. I. f. 4, 5, 6.

*Geoff. paris.* 660. t. 21. f. 3. binoculus.

*Fab.* 2.

*Hab.* in Oceano.

*Hujus* duo distincta sunt individua, sexu an specie diversa. Stylatus duabus antennis corpore longioribus. Muticus absque exsertis antennis. Confer. Cl. Basteron.

*Desc.* Affinis monoculo foliaceo. Clypeus patens, subrotundus, convexus, subtus concavus. Corpus posticum obcordatum, gibbum. Cauda cylindrico-fubulata, longitudine corporis postici, apice bifida. Cylindri duo ad caudam, subarticulati, obtusi, in quibusdam corpore longiores. *Pedes* sub clypeo sex, at inter clypeum & corpus duo longiores. *Faun.* 2045.

Apus. 2. M. ( l'armé ) *testa* subcompressa antice retusa postice truncata, cauda bifeta.\*

*Scop. carn.* 1138.

*Frisch. inf.* 10. t. 1.

*Act. Angl.* 40. p. 150. t. 1. f. 2.

*Schæff. monogr.* 1756. t. 1.-6.

— *elem.* t. 29. f. 1.

*Sulz. inf. t. 24. f. 153.*

*Geoff. paris. 660. n. 1. t. 21. f. 4.*

*Fab. 3. antennis trifidis, cauda bifida.*

*Faun. Fridr. n. 848.*

*Hab. in Europæ fossis, piscinis.*

*Desc. Corpus subvirescens, magnitudine glandis. Oculi bini approximati in vertice. Pedes multi, ramosi. Cauda setis duadus, validis, interjecta lamella.*

*Faun. 2046.*

*Obs. 1. Oculi 2. Antennæ simplices. Geoff.*

*Obs. 2. Æstate desiccati, reviviscunt affluente aqua. Fab.*

*Pulex. 3. M. ( la puce-branchue ) antennis dichotomis, cauda inflexa. \**

*Geoff. paris. 659. n. 1.*

*Swamm. quart. 66. t. 1.*

*— bibl. t. 31. f. 1, 2, 3.*

*Schæff. monogr. 1755. t. 1. f. 1.-8.*

*— elem. t. 29. f. 4.*

*Joblot. micr. 1. pp. 2. t. 13. f. P. Q. R.*

*Lederm. micr. 146. t. 72. f. 2.*

*Fab. 4.*

*De Geer tom. 7. p. 442. n. 1. t. 27.*

*f. 1.-8. ramosus, brachiis dichotomis, cauda appendiculata inflexa, testa postice unispinosa.*

*Redi obs. t. 16. f. 5.*

*Trembley mém. des Polyp. t. 6. f. 3.-11. puceron-branchu.*

*Merret. pen. 207. Vermes minimi rubri aquam stagnalem colore rubro inficientes, unde vulgus dira protendit.*

*Sulz. hist. inf. t. 30. f. 10.*

*Faun. Fridr. n. 849.*

*Enum. n. 1115.*

*Frisch. inf. deut. part. 7. p. 26. §. 18.*

*Scop. carn. n. 1117.*

*Hab.* ubique in aquis dulcibus, tanta sæpe in copia, ut aqua appareat sanguinea. *Amæn. acad.* 3. p. 320.

*Desc.* *Caput* infra rostriforme, licet ore gaudeat. *Oculus* mobilis in capitis vertice & non duo oculi coaliti. *Animal totum* crustaceum; *crusta* ovali postice subulata. *Brachia* duo ramosa natatoria, ad lentem conspicienda. *Pedum* numerus structuraque non facile determinanda. *Cauda* mobilis, apice bifurcata.

*Pediculus.* 4. *M.* (le pou-branchu) antennis dichotomis, cauda reflexa.

*Geoff. paris.* 656. n. 2.

*Fab.* 7.

*Sulz. hist. inf.* t. 30. f. 8.

*De Geer tom.* 7. p. 467. n. 4. t. 28.

f. 9. - 13. *pediculus ramosus* brachiis dichotomis, cauda bifida, rectiuscula, exserta, pedibus nudis.

*Hab.* in Europæ aquis dulcibus.

*Desc.* *Caput* ovatum utrinque convexum; *Pedes* octo natatorii, pilis mobilibus celeriter natat.

*Quadricor-* 5. *M.* (le quadricorne) antennis quaternis; nis. cauda recta bifida. \*

*Scop. carn.* 1129.

*Geoff. paris.* 656. n. 3. t. 21. f. 5.

*Baker. micr.* t. 9. f. 1, 2.

*Blank. inf.* 149. t. 13. f. B.

*Joblot. micr.* 1. pp. 2. t. 14. f. C. D.

*De Geer act. Stockh.* 1747. t. 6. f. 2.

*Act. Angl. abbrev.* 2. p. 258. t. 20. f. 5, 6.

*Ræf. inf.* 3. 98. f. 1, 2, 4.

*Leuvenh. arc.* 142. f. 1.

---

*Monoculi* pariunt & ova & vivos fatus; exsiccati æstate reviviscunt affluente aqua.

*Fab.* 8.

*De Geer tom.* 7. *p.* 483. *n.* 7. *t.* 29.  
*f.* 11, 12. – *t.* 30. *f.* 1.–9. cornubus  
 quaternis mobilibus setaceis, corpore  
 ovato, cauda longa, recta, cylindrica,  
 bifida.

*Enum.* *n.* 1117.

*Faun. Fridr.* *n.* 850.

*Hab.* in aquis Europæ.

*Desc.* *Antennarum* duo paria. *Cauda* tenuis, longiuscula, duplex, setis instructa versus apicem; subcauda utrinque racemus ovorum, hinc cancris valde affinis. *Corpus* fuscum est, at ovaria, quæ juxta caudam utrinque extenduntur ovata, sunt lutea, simul sumta magnitudine fere totum corpus æquant & tanquam uvæ binæ petiolatæ adhærent. *Faun.* 2049.

*Conchaceus.* 6. *M.* ( l'ovale ) *antennis* capillaribus multiplicibus, *testa* bivalvi. \*

*Geoff. paris.* 657. *n.* 4.

*Fab.* 9.

*Enum.* *n.* 1118.

*Müll. Lin. Nat. cl.* v. *p.* 1114.

*De Geer tom.* 7. *p.* 476. *n.* 2. *t.* 29.

*f.* 5. – 10. ovato – conchaceus, *testa* ovata bivalvi, brachiis apice capillareis multiplicibus intra testam.

*Hab.* in aquis dulcibus, ubi volitat uti pullus conchæ.

*Curiosis micrographis examinandum commendando animalculum monoculo conchaceo simile, sed minus, latitans solitarium intra pellucidos utriculos utriculariæ vulgaris, tantum non omnes, cujus motus extus conspicuus, observatum 1766. Jun. 11. a Car. Linné, filio: Prof. Bot. Ups.*

*Desc.* Testa semine brassicæ major, ovata, oblonguifcula, utrinque æqualis, antice gibba & parum retusa adeoque similis concha, sed in conchis apertura est a latere tenuiore & cardo ubi gibba magis est; contra vero in hac; hæc extracta ex aquis tota clauditur, ut crederes semen cujusdam plantæ; in aquis dum hiat, jurares concham esse. Celeriter fertur per aquas, uti reliqui monoculi, testa cinerea impura est. Dum aperit testam, exferit multos capillos æquales, albidos, in altera extremitate aperturæ; hos capillos motitando fertur agilis per aquas, non quiescit antequam vel cochleam vel aliquod terrestre reperit, hic confedit cum sociis lubenter & pedibus supra hoc corpus incedit & affigitur. Totum corpus intra testam latet, dum quiescit. *Faun.* 2050.

*Obs.* Ætate variat magnitudo, color magis minusve viridis.

Lenticularis. 7. M. ( le lenticulaire ) testa compressa lentiformi. \*

*Hab.* in Filandia. *Uddman.*

*Desc.* Testa valde compressa margine acuto, pellucida. Latitudo extimi articuli digiti. *Faun.* 2051.

*Ex oper.* D. de Geer.

Bispinosus. 8. M. ( l'épineux ) brachiis dichotomis; capite rostrato, cauda inflexa, testa postice spinosa. *tom.* 7. *p.* 463. *n.* 3. f. 3, 4.

*Fab.* 6. Antennis dichotomis, cauda inflexa, testa postice bidentata, capite acuminato.



*Hab. in aquis dulcibus.*

*Desc. Caput* sæpius apice conico prolongatum. *Similis* *M. pulici*, sed *testa* differt. *Cauda* mobilis. *Pedum* numerus incertus.

Elongatus. 9. *M. ( l'alongé )* corpore elongato ; brachiis dichotomis , setis plurimis , cauda lateraliter exserta. *tom. 7. n. 5. t. 11. f. 14.*

*Hab. sub Nymphææ foliis.*

*Desc. Diaphanus. Testa* bivalvis. In parte antica capitis supra tuberculum angulare , infra rostrum angulare. *Brachia* duo ramosa in parte corporis antica , quibus natat & foliis *Nymphææ* adhæret. *Corpus* elongatum. *Cauda* mobili terminatum.

*Obs. Insecta phosphorica in celeb. & infelicis Cookii itineribus memorata ad hoc genus pertinent ; saltem ex observationibus D. Godchen Derville constat quædam insecta hujus generis phosphorica esse. Mémoire des Savans étrangers. tom. 3. p. 169. t. 10. f. 1, 2, 3.*

Exspinofus. 10. *M. ( le foible )* brachiis dichotomis ; cauda simplici inflexa , testa postice rotundata non spinosa. *tom. 4. p. 457. t. 27. f. 9.-13. - t. 28. f. 3.-8.*

*Schæff. Abb. von. Inf. t. 1. p. 299. t. 1. f. 9.*

*Hab. in aquis stagnantibus.*

*Desc. Corpus* ovatum utrinque depressum. *Caput* supra convexum , antice truncatum. *Brachia* ramosa. *Abdomen* cauda recurvata mobili terminatum.

*Ex*

*Ex Enum.*

Infusorius. 11. M. ( l'imperceptible ) rostratus, testa bivalvi, oculis duobus in rostro setis.

*Hab.* copiosus in stagnis; congenerum forte minimus.

Gasteros- 12. M. ( du gasteroste )  
tei.

*Geoff.* binoculus 3.

*Hab.* in pisce gasteroste.

*Obs.* 1. Oculus inter hujus generis characteres jure ac merito non admittit *Linn.* licet enim punctum nigrum capitis, ut unus oculus, a nonnullis Entomologis judicatum fuerit, forsan tamen ex duobus oculis coalitis oculus hic constat. V.

*Obs.* 2. Ex hoc genere quasdam species eruit *D. Geoff.* quas sub novo binoculi genere condidit. Novum hoc genus omnino inutile videtur; omnes enim notæ characteristicæ monoculis *Syst.* & binoculis *inf. paris.* conveniunt. V.



## GENUS XII.

ONISCUS. *Pedes* XIV.*Antennæ* setaceæ.*Corpus* ovale.*Afilus*, 1. O. ( l'afille ) abdomine oliis duobus  
obtectō, cauda semiovali.*Mus. Ad. Fr.* 1. p. 88.*Gron. zooph.* 997.*Bell. aquat.* 443. *afilus* f. oestrum.*Rond. pisc.* 576. *pediculus marinus*.*Fab.* 3.*Planc. de conch. minus notis.* t. 5. f. *A. B.**Pall. spicil. zool. fasc.* IX. p. 71. t. 4. f. 12.*Hab. in Oceano Europæo.* *Viviparus*.*Oestrum*, 2. O. ( l'oestre ) abdomine foliis sex ob-  
tectō, cauda retusa.*Mus. Reg.* 89.*Margr. bras.* 155. f. 3, 4. *animalculum*  
*crustaceum*.*Stroem. sondm.* 165. n. 2. t. 1. f. 2, 3.*Fab.* 3.*Pall. spicil. zool. fasc.* IX. p. 74. t. 4.  
f. 13.*Seb. mus.* 1. t. 90.*Hab. in Oceano Europæo.**Pfora*, 3. O. ( l'anti - galeux ) abdomine subtus  
nudo, cauda semiovali acuta. \**Fab.* 3.*Hab. in Oceano Norwagico.**Desc.* Magnitudo præcedentium. *Thorac*  
*segmentis* 7 æqualibus. *Cauda* segmentis  
quinque angustioribus, præter ultimum

quod femiovale, sed acutum. *Antennæ*  $\frac{1}{4}$  totius longitudinis. *Pedes* XIV, quorum 6 primi antrorsum versi digito incurvo & affixi corpori articulo arcuato. *Abdomen* nudum. *Cauda* obtecta foliolis angustis non excidentibus. Ovarium externe contra scabiem specificum Norwagis. *Solander. Faun.* 2054.

Phyfodes. 4. O. ( la quadricorne ) abdomine subtus nudo, cauda ovata.

*Fab.* 13. abdomine subtus nudo, cauda ovata, antennis quaternis.

*Sulz. hist. inf. t.* 30. f. II.

*Hab.* in Oceano. In terra del Fuego.

*Mus. D. Banks.*

Corpus, præter caput & caudam ultimam, ex 7 segmentis trunci, & 5 caudæ. *Antennæ* utrinque 2, breves. *Caudæ* folium terminale omnino ovatum; ad latera utrinque subtus auctum duobus petiolis diphyllis, foliolis lanceolatis, obtusis, cauda brevioribus; caudæ articuli subtus obtekti numerosis vesiculis longitudine caudæ.

Entomon. 5. O. ( Entomon ) abdomine subtus nudo, cauda subulata. \*

*Raj. inf.* 43. asellus marinus cornubiensis alius.

*Pet. gaz. t.* I. f. 4.

*Gron. zooph.* 992.

*Baster. subsf.* 2. p. 143. t. 13. f. 2.

*Klein. dub.* 38. f. 1, 2. Entomon pyramidale.

*Fab.* 5.

*De Geer tom.* 7. p. 514. n. 2. t. 32.

f. II. - 14. squilla marina, cauda longa, subulata, crustacea.

*Pall. spicil. zool. fasc.* IX. p. 64. t. 5. f. I.

*Hab. in Mari Balthico.*

*Desc.* Magnitudo extimi articuli pollicis ; supra convexus, infra planus, margine undique acuto. *Capitis* clypeus undique incisus est. *Pedes anteriores* utrinque tres, minores, glabri ; *posteriores* utrinque quatuor, majores, ciliati. *Antennarum* in fronte bina paria. *Corpus* septem incisuris, præter caput & caudam. *Cauda* duas tertias partes corporis longitudine æquat, indivisa, tereti-triangularis, subtus vestita radiis duobus convexis, parallellis. *Totum* animal, exceptis oculis, album. *Faun.* 2055.

*Obs.* Natat velocissime, viçitat cancris, piscibus, piscatoribus invisus. *Fab.*

Ceti. 6. O. ( de la baleine ) ovalis, segmentis distinctis, pedibus tertii quartique paris linearibus ovaticis.

*Mus. Ad. Fred.* 1. p. 89. \*

*Fab.* 17.

*De Geer tom.* 7. p. 541. n. 6. t. 42. f. 6.-10. squilla *balæni*, corpore ovali depresso, segmentis distinctis, pedibus cheliferis, tertii quartique paris linearibus muticis.

*Martens it. Spitzb.* t. 8. f. D.

*Pall. spicil. zool. fasc.* IX, 76. t. 4. f. 14.

*Eged. Groenl.* t. 37.

*Hab.* in balænis, distinguendus a phalangio *balænarum*, simili.

*Desc.* Corpus ovale, 7 articulis distinctis.

*Caput*, quod primus articulus, minimum. *Pedes* 1, 2, 5, 6, 7, *chelis* crassis ungue mobili acuto terminatis. *Pedes* vero 3, 4, paris filiformes mutici; primum par sub corpore situm est. *Corporis* articuli magis remoti &



distincti, quam in reliquis speciebus.  
*Faun.* 2056.

*Obs.* Ab hoc genere hunc oniscum separavit *D. de Geer* & sub genere squillarum uti plurimos alios ordinavit. Ab oniscis differre videtur & ulterius examinandus; *antennæ* enim quatuor. V.

Marinus. 7. O. ( le marin ) semicylindricus, cauda ovato-oblonga integra.

*It. Wgoth.* 190.

*Gron. zooph.* 996. t. 17. f. 3?

*Fab.* 7. semicylindricus, cauda ovato-oblonga acuminata.

*De Geer tom.* 7. p. 522. n. 3. t. 32. f. 11. - 14. *squilla marina*, corpore elongato semicylindrico, cauda oblonga æquali, apice truncata.

*Bast. opusc. subf. tom.* 2. p. 143. t. 13. f. 2.

*Pall. spicil. zool. fasc.* IX, 66. t. 4. f. 6. oniscus Balthicus.

*Hab.* in Oceano Norwagico.

*Desc.* Caput corporis latitudine, antice quadratum. *Antennæ* quatuor; *exterior*es setaceæ, longæ, articulis plurimis. *Corpus* cylindraceum, incisuris 11, septem aliis majoribus. *Pedes* 14, breves, conici; singuli articulis sex. *Cauda* supra convexa, apice truncata, lunata.

2-Caudatus. 8. O. ( la double queue ) semicylindricus, caudis duabus longitudine corporis. \*

*Fab* 10.

*Hab.* in Oceano Norwagico.

*Desc.* *Corpus* semicylindricum, fuscum; 12 articulis. *Pedes* utrinque 7 albi, quorum solitarii *postici* reflexi. *Caudæ* 2 protensæ, longitudine corporis, 5

articulis, quorum tertius major, longior & crassior; primus & secundus breves; quartus & quintus angustiores. Inter has caudas, *caudæ* 2 aliæ, breves, subulatæ. *Faun.* 2062.

Scopulorum. 9. O. ( des écueils ) luteus strigis fuscis.

*It. W'goth.* 190.

*Stroem. fondm.* 166. n. 3.

*Fab.* 11.

*Hab.* in Oceano Norwagico.

Aquaticus. 10. O. ( l'aquatique ) lanceolatus, cauda rotundata, stylis bifurcis. \*

*Raj. inf.* 43.

*Frisch. inf.* 10. t. 5.

*Geoff. paris.* 672. t. 22. f. 2. asellus 1.

*Schæff. elem.* t. 22.

*Fab.* 6. cauda rotundata, stylis bifurcis, antennis quaternis.

*Faun. Fridr.* n. 853.

*De Geer tom.* 7. p. 496. squilla asellus aquatica, cauda rotundata stylis binis bifurcis.

*Enum.* n. 1120.

*Müll. Lin. Nat. cl.* v. p. 1151.

*Hab.* in aquis puris.

*Confer. Entomoz. hieroglyphicum, Klein. dub.* f. 5, sed maximum.

*Desc.* Constat articulis septem, præter caudam & caput. *Caudæ* articulus reliquis, ut & ipso capite major, planus, subrotundus, e quo prodeunt duo styli, singuli bifidi. *Pedes* utrinque septem, quorum *posteriores* semper longiores *antecedentibus*. *Antennæ* setaceæ, articulis tribus. *Faun.* 2061.

*Obs.* 1. Novum genus sub nomine aselli apud *D. Geoff.* squilla 1 *D. de Geer.* In genere oniscorum conservavit *D. Fab.*

hujusque celeb. Entomologi *Squilla* genus ab eodem *D. de Geer.* genere omnino diversum. Hinc tyronum ambages. V.

*Obs.* 2. Mas, ut in astacis, fœmina major. Post copulam crescit hæc species, sed metamorphosin nullam subit. Ubique & in omni tempestate reperitur. Non natat. V.

*Obs.* 3. Pulli intra folliculum sexfidum matris. *Fab.*

Oceanicus. 11. O. ( l'océanique ) ovalis, cauda bifida stylis bifidis.

*Stroem. fœndm.* 202. t. 1. f. 14, 15.  
oniscus stylis caudæ utrinque binis.

*Baster. subsf.* 26. p. 145. t. 13. f. 4.

*Ad. helv.* 5. p. 371. t. 5. f. 463. O. corpore lato, pedibus natatoriis, cauda utraque bifida.

*Gron. zooph.* 994. t. 17. f. 2.

*Fab.* 18.

*Hab.* in Oceano Europæo.

*Simillimus* O. afello, ut, nisi locus dissuaderet, facile idem judicaretur.

Affimilis. 12. O. ( l'analogue ) ovalis, cauda obtusa mutica.

*Baster. subsf.* 2. p. 144. t. 13. f. 3.

*Fab.* 19. ovalis, cauda obtusa mutica, corpore cinereo.

*Raj. inf.* 43. afellus marinus vulgari brevior & latior.

*Pall. spicil. zool. fasc.* IX, 70. t. 4. f. 18?  
Oniscus globator.

*Hab.* in Oceani Europæi fucis.

*Simillimus* O. afello, sed absque stylis.

Afellus. 13. O. ( le cloporte ) ovalis, cauda obtusa, stylis simplicibus.

*Scop. carn.* 1142.

*Matth. diofc.* 257.

*Raj. inf.* 41. n. 1.

*Aldr. inf.* 632.

*Mouff. inf.* 202.

*Schæff. elem.* t. 92.

*Gron. zooph.* 993.

*Sulz. inf.* t. 24. f. 154.

*Geoff. paris.* 678. t. 22. f. 1. oniscus 2,  
le cloporte ordinaire.

*Fab.* 22.

*Faun. Fridr. n.* 852.

*De Geer tom.* 7. p. 547. oniscus ovalis,  
subdepressus, flavo maculatus, cauda  
stylis duobus conicis articulatis.

*Enum. n.* 1121.

*Müll. Lin. Nat. cl.* v. p. 1152.

*Pod. gr.* p. 126.

*Hab.* in domibus, muris, hybernaculis,  
lignis putridis.

*Desc.* Ab omnibus cognitus est. Variat,  
1°. Colore fuscescente, macula albida  
femicirculari prope caput.

2°. Colore subferugineo, corpore im-  
maculato.

3°. Corpore lineis maculisque parvis for-  
didis variegato, quali in sylvis hab.  
intra truncos cariosos.

*Obs.* Recens natus, pedes 13 & 14 incisura  
aque una abdominis defunt. *D. de Geer.*

*Armadillo.* 14. O. ( l'armadille ) ovalis, cauda obtusa  
integra. \*

*It. Goth.* 298.

*Scop. carn.* 1144.

*Raj. inf.* 42. A. lividus.

*Geoff. paris.* 670. oniscus 1.

*Fab.* 23.

*Sulz. hist. inf.* t. 30. f. 13.

*Enum. n.* 1122.

*Pod. gr. p.* 726.

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p.* 1153.

*Hab. in* Europa, sub lapidibus.

*Desc.* Totus niger, marginibus segmentorum albis; macula alba sub femoribus posterioribus in singula incisura. Cauda obtusa, integra, nec bifurca. Tactus se contrahit in globum immobilem, durum, uti *armadillo*, quietus diu jacet, ut ignoto pro pilula vel puppa ichneumonis omnino haberetur. *Pedes* pures quam quatuordecim, segmenta corporis 10, præter caudam & caput. *Syst. Faun.* 2059.

*Ex spec. D. Fab.*

Chelipes. 15. O. ( le porte-pince ) oblongus, cauda tridentata, pedibus subcheliformibus. 9.

*Pall. Micell.* 194. t. 14. f. 16, 17. depressus oblongus, pedibus omnibus subcheliformibus.

— *spicil. zool. fasc.* IX, 69. t. 4. f. 17. oniscus linearis.

*Bast. subs.* 2, 143. t. 13. f. 2. med.

*Hab.* inter Maris Atlantici fucos.

Spinosus. 16. O. ( l'épineux ) oblongus, corpore spinoso pellucido 14.

*Hab. in* Oceano Atlantico. *Mus. D. Banks.*

*Desc.* Corpus medium, gelatinofo-membranaceum, pellucidum. Caput magnum, rotundatum, obtusum, marginibus spinosis. Oculi maximi, contigui. *Antennæ* duæ simplices ferratæ. Segmenta corporis undecim sensim angustiora, carinata, carina spinulosa. *Abdomen* subtus foliolis sex ovatis obtegentibus. Cauda brevis, foliolis quatuor bifidis. *Pedum* septem



paria, 1, 2, brevia, chelata, approximata; 3, 4, 5, 6 longiora, angulata, angulis spinulosis, articulo ultimo subulato, simplici, 7 breve, articulo ultimo clavato, unguiculato.

*Albicornis.* 17. O. ( l'albicorne ) oblongus fuscus, cauda pallida, nigro punctata. *Mantiff.* tom. I. n. 16.

*Hab. in* Mari Hispanico, pisces confumens. *D. Vahl.*

*Desc.* Minor O. *Oceanico.* *Antennæ* corpore duplo breviores. *Corpus* fuscum, segmentorum marginibus subpallidioribus. *Cauda* foliolis quinque pallida, atomis sparsis nigris. *Pedes* pallidi.

*Serratus.* 18. O. ( le dentelé ) ovatus fuscus, cauda foliolis quinque, exterioribus extus ferratis. *Mantiff.* 19.

*Hab. in* Oceano Hispanico. *D. Vahl.*

*Desc.* *Corpus* parvum, ovatum, breve, totum fuscum. *Cauda* foliolis quinque, intermedio majori ovato, obtuso, lateralibus angustioribus externe ferratis.

*Macillatus.* 19. O. ( le tacheté ) ovalis, cauda obtusa mutica, corpore plumbeo, lineis punctatis albis.

*Hab. in* Italia. *Dr. Allioni.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* Statura O. *armadillo*, at triplo major. *Color* totius corporis plumbeus, lineis septem longitudinalibus, punctis albis, extimis marginalibus.

*Pustulatus.* 20. O. ( le pustulé ) ovalis ater, segmento primo punctis quatuor, reliquis duobus rubris 21.

*Scop. carn.* III 4. oniscus armadillo.

*Hab.* in Lusitania. *D. Gray.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* Differt manifeste ab *O. armadillo*. primum segmentum atrum, nitidum, punctis quatuor rubris, reliqua segmenta pallidiora punctis duobus.

*Obs.* In nostris puncta lutea, sed eadem species videtur. V.

*Ex Ent. Carn.*

Muscorum. 21. *O.* ( des mouffes ) oblongus, antennis quadrinodiis, cauda lamellis parvis lanceolatis binis acuminatis.

*Hab.* in Europa, non rarus in sylvis inter muscos, imo & circa hortos sub faxis.

*Desc.* Corpus fuscum, luteo maculatum. Segmenta corporis 7, caudæ 6. *Antennæ* attenuatæ. Caudæ futura ultima mucronem effert, sub quo alius bifidus, segmentis pilo terminatis. Lamellæ duæ posticæ huic uni propriæ.

*Ex oper. D. de Geer.*

Convexus. 22. *O.* ( le voûté ) ovalis convexus immaculatus, cauda stylis duobus convexis articulatis.

*Hab.* in Europa, Suecia. In Gallia Aust. Lugdunum prope.

*Desc.* *O. asello* affinis, sed magis convexus. *Totus* murinus, immaculatus. Tactus, ut *O. armadillo*, globosus evadit. *O. aselli* forsan variatas.

*Ex nost. Mus.*

Marginatus 23. *O.* ( le bordé ) niger, segmentis corporis luteo marginatis. t. II. f. 15.

*Hab.* in Europa. In Gallia Australiori. V.  
*Desc.* Parvus, niger. Segmenta omnia,  
 luteo nitido marginata. Tactus se con-  
 trahit ut *O. armadillo*.

Variegatus. 24. *O.* ( le varié ) niger, segmentis cor-  
 poris nigris, albo marginatis, in  
 medio variegatis. t. II. f. 16.

*Hab.* in Europa. In Gallia Aust. prope  
 Nemaufum.

*Desc.* *O. asello* paullo minor. Segmenta  
 corporis antice & postice albo margi-  
 nata; pars posterior nigra, anterior  
 albido, flavo griseoque variegata.  
 Colores ita distributi, ut spatium cur-  
 vum unicuique proprium, constituent.  
 Tactus se contrahit, sed non omnino  
 in globum immobilem. Macula flava in  
 medio segmentorum.

*Obs.* Varietas singularis in nostro mus.  
 Quatuor segmenta antica ut in des-  
 criptione: reliqua alba.

Bicolor. 25. *O.* ( le bicolor ) murinus, corporis  
 segmentis 6 murinis, reliquis nigris.

*Hab.* in Europa. In Gallia Australiori.

*Desc.* Medius. *Caput* & corporis segmenta  
 sex murina, lineolis aliquot nigris.  
 Septimum nigrum lateraliter primis  
 concolor. Reliqua nigra, griseo mar-  
 ginata; *subtus* totus griseus. Rarissimus.



## GENUS XIII.

SCOLOPENDRA. *Pedes* numerosi totidem utrinque quot corporis segmenta.

*Antennæ* setaceæ.

*Palpi* duo, articulati.

*Corpus* depressum.

Lagura. 1. S. ( le pinceau ) pedibus utrinque XII, corpore ovali, cauda penicillo albo.\*

*Scop. carn.* 1153.

*Geoff. paris.* 2. p. 677. t. 22. f. 4.

*Ad. paris. miss.* 1. p. 532. t. 17. f. 4.—10.

*Fab.* 1.

*De Geer tom.* 7. p. 571. n. 1. f. 1.—18.  
julus penicillatus, fasciculis squamosis,  
cauda penicillo albo, pedibus utrinque XII.

*Faun. Fridr. n.* 854.

*Hab. in* Suecia, sub muscis.

*Desc.* Magnitudo pediculi : utrinque pedes 12, a tergo penicillus expansus supra singulos pedes, dein in medio dorso transversalis fasciculus. *Cauda* constat penicillo majori pilorum conniventium majorum. *Faun.* 2063.

*Obs.* Hanc scolopendram inter julos numeraverunt *DD. de Geer Scopoli*que; cur ad scolopendras retulerit *Linn.* Non video inquit *D. de Geer*; characteres enim huic generi proprii, scolopendræ *laguræ* defunt.

*Corpus* depressum articulatum.

---

*Scolopendræ pulli* f. *larvæ* pedibus paucioribus instruuntur.

*Pedes* numerosi totidem quot segmenta corporis.

*Antennæ* setaceæ.

*Oculi* plures, distincti, hemispherici.

*Dentes* 2 curvati.

*Palpi* 2 articulati sub capite.

---

*Julus*. Corpus cylindricum, articulatum.

*Pedes* numerosi, segmentis utrinque duplo plures.

*Antennæ* filiformes, breves.

*Oculi* 2 reticulati.

*Dentes* 2.

Hanc scolopendram optime descripsit *D. de Geer*, ipsaque descriptio forsan dubium solvet. *Pedes* 24, utrinque 12, singulum par, singulo abdominis incisuris, quæ nota scolopendris convenit. Recens nata hæc species omnibus pedibus abdominis incisuris minime gaudet; sed hanc *D. de Geer* observationem toto scolopendrarum generi applicavit *D. Geoff.* hocque insectum, uti *D. Fab. Schrank*, &c. ad scolopendras retulit. V.

**Coleoptrata.** 2. *S.* ( la coléoptère ) pedibus utrinque XIV, thorace coleoptrato.

*Fab.* 2. pedibus utrinque 14, elongatis, thorace scutellato.

*Pall. spicil. zool. fasc. 9. 85. t. 4. f. 16.*

*Hab. in Hispania. D. Z. Hallman.* In Europa Australi. *Fab.* In Galliæ Aust. domibus. V.

*Antennæ* flavæ, longitudine corporis.

Corpus figura *S.* forficatæ, sed longius, segmentis 8, singulis tectis clypeolo semiorbiculato, postice emarginato. Elytron simplex, tanquam ex duobus coadunatum, postice emarginatum, incipiens ad 4tum. segmentum



corporis, tegens unum tantum alterumve segmentum. Alæ sub elytro angustæ, simplices. Pedes 14 paribus, ultimis longitudine ferme corporis. Femora aculeata. Tibiæ scabræ. Digitus articulis innumeris.

*Obs.* Singulare insectum, tempore pluviali frequenter in nostris domibus obvium. Corpus tribus lineis longitudinalibus nigris e lineolis nigris compositis. Femora & tibiæ flavescencia, nigro variegata. V.

Forficata. 3. S. ( la forchue ) pedibus utrinque XV.

*Scop. carn.* 1146.

*Raj. inf.* 45.

*Mouff. inf.* 199.

*Aldr. exsang.* 635.

*Sulz. inf. t.* 24. f. 155.

*Geoff. paris. t.* 2. p. 674. t. 22. f. 3.

*Schæff. elem. t.* III. f. I.

*Fab.* 3.

*De Geer tom.* 7. p. 557. n. I. t. 35.

f. 12.-16. rufo-fusca, pedibus utrinque XV.

*Enum. n.* 1123.

*Pod. gr. p.* 126.

*Faun. Fridr. n.* 855.

*Hab.* in Europa, in America septentrionali. *Kalm.*

*Desc.* Rubra est, vix digitum transversum longa. Pedes antici crassi & validi, ultimi longissimi; hinc cauda quasi cauda bifurca. Corporis articuli alterni reliquis dimidio breviores. *Faun.* 2064.

Morsitans. 4. S. ( la mordante ) pedibus utrinque XX.

*Amœn. acad.* I. p. 325, 506. t. II.

f. 17. - f. 18. junior.

*Mus. Ad. Fr.* I. p. 89.

*Olear. mus. t. 12. f. 5.*

*Pet. gaz. t. 13. f. 3.*

*Leuwenh. epist. 102.*

*Brald. nat. t. 25. f. 4.*

*Seb. mus. 1. t. 81. f. 3, 4.*

—— 2. t. 25. f. 3, 4.

*Frisch. inf. 11. t. 2. f. 7.*

*Catesb. car. 3. p. 2. t. 2.*

*Gron. zooph. 1002.*

*Margr. bras. 253. japuruca.*

*Fab. 5.*

*De Geer tom. 7. p. 563. n. 1. t. 43.*

f. 1.-4. pedibus utrinque XXI, posterioribus spinosis.

*Sulz. hist. inf. t. 30. f. 14.*

*Schoet. abhand. 1. t. 3. f. 2.*

*Hab. in Indiis. In Gallia Aust. circa Massiliam. V.*

*Oculi utrinque quaterni. Articuli corporis 22, antennarum 20.*

*Obs.* Licet hæc scolopendra ab omnibus Entomologis, ut exotica, indicata fuerit, in Europa indigena hodie videtur. Statura oculorum, articulorumque corporis numerus, posteriorum spinæ, nostræ conveniunt; sed pedes 21; computatis posterioribus. Variat magnitudine; dantur enim quæ 5 pollices longæ, dum alia 3 vel quatuor; nec est scolopendra *ferruginea*, quæ adhuc circa Massiliam indigena est. V.

*Ferruginea. 5. S. ( la ferrugineuse ) pedibus utrinque XXII.*

*Fab. 6.*

*De Geer p. 568. n. 2. t. 43. f. 6. pedibus utrinque XXIII, posterioribus longiusculis bispinosis.*

*Hab. in Africa. In Gallia Aust. circa Massiliam. V.*

Corpus

Corpus rufum *f. ferrugineum segmentis*  
20, *præter caput. Pedes lutei.*

An varietas præcedentis? An species? Nec  
statura nec forsan pedum numerus  
species hujus generis satis distinguunt  
optimeque animadvertit *D. Schrank* in-  
*fundamentum præbere pedum nume-*  
*rum in hac & sequenti specie; forficata*  
*enim scolop. occurrit pedibus utrinque*  
*13, 15, 22, nec verum, inquit idem*  
*doctus Entomologus, hanc varietatem*  
*ætatis esse; minores possideo species quæ*  
*pedes plures habent, dum multo*  
*majoribus pauciores obtigerint. Insuper*  
*variat numerus spinarum pedum poste-*  
*riorum, sed si duæ species, ambæ*  
*in Gallia Aust. V. Faun. 2064.*

Gabrielis. 6. S. ( la Gabriele ) pedibus utrinque  
CXLVIII.

*Fab. 9.*

*Hab. in Gallia Fr. Gabriel Baro, Massi-*  
*liensis Capucinus.*

*Facies S. electicæ, sed quadruplo major.*  
*Antennæ breves articulis 14. Cauda*  
*semiovalis cum appendiculo & tentaculis*  
*2 vix cauda longioribus.*

Electica. 7. S. ( l'électrique ) pedibus utrinque  
LXX. \*

*Aldr. inf. 636. f. 8.*

*Frisch. inf. 11. t. 8. f. 1.*

*Raj. inf. 45.*

*Geoff. paris. 2. p. 676. n. 2.*

*Fab. 10.*

*De Geer tom. 7. p. 561. n. 2. t. 35.*

*f. 17. - 20. flava, capite pedibusque*  
*utrinque LIV rufis.*

*Enum. n. 1124.*

*Pod. gr. p. 126.*

*Insect. Tomus IV.*

N

*Müll. Lin. Nat. cl. v. p. 1159.*

*Faun. Fridr. n. 856.*

*Hab. in Europæ terra, in tenebris manifeste scintillat vel per se lucet.*

*Pedes numeratu difficiles, 46 ad 54. Solander.*

*Desc. Rubra est, plana, filiformis, serpentis instar flexuosæ. Pedes 54 a singulo latere Frischius numerat, nostra 70 vel 78 obtinet. Faun. 2065.*

Marina. 8. S. ( la marine ) pedibus utrinque. .... corpore pallido, linea dorsali rufa.

*It. W'goth. 191.*

*Fab. 13.*

*Stroem. fundm. I. 160.*

*Hab. in Oceano Atlantico, Norwagico.*

*Corpus rubrum ( unde Rædaat ), Norwagis frequentissimum, Clupearum Harengarum esca, unde abdomen piscium rufescit & corpus brevi pubescit, nisi saltem per biduum relinquuntur pisces retibus illaqueati in mari. Stroem.*







Fig. 1.



# INSECTA APTEA, Tab. XI.

<p>Fig. 1.</p> <p><i>Lepifina</i>, <i>Saccharina</i>.</p> <p>Forbicine, la Saccharine.</p>	<p>Fig. 2.</p> <p><i>Podura</i>, <i>Aquatica-grisea</i>.</p> <p>Podure, l'Aquatique-grise.</p>	<p>Fig. 3.</p> <p><i>Termes Pulsatorium</i>.</p> <p>Termite, Pou du Bois.</p>	<p>Fig. 4.</p> <p><i>Pediculus Mergi</i>.</p> <p>Le Pou du plongeon.</p>
<p>Fig. 5.</p> <p><i>Pulex Irritans</i>.</p> <p>La Puce.</p>	<p>Fig. 6.</p> <p><i>Acarus</i>, <i>Exulcerans</i>.</p> <p>Mitte, de la Gallè.</p>	<p>Fig. 7.</p> <p><i>Phalangium</i>, <i>Cancroides</i>.</p> <p>Le Faucheur, Faux-Scorpion.</p>	<p>Fig. 8.</p> <p><i>Aranea</i>, <i>Moniligera</i>.</p> <p>Araignée, Porte-anneau.</p>
<p>Fig. 9.</p> <p><i>Aranea</i>, <i>Punctoria</i>.</p> <p>Araignée, la Dangereuse.</p>	<p>Fig. 10.</p> <p><i>Aranea</i>, <i>Formosa</i>.</p> <p>Araignée, la Belle.</p>	<p>Fig. 11.</p> <p><i>Scorpio</i>, <i>Europeus</i>.</p> <p>Scorpion, l'Européen.</p>	<p>Fig. 12.</p> <p><i>Cancer</i>, <i>Dodecos</i>.</p> <p>Crabe, le Formidable.</p>
<p>Fig. 13.</p> <p><i>Cancer</i>, <i>Pulex</i>.</p> <p>Crabe, la Puce.</p>	<p>Fig. 14.</p> <p><i>Monoculus</i>, <i>Elongatus</i>.</p> <p>Monocle, l'Alongé.</p>	<p>Fig. 15.</p> <p><i>Oniscus</i>, <i>Marginatus</i>.</p> <p>Cloporte, le Bordé.</p>	<p>Fig. 16.</p> <p><i>Oniscus</i>, <i>Variegatus</i>.</p> <p>Cloporte, le Varié.</p>
<p>Fig. 17.</p> <p><i>Scolopendra</i>, <i>Morsitans</i>.</p> <p>Scolopendre, la Mordante.</p>	<p>Fig. 18.</p> <p><i>Scolopendra Morsitans</i>, <i>Junior</i>.</p> <p>Scolopendre Mordante, Jeune.</p>	<p>Fig. 19.</p> <p><i>Julus</i>, <i>Complanatus</i>.</p> <p>Jule, l'Aplati.</p>	



## GENUS XIV.

JULUS. *Pedes* numerosi, duplo utrinque plures,  
quam corporis segmenta.

*Antennæ* moniliformes.

*Palpi* duo, articulati.

*Corpus* semicylindricum.

Ovalis. 1. J. ( l'ovale ) pedibus utrinque XX.

*Amæn. acad.* 4. p. 253. n. 36. t. 3.

f. 4. \*

*Gron. zooph.* 995. t. 17. f. 4, 5. \* oniscus.

*Fab.* 1.

*Hab.* in Oceano Europæo.

*Segmenta corporis oblongo ovalis* 10,  
*præter thoracis & caudæ.*

Terrestris. 2. J. ( le terrestre ) pedibus utrinque C. \*

*Scop. carn.* 1152.

*Mouff. inf.* 30.

*Raj. inf.* 46. n. 4.

*Aldr. inf.* 636. f. 4.

*Frisch. inf.* 11. t. 8. f. 3.

*Jonst. inf.* t. 23.

*Geoff. paris.* 67. n. 1.

*Gron. zooph.* 1007.

*Fab.* 4.

*Sulz. inf.* t. 24. f. 156.

— *hist. inf.* t. 30. f. 15.

*De Geer tom.* 7. p. 578. n. 2. t. 36.

f. 9.-12. nigro-fuscus, lineis binis longitudinalibus rufis, pedibus utrinque C.

*Enum.* n. 1125.

*Pall. spicil. zool. fasc.* 9. p. 85.

*Beytr. Zur. nat.* p. 97. §. 70.

N ij



*Faun. Fridr. n. 857.*

*Hab. in Europa, sub terra.*

*Desc. Corpus* subcylindricum, fuscum : dorsum linea longitudinali duplici ferruginea notatum. *Antennæ* 5 articulis, quorum ultimus subglobosus. Datur & niger *totus* & minor simul. *Faun. 2066.*

Complana- 3. J. ( l'aplati ) pedibus utrinque XXX, tus. corpore planiusculo, antennis clavatis. \* t. II. f. 19.

*Scop. carn. 1150.* scolopendra julacea.

*Pod. inf. 127.* julus scolopendricus.

*Fab. 5.* pedibus utrinque 30, corpore planiusculo.

*De Geer tom. 7. p. 586. n. 3. t. 36. f. 23. - 26.* fuscus, pedibus utrinque XXXI, segmentis corporis clypeolis planiusculis marginatis.

*Enum. n. 1127.*

*Faun. Fridr. n. 858.*

*Geoff. inf. tom. 2. p. 675. n. 3.* scolopendra fusca, pedibus utrinque triginta, teste *D. Fab.*

*Hab. in Europa. In Anglia frequens Fab. In Gallia. Aust. V.*

*Desc. Corpus* longitudine unguis, planiusculum, lineare, lateribus angulatum, supra pallidum, subtus albescentis, segmentis 20, testum clypeolis supra planiusculis, tuberculatis, marginatis, subquadratis, ad latera ferrulatis, angulatis, posticis acutis, extra corporis segmenta parum extantibus. *Primum* segmentum est caput ovatum depressum; *secundum* s. collum testum clypeo antice rotundato, postice truncato s. lunato; *tertium* & *quartum* segmentum reliquis breviora & fere linearia, *Segmentum 20* s. cauda,



triangulare s. acuminatum leve. *Pedes* utrinque 30, scilicet sub singulo segmento duo paria, at segmento 3, 4, 18, 19 unicum tantum par pedum. *Antennæ* capite triplo longiores, sex articulatæ; 5 articulus, subglobosus, obscurior; 6tus. minimus est. *Faun.* 2068.

*Obs.* 1. *Julus* hic ab omnibus Entomologis descriptus fuit; sed nec *D. Linn.* nec *D. de Geer*, nec *D. Schrank* scolopendram n. 3. *D. Geoff.* citaverunt. Solus *D. Fab.* synonymiam admisit. In *Enum.* descriptio deest, observat tantum magnitudinis variationem *D. Schrank.* *Parvus* plerumque, possideo tamen specimen 10 lineas longum, 1  $\frac{1}{2}$  lin. crassum. Noster ejusdem est magnitudinis. Color margaritaceus, nitidus. *Corpus* annulis viginti. Primus duoque ultimi pedibus carent; sub segmento 2, 3, 4 unicum tantum par pedum; pedes igitur 62 s. 31 in utroque latere. *Corpus* infra complanatum ut supra. *Antennæ* 7 articulis, articulo sexto crassiore, ultimo minimo. V.

*Obs.* 2. Ex his patet julum complanatum esse scolopendram n. 3. *D. Geoff.* etsi tantisper differt; synonymiam igitur *D. Fab.* bono jure conservavi. V.

Sabulosus. 4. *J.* ( du sable ) pedibus utrinque CXX.

*It. Goth.* 280.

*Geoff. paris.* 679. n. 2. t. 22. f. 5.

*Raj. inf.* 47.

*Schæff. elem.* t. 73.

*Fab.* 7.

*Hab.* in Europæ sabulosis.

*Desc.* Longitudo pollicis tranversi; crassities 8 pennæ columbinæ. Glaber cinereus, lineis duabus longitudinalibus

dorsalibus ferrugineis , pallidis. *Corpus* segmentis 50 , substriatis , segmento ultimo acumine prominente. *Antennæ* 5 articulis. *Pedes* exalbidi. Tarsus in spiram planam , pedibus tamen spectantibus , contrahitur. *Faun.* 2067.

*Obs.* Lineæ horizontales minime constantes. V.

Varius. 5. J. ( le varié ) pedibus utrinque 78 , segmentis basi nigris apice albis. *D. Fab.*

*Hab.* in Italia. *Dr. Allioni.*

*Desc. Medius.* *Caput* nigrum , fascia media alba. Segmenta corporis albiba ; basi nigra. Margo tenuissime ferrugineus. *Pedes* nigri.





## INSECTORUM

## ILLUSTRATIONES.

## SCARABÆUS.

Lunaris. 2. *S. Variat minor*, cornubus minoribus,  
*Obs.* Varietas hæc circa Lugdunum.

Cylindricus. 3. *S. Sulz. inf. t. I. f. 2.*  
*Laichart. inf. 4. 4.*  
*Scep. introduc. hist. nat. 5. 75.*

Mobilicor- 4. *S. Jablonsk. coleopt. I. t. 8. f. 6, 7.*  
 nis. *Laichart. inf. t. I. f. II.*  
*Obs.* Fœmina omnino mutica. *Corpus*  
*nigrum. Elytra striata.*

Hispanus. 7. *S. Voet. scar. t. 24. f. 13.*

Silenus. 19. *S. Desc. Statura & summa affinitas scar.*  
*naïcornis. Totus piceus. Capitis cornu*  
*parvum subulatum, valde recurvum.*  
*Thorax antice valde excavatus. Elytra*  
*lævia.*

Scybala- 20. *S. Desc. Caput & thorax atra, nitida,*  
 rius. *tuberculis capitis tribus, intermedio*  
*acutiori. Elytra striata testacea, ma-*  
*cula marginali nigra.*  
*Herbst. arch. 6. scarabæus fœtidus.*  
*Obs.* Variat elytris immaculatis.

Terrestris. 21. S. Desc. Affinis scar. *fossori*, at triplo minor. Tubercula *capitis* minora, breviora, obtusiora. *Elytra* striata.

Testaceus. 22. S. Desc. Statura scar. *vernalis*, at triplo minor. Totus pallide testaceus. Tubercula duo parva in fronte. Thorax convexus, punctis vagis plurimis adspersus. *Elytra* striata, striis punctatis. Subtus hirtus.

Bicolor. 23. S. Desc. Corpus parvum ovatum, gibbum. Caput nigrum, ore antennisque rufis. Clypeus subrotundus, integer, in medio tuberculo elevato reflexo. Thorax ater, glaber, punctatus, in medio canaliculatus, utrinque puncto parvo prominulo. *Elytra* atra, striata. Subtus uti & pedes rufi.

Sordidus. 24. S. Desc. Statura scar. *conspurcati*, at paullo major. Clypeus rotundatus, integer, niger, macula utrinque pallida tuberculisque tribus, intermedio subcornuto. Thorax lævis, glaber, ater, margine omni pallido; punctum utrinque nigrum in margine pallido. *Elytra* striata grisea, futura obscuriori. Subtus nigro griseoque variagatus, pedibus pallidis.

Luridus. 25. S. Desc. Caput & thorax, atra, nitida, mutica. *Elytra* striata, grisea, lineolis maculisque nigris.

Vitulus. 26. S. Desc. Magnitudo & stratura scar. *vaccæ*. Clypeus rotundatus ater, medio linea transversa elevata, pollice corniculis duobus elevatis brevibus. Thorax antice quadridentatus, denticulis æqualibus

brevibus, postice rotundatus absque scutello. *Elytra* brevia, atra. *Pedes* atri.

Verticicor-27. S. Desc. Statura & summa affinitas scar. *nuchicornis*, at minor. Capitis *clypeus* rotundatus æneus, cornu brevissimo recurvo. *Thorax* rotundatus inermis, griseus, punctis duobus anticis & unico ad latera nigris. *Elytra* lævia grisea. *Pedes* pallidi.

Lemur. 28. S. Desc. Statura omnino scar. *nuchicornis*, at distincta species. Capitis *clypeus* antice rotundatus, integer, postice carinis duabus, transversis elevatis. *Thorax* rotundatus, cupreus, antice dentibus quatuor brevibus, intermediis approximatis. *Elytra* testacea. *Corpus* nigrum.

*Ad. nat. cur. hall.* 237.

Ater. 29. S. Desc. Niger. Caput tribus tuberculis transversalibus. *Thocax* concavo punctatus. *Elytra* striis punctatis vix conspicuis.

Pillularius. 32. S. Pall. icon. t. A. f. 3. scarabæus mopfus.

*Sulz. icon. t. I. f. 7.*

Fullo. 40. S. Pall. itin. 2. 718. 4. scarabæus albus?

—— *icon. I. 19. t. B. f. 21.* scarabæus hololeucos vix distinctus.

Agricola. 41. S. Variat interdum fascia obsoleta.

Morio, 62, S. *Cetonia morio* potius quam *cetonia funesta* D. Fab.



**Testudinarius.** 63. *S. Desc.* Parvus, statura scar. *fulcati*.  
*Capitis clypeus* rotundatus, vix tuberculatus. *Thorax* scaber ater. *Elytra* profunde fulcata picea, punctis ferrugineis per paria dispositis adspersa. *Pedes* picei.

**Merdarius.** 64. *S. Deleatur.* Mera scar. *quisquilii* varietas videtur.

**Porcatus.** 65. *S. Desc.* Statura & magnitudo scar. *asper*. *Totus* obscure fuscus. *Elytra* porcata vel profunde fulcata, sulcis transversim striati.

**Asper.** 66. *S. Desc.* Magnitudo & statura scar. *testudinarii*. *Capitis clypeus* emarginatus. *Pedes* rufescentes.

**Flavipes.** 67. *S. Desc.* Statura omnino scar. *cinclii*.  
*Clypeus* integer, niger. *Thorax* rotundatus, niger, margine omni pallido laterali puncto impresso. *Elytra* obscure pallescentia. *Pedes* flavi.  
*Laichart.* I, 24, 17.

**Ruficornis.** 68. *S. Desc.* *Caput* nigricans, antennis rufis. *Thorax* & *pectus* villis densis tecti. *Elytra* testacea immaculata. *Abdomen* albidum, ano nigricante. *Pedes* nigri.

**Oblongus.** 69. *S. Desc.* Minor scar. *vulgari*. *Totus* niger glaber. *Oculi* testacei. *Elytra* striis per paria approximatis, subpunctatis, obsoleti.

**Frischii.** 70. *S. Desc.* Simillimus scar. *horticola*, at duplo major. *Caput* & *thorax* obscure

ænea, glabra, nitida. *Scutellum* rotundatum, æneum. *Elytra* testacea, sutura virescente.

Vitis. 71. S. Desc. Nimis præcedenti affinis. *Corpus* viride, *thoracis* lateribus flavis. *Pedes* nigri.

Arvicola. 72. S. Desc. Nimis affinis scar. *horticola*, at color totius corporis niger.

Praticola. 73. S. Desc. Affinis scar. *agricola*, at clypeus haud reflexus. Variat colore uti scar: *agricola*. *Thorax* mox magis flavus, mox magis niger. *Scutellum* nigrum. *Elytra* pallide testacea, interdum facia media nigra.

Ruricola. 74. S. Desc. Statura scar. *horticola*. *Clypeus* rotundatus integer. *Caput*, *thorax* & *abdomen* atra, holosericea, immaculata. *Elytra* rufo-testacea, undique cincta margine nigro holosericeo.

Variat rarius. elytris obscuris, margine tamen super obscuriore.

Humoralis. 75. S. Desc. Parvus. *Caput* atrum, clypeo reflexo truncato integro. *Thorax* ater immaculatus. *Elytra* substriata, basi pallida, puncto nigro. Punctum parvum pallidum in medio elytrorum. *Pedes* nigri.

Hirtus. 76. S. Desc. *Caput* & *thorax* viridia, nitida, pilis albis elongatis hirta antennisque piceis. *Scutellum* viride. *Elytra* fusca, pilis albis hirta margineque pilis erectis nigris ciliato. *Sutura* parum virescit. *Subtus* pilis albis densioribus tecta. *Pedes* virides, nitidi.

*Pall. icon. t. A. f. 15. scarabæus alop-  
pecias.*

**Vulpes. 77.** *S. Desc. Clypeus brevis integer, aureus, margine nigricante. Thorax aureus, pilis fulvis elongatis densissimis tectus. Elytra magis testacea, itidem pilis elongatis fulvis tecta. Abdomen rufum basi nigrum apice pube, forte maris, cornea, inflexa, bidentata. Pedes aurei.*

**4-Punctatus. 78.** *S. Desc. Magnitudo & statura scar. morionis, at puncta quatuor minutissima alba in thorace.*

**Villosus. 79.** *S. Desc. Statura & magnitudo scar. vulgaris. Clypeus major quam in reliquis, apicibus reflexis. Thorax rotundatus niger, ferrugineo pubescens, imprimis macula laterali. Scutellum albo villosum. Elytra testacea, rarius fusca. Subtus corpus lana alba densa tectum.*

**Abdominalis. 80.** *S. Desc. Nimis affinis scar. M. horticola. Antennæ testaceæ. Pedes nigri.*

**Copris. 81.** *S. Desc. Caput clypeatum nigrum. Palpi nigri. Thorax nitide ater, basi rufa, margine flavescenti. Elytra ferruginea, futura margineque nigris. Abdomen pedesque nigra. Tibiæ anticæ tridentatæ.*

**Chrysomelæ. 82.** *S. Desc. scutellatus. Tibiæ anticæ bidentatæ.*

*Habitus prorsus chrysomelæ, ni pedes & antennæ vetarent. Melolontha 75. Mant.  
Hab. in Europa, in ligno putrescente.*

**Alpinus. 83.** *S. Desc. exscutellatus. Elytra fusco-nigra, uti lucanicervi, apice in magis rubentem*

colorem definunt, longitudinaliter decem lineis exarantur. Cætera ater. *Tibiæ anticæ* tridentatæ.

Variegatus. 86. S. Desc. Caput nigrum. *Antennæ* nigrae, capitulo trifido. Caput postice denticulo marginali utrinque, occipite transversa villorum linea barbato. *Thorax* albidus, villosus; in medio plicis duabus, binisque punctis atris in latere quolibet. *Elytrum* nigrum, striatum, planiusculum, abdomine brevius, basi & in medio punctis albis contiguis variegatum. *Abdomen* cinereum. Punctum album trigonum, sub quolibet elythro inter pedes posticos mediosque. *Pedes* nigri. *Tibiæ anticæ* 5-dentatæ. *Femora postica* fasciis duabus albis. Accedit hemiptero Linn. Sed idem non est.

Minimus. 87. S. Desc. Omnium minimus, coccinellæ saltatoriæ L. facie. *Antennæ* clava trifida. *Caput*, *thorax* punctatus & *corpus* nigri coloris. *Elytra* subpunctata, obsolete striata.

\* *Thorace* cornuto.

Dispar. S. ( le dispar ) scutellatus thoracis cornu subulato protenso, capitis subulato subrecurso, scutello cordato. M. 7.

Jablonsk. coleopt. 1. tab. 2. f. 3, 4.

Pall. icon. inf. 1. t. A. f. 8. A. B. scarabæus. Ammon.

Hab. in regionibus Russiæ Australioribus.

Camelus. S. ( le chameau ) exscutellatus thorace quadridentato, clypeo postice subbicorni, corpore atro. M. 128.

Hab. in Germania. D. Heisse.

*Desc.* Distinctus omnino a scar. *lemur*.  
*Clypeus* rotundatus, integer, lineis  
 duabus transversis, carinatis, elevatis,  
 posteriore majore bicorni. *Thorax* ele-  
 vatus, rotundatus, antice dentibus  
 quatuor, mediis approximatis. *Elytra*  
 vix striata. *Corpus* atrum. *Femina* tho-  
 race quadridentato ut clypeo tantum  
 linea duplici transversa carinata, pos-  
 teriore majore.

*Candidæ. S.* ( le Candida ) scutellatus rufus, thorace  
 excavato antrorsum cornuto, tibiis  
 anticis tridentatis.

*Hab.* in speciosum hoc animal in Calabria  
 ulteriore, in Lacinio promontorio,  
 vulgo *capo delle Colonne*, a Julio  
 Candida fuit inventum.

*Desc.* *Corpus* rufo-testaceum, supra læve,  
 nitens, subtus pilosum villo concolore.  
*Clypeus* rotundatus. *Thorax* fellæ instar  
 concavus, margine elevato, antice  
 cornutus. *Elytra* abdomine longiora,  
 apicibus nigricantibus, punctis obsoletis  
 striata. *Femora* breviora, incrassa. *Tibiæ*  
*anteriores* uniarticulatæ, tridentatæ :  
*posteriores* biarticulatæ, bispinosæ.

*Vinc. Petagnæ specim. inf. Ulter. Calabria.*  
 n. 9.

\*\* *Thorace inermi, capite cornuto.*

*Fœtens. S.* ( le puant ) scutellatus thorace inermi,  
 capite tuberculis tribus, medio acuto,  
 elytrorum limbo ferrugineo.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.* In Gallia  
 Aust. V.

*Desc.* *Caput* atrum, tuberculis tribus ele-  
 vatis, intermedio majori acuto. *Thorax*  
 lævis, ater, nitidus, macula marginali



ferruginea. *Elytra* striata nigra, limbo, imprimis baseos, ferrugineo. *Abdomen* atrum, ano rufo. *Pedes* atri.

Bimacula- S. ( le bimaculé ) scutellatus thorace inermi;  
tus. capite subtrituberculato, elytris striatis macula baseos rufa.

*Hab. in Germania. D. Hybner.*

*Desc.* Statura & magnitudo scar. *terrestris*. *Caput* atrum tuberculis minutissimis. *Thorax* lævis, glaber, ater, immaculatus. *Elytra* striata, atra, macula baseos oblonga rufa. *Corpus* atrum.

Inquina- S. ( le fouillé ) scutellatus capite tuberculato, elytris griseis fusco maculatis.

*Herbst. arch. 6. 16. scarabæus inquinatus.*

*Hab. in Saxoniae stercore. D. Hybner. In Gallia Aust. V.*

*Desc.* Parvus. *Caput* atrum, tuberculis tribus elevatis. *Thorax* ater, lævis, nitidus, margine subrufescente. *Elytra* striata, nitida, grisea, maculis variis fuscis.

Sphinx. S. ( le sphinx ) exscutellatus thorace inermi, punctis quatuor impressis, capite subcornuto, tarsis anticis nullis.

*Drury. inf. 1. t. 35. f. 8.*

*Aët. soc. berol. phys. 4. t. 7. f. 10.*

*Pall. icon. 1. 4. t. A. f. 4.*

— *iter. 1. 462. 25.*

*Hab. in America Meridionali, in Gallia Meridionali. D. Brouffenet.*

*Desc.* Statura & magnitudo scar. *bifonis*. *Totus* depressus niger, æneo-nitens. *Clypeus* rotundatus integer, in medio cornu recurvo, brevi, acuto, basi utrinque unidentato. *Thorax* glaber, lævis, basi rotundatus, in medio utrinque

puncto unico & postice duobus approximatis impressis. *Scutellum* minimum. *Elytra* striata. *Pedes* *antici* constant duobus tantum articulis, femore crasso, compresso, & *tibia* porrecta, arcuata dentata apice acuta. *Pedes* *secundi* paris, femoribus incrassatis, tibiis clavatis dentatis, *tarfis* brevissimis. *Fæmina*, capitis *clypeo* tuberculato.

Capra. S. ( la chevre ) exscutellatus thorace inermi, occipite spina erecta gemina, corpore nigro obscuro.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.* In Gallia Auf. V.

*Desc.* Statura & magnitudo scar. *vacca*. Capitis *clypeus* rotundatus, postice corniculis duobus elevatis. *Thorax* elevatus, rotundatus, niger, immaculatus. *Elytra* sublævia, nigra, immaculata.

Nutans. S. ( le trembleur ) exscutellatus thorace antice impresso, occipite spina erecta apice nutante, corpore nigro.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & magnitudo scar. *nuchicornis*. Capitis *clypeus* rotundatus, niger, occipite spina erecta basi latiori, apice nutante. *Thorax* gibbus, rotundatus, antice impressus. *Elytra* vix striata.

Furcatus. S. ( le fourchu ) exscutellatus thorace inermi rotundato, capite cornubus tribus erectis approximatis, medio breviori. *Laichart. inf.* 26. 20. t. 1. f. 90. scarabæus vitulus.

*Hab.* in Arabia. *P. Forsthæl. Mus. D. Banks.* In Gallia Meridionali.

*Obs.* *Fæmina* loco cornuum, linea transversa elevata.

*Desc.*

*Desc.* Minor scar. *nuchicorni*. *Clypeus* antice emarginatus, postice cornubus tribus basi approximatis erectis, intermedio breviori. *Thorax* muticus, lævis, glaber, postice rotundatus. *Elytra* striata, fusca. *Pedes* nigri.

\*\*\* *Mutici capite & thorace inermi.*

Ærugino-S. ( le bronzé ) scutellatus muticus auratus, fus.

*Gronov. mus.* 424. t. 15. f. 7.

*Vincent. Petagn. specim. n.* 14.

*Hab.* in regno Tunetano. In ulteriore Calabria. *Vinc. Petagn.*

*Desc.* *Statura* scar. aurali, sed thorax elytraque viridia. Scutellum ovatum, obtusum. Pectus non pilosum. *Syst.*

2-Puncta-S. ( le biponctué ) scutellatus muticus, thorace nigro rubro marginato, elytris rubris punctulis duobus nigris magnis.

*Lepech. itin.* 2. 324. t. 10. f. 7.

*Laxmann. nov. comment. petr.* 14. 593. t. 24. f. 1.

*Pall. inf.* 1. 22. t. A. f. 12.

*Hab.* sub fimo equino Russiæ.

*Desc.* Thoracis margo rufus, puncto nigro.

Sus, S. ( le cochon ) scutellatus muticus oblongus obscure rufus, elytris testaceis nigro maculatis.

*Herbst. arch.* 8. 22. scarabæus fus.

*Hab.* in Germaniæ stercore. In Gallia Aust. V.

*Desc.* *Statura* parva scar. 4-maculati. *Corpus* glabrum, nitidum, obscure rufum. *Elytra* testacea, atomis nigris.

*Insect. Tomus IV.*

O

Scrofa. S. ( la truie ) scutellatus muticus oblongus niger, elytris fuscis substriatis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura parva scar. *testudinarii.*  
*Caput & thorax* mutica nigra. *Elytra*  
magis fusca, obscura, substriata.

Arenarius. S. ( du fable ) scutellatus muticus ater, elytris striatis, tibiis piceis.

*Hab.* in Sueciæ arena mobili. *D. de Pay Kull.*

*Desc.* Parvus. *Totus* ater, tibiis solis piceis. *Elytra* striata.

Variolosus. S. ( le variolé ) exscutellatus muticus, clypeo sexdentato, thorace elytrisque nigris, punctis impressis variolosis.

*Hab.* in fiume austrorum. *D. Saldoner.*

*Desc.* Statura omnino præcedentium, at paullo minor. *Clypeus* porrectus, rotundatus, sexdentatus, lævis. *Thorax & elytra* punctis innumeris variolosis impressa. *Thorax* ciliatus. *Tibiae* anticæ valde dentatæ, reliquæ quatuor pilosæ.

Arenarius. S. ( des sablonnières ) thorace subcanaliculato, elytris striatis, corpore obscuro.

*Trox.* 2. *Mantiss.*

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura omnino scar. *Sabulosi*, at duplo minor. *Corpus* totum obscure fuscum. *Antennæ* testaceæ. *Elytra* striata.

Erythroce-S. ( la tête rouge ) glaber pallidus, capite rufo basi nigro. *Melol.* 34.

*Vincent. Petagn. specim. n. 18. t. f. XXXV.*

*Hab.* in Coromandel. *Mus. D. Banks.*

In ulteriore Calabria. *Vinc. Petagn.*

*Desc.* Affinis scar. *melanocephali*, at duplo

minor. *Corpus* totum glabrum, læve, immaculatum, capite solo obscure rufo, basi nigro.

*Obs.* In Calabria. *Totus* rufescens. *Antennæ*, ut in *scar. vulgari*, trilamellatæ, hinc vel idem cum Coromandeliano observatus, vel nova species. *D. Petagn.*

*Holofericeus*. S. ( le foyeux ) supra viridis holofericeus, subtus cupreus, elytris lineis elevatis quatuor. *Melolont.* 39.

*Hab.* in Russia Australiori. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino *scar. Frischii*. *Corpus* totum supra viride holofericeum, subtus cupreum.

*Fruticola*. S. ( le moissonneur ) capite thoraceque cæruleo pilosis, elytris lividis, clypeo apice reflexo. *Melolont.* 56.

*Schæff. icon. tab.* 65. f. 1.

*Voet. scarab. t.* 8. f. 67.

*Herbst. arch.* 9. *scarabæus* segetum.

*Hab.* in Europæ spicis fecalinis.

*Desc.* *Fæmina* macula quadrata coleopterorum nigra *scutellum* cingens.

*Herbst. arch.* 9. vix Differt. *Scarabæus campestris*.

*Succinctus*. S. ( le mandarin ) niger tomentoso cinereus, elytris nigris, fasciis duabus flavis. *Trich.* 2.

*Pall. icon. t. A.* f. 19.

*Hab.* in Germania. *D. Hybner.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* Statura omnino *scar. fasciati*, at duplo minor. *Clypeus* niger, integer. *Thorax* niger, cinereo-tomentosus. *Elytra* nigra, in medio fasciis duabus approximatis flavis. *Abdomen* tomentoso-cinereum.



*Lucanus.*

**Tenebroides.** L. ( le ténébroïde ) mandibulis lunatis unidentatis , ater , thorace marginato , elytris substriatis.

*Hab.* in Novogrod inferiori Russiæ. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino *L. caraboides* , at paullo major , totus ater , nitidus. *Caput* antice retusum , maxillis porrectis , lunatis , basi inferiori unidentatis. *Thorax* glaber , nitidus , immaculatus. *Elytra* substriata. *Abdomen* magis piceum.

**Capriolus?** L. ( le chevreuil ) scutellatus , maxillis exsertis , apice tantum furcatis.

*Amœd. acad.* 6. p. 391. n. 4.

*Mus. lud. ulr.* 30.

*Merian. Europ.* 168. quoad figuram.

*Tab.* 4. mandibulis exsertis apice tantum bifurcatis , labio ruga transversa elevata interrupta.

*Sulz. hist. inf.* t. 2. f. 1.

*Vincent. Petagn. specim. inf.* n. 1.

*De Geer tom.* 4. p. 336. t. 19. f. 11', 12'. fusco - castaneus , femoribus flavis , maxillis minimis corniformibus , apice simplicibus , latere unidentatis.

*Hab.* in America. In Europa. In Calabria ulteriori. *Vincent. Petagn.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* *Corpus* & tota structura *L. cervi* , sed minor , forte quod quercus in America septentrionali minores sint. Differt unice & tantum a *L. cervo* , quod 1°. Americanus hic sit triplo minor ; 2°. colore totius ferrugineo minusque nigro.

*Obs.* 1. Varietatem observo , forte solo

sexu diversam, corpori simillimam, sed capite distinctam; *caput* enim non gaudet angulis. *Maxillæ* longitudine capitis, incurvæ, apice simplici, margine interiore denticulo unico instructæ.

*Obs.* 2. Non mirum hoc Americanum insectum in nostro regno habitare, cum plurima adhuc sint, quæ in reliquis orbis partibus inveniuntur. *Ulterioris Calabriae specim.* p. 1.

*Obs.* 3. Hujus foemina simillima est foeminae *L. cervi*: masculo major est. *Ibid.*

### Cephalotes. L. ( le capitaine )

*Scop. introd. in hist. nat.* 439.

*Acharvis. act. Suec.* 1681. 246. t. 5. f. 3.-12.

*Pall. icon. inf.* 1. t. A. f. 1. lucanus apterus.

— *itin.* 1. app. 461. 22. scar. cephalotes.

*Laxman. nov. conim. Petrop.* 14. 59. 4. t. 24. f. 1.

*Hab.* in Russiæ, Tartariæ, Hungariæ desertis, aridis monogamus, sub terra degens.

*Desc.* *Corpus* subrotundum, apterum, laeve, nigrum, subopacum. *Caput* maximum, antice posticeque rotundatum, lateribus angulato-subauriculatis. *Clypeus* emarginato-bilobus. *Mandibula* exserta, adunco falcata, intus denticulata, subtus ramo prominente, incurvo. *Maxilla* cornea, labio duplo longior, in medio unidentata, apice truncata. *Palpi* quatuor cylindrici, *anteriores* quadriarticulati, inserti medio dorso maxillæ; *posteriores* triarticulati adhærentes labii apice. *Labium* rotundatum, integrum. *Antennæ* 12

articulatæ, articulis quinque 2, 3, 4, 5, 6 subcylindricis, 1, 7, 8, 9 subglobosis, ultimis tribus denique majoribus, obconicis, clavam formantibus, oblique truncatis, tunicatis. *Thorax* lævis, marginatus. *Elytra* connata, gibba, brevia, glabra, marginata. *Pedes* fossorii.

*Dermestes.*

Typogra- 6. D. *Obs.* Variat valde & colore & plus. magnitudine.

Calcogra- 7. D. Variat colore. Dantur nigri & testacei, vix tamen distincti.

Micogra- 8. D. *Fab.* host. 7. ferrugineus, elytris plus. integris testaceis.

20-Gutt- 27. D. *Desc.* Statura omnino & magnitudine tatus. D. *undati.* Corpus atrum, glabrum: punctum e pilis albis utrinque ad basin thoracis & novem in singulo elytro. *Abdomen* nigrum, certo situ albicans.

Testaceus. 29. D. *Desc.* Statura & magnitudo omnino D. *murini*, cujus forte varietas; differt tamen colore minus nigro & albo, abdomine omnino fusco.

Tomento- 30. D. *Desc.* Statura omnino D. *fumati*, fus. cujus forte varietas. *Totus* supra villis cinereis testus. Puncta duo fusca, elevata in fronte. *Pedes* dilutiores.

Testaceus. 31. D. *Desc.* *Totus* lævis, glaber, testaceus, folis oculis & abdominis basi subtus fuscis.

- Minutus- 34. D. Desc. Corpus minutum, totum atrum  
striatus. immaculatum. *Elytra* postice pallidiora.
- Varius. 35. D. Desc. Statura *D. piniperda*, sed paullo  
minor & corpus variegatum. *Post.* 8.  
& non 9.
- Minutus 36. D. Desc. Corpus minimum, atrum, gla-  
lævis. brum, immaculatum. *Antennæ* clava  
solida obtusa. *Elytra* lævia glabra,  
integra. *Pedes* nigri.
- Hæmor- 37. D. Desc. Ovatus, scarabæiformis, ater,  
rhous. nitens. *Elytrum* quodvis ad marginem  
internum prope apicem macula cocci-  
nea. Color iste elegans post insecti  
mortem vehementer obscuratur.
- Calthæ. 39. D. Desc. Niger nitidissimus. *Pedes*,  
*antennæ* maculaque postica elytrorum  
rufa.
- Tomento- 40. D. Desc. Niger est tenuis pilo hirsutus,  
fus. unde cano punctatus adparet per  
elytra. *Thorax* est sat latus, margi-  
natus. *Caput* depressum. *Elytra* punc-  
tato-striata, striis decem.
- Chrysomel- 41. D. Desc. *D. Psyllio* affinis, si non varietas.  
loides. *Caput* intra thoracem fere retractum.  
*Thorax* latus, fere quadratus, margi-  
natus. *Elytra* marginata. *Thorax* elytra-  
que lævia, nec punctata, nec striata.  
*Pedes*, cum antennis, fusco-testacei.  
*Antennarum* clava solida videtur,  
aut est.
- Quercus. 44. D. Desc. Fuscus. *Thorax* fere margi-  
natus. *Elytra* fusca, fasciis duabus  
undulatis pallidis, una ad basin, ut  
O iv

tamen ipsa basis fusca, altera ultra medium.

Tomento- 45. D. *Desc.* Parvus. *Corpus* elongato-ovatum, *supra* convexum. *Caput*, *thorax elytraque* villis griseis tecta. *Oculi* nigri. *Antennæ pedesque* rufo-testacei.

Fornica- 46. D. *Desc.* nigro-fuscus. *Thorax elytraque* lævia. *Pedes* tenues elongati, *posterior*es corpus æquant.

Armadel- 48. D. *Desc.* Pulice minor, nitidus ater. *Caput* magnum, convexiusculum, lateraliter angulatum. *Abdomen* retractile. *Elytra* dehiscentia. *Antennæ* pilosæ.

Pallidus. 49. D. *Desc.* D. *lardario* affinis, fusco-niger. *Elytra* fascia transversa pallide flavescenti nigro punctata.

Oblongus. 50. D. *Desc.* Castaneo-fuscus. *Corpus* tenue, longum. *Thorax* marginatus. *Elytra* longitudinaliter dense striata.

Contrac- 51. D. *Desc.* Ferrugineus. *Thorax* elongatus. *Elytra* punctato-striata.

Auricula- 52. D. *Desc.* *Caput* auriculatum. *Corpus* læve griseo-fuscum. *Thorax* subtus spinis quatuor armatus.

Variega- 53. D. *Desc.* *Caput* prominens. *Antennæ* fulvæ. *Thorax* rugosus. *Elytra* fulvescentia, lente striata.

Striatus. 54. D. Præcedenti affinis, at *thorax elytraque* valde fulcata, fulcis 7 in thorace, in elytro singulo quatuor.



Langicornis. 55. D. An filpha? An dermestes?

Variegatus. 67. D. *Desc.* Caput nigrum, deflexum, punctulis rubellis lateralibus. *Antennæ* clava nigra ovata, stipite, si luci oppositus fuerit, rubello. *Thorax* in medio niger, linea dorsali longitudinali punctis albis facta, inter hanc & latus punctum rubellum utrinque; margo posticus rubellus, sed anguli ibidem albidii. *Elytrum* nigrum, margine, præsertim interiore, rubro, fasciis 2 dimidiatis albis, basi punctis pluribus, apice unico, coloris albi. *Alæ* hyalinæ, puncto ad costam ferrugineo. *Corpus* supra nigrum, subtus pallide roseum nigroque varium. *Femora* eodem modo variegata. Variat defectu rubri coloris.

Cellaris. 68. D. *Desc.* Linea paullo longior est, dimidiam crassus, villosulus, rufo-ferrugineus. *Oculi* fusci. *Antennæ* articulis 10 lateraliter acuminatis & pilo ibidem terminatis. *Thorax* marginatus, anguli scutis parvoque dente in medio marginis lateralis. *Elytra* lucidiora, ad lentem subrugosa, minime striata. *Alæ* breves, debiles.

Brassicæ. 69. D. *Desc.* *Thorax* & *elytra* marginata, punctata, punctis exiguum villum proferentibus.

Ciliatus. 70. D. *Desc.* Linea paullo longior. *Caput* inclinatum. *Elytrum* striis 10.

Lepturoides. 71. D. *Desc.* Vix lineam longus, nigricans. *Thorax* & *elytra* marginata, subvillosa. *Antennæ* ferruginæ.

Lycoperdi. 72. *D. Desc.* Parvus, vix linea longior.  
*Caput* intra thoracem modice retractile.  
*Elytra* marginata, substriata.

Cærulef- 73. *D. Desc.* Lineam longus, subovatus,  
 cens. nitens. *Thorax* glaber.

Plicatus. 74. *D. Desc.* *Antennarum* articuli tres ultimi.  
*Pedesque* rufi.

Hamatus. *D.* ( l'hameçon ) *elytris* ante apicem  
 unispinosis, *thoracis* margine antico  
 bihamato denticulato. *Mantiff.* apate 2.  
*Hab. in* Saxonix lignis. *D. Prof.* Leske.  
 Prope Lugdunum. V.

*Desc.* Statura omnino *D. muricati*, at  
 paullo minor. *Caput* fuscum, ore fer-  
 rugineo pubescente. *Thorax* rotundatus,  
 subtus antice scaber, margine antico  
 utrinque hamo valido denticulato ca-  
 pitis basin tegente. *Elytra* fusca,  
 punctata, ante apicem dente valido,  
 porrecto, obtuso. *Abdomen* & *pedes*  
 picea.

Limbatus. *D.* ( le bordé ) ater, *elytris* integris pal-  
 lidis, margine omni nigro. *Mantiff.*  
 apate 7.

*Hab.* sub cortice fagi Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Parvus. *Caput* atrum, nitidum,  
 immaculatum. *Thorax* gibbus, ater,  
 ferrugineo - hirtus. *Elytra* lævia,  
 substriata, pallida, margine omni  
 nigro.

Marginatus. *D.* ( le marginé ) thorace villoso, *elytris*  
 integris fuscis, margine punctisque  
 ferrugineis. *Mantiff.* apate 8.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Parvus. *Maxillæ* exsertæ, forcipatæ. *Thorax* elevatus, postice rotundatus, integer, villosus, fuscus. *Elytra* integra, obscura, substriata, fusca, margine punctisque aliquot ferrugineis, raro in strigam undatam mediæ connatis. *Abdomen* fuscum, margine ferrugineo. *Pedes* fusci.

Trifasciatus. D. ( le trifascié ) ovatus niger, elytris fasciis tribus undatis cinereis. *Mantiss.* dermest. 7.

*Geoff. inf. tom. I. p. 112. n. 5. byrrhus* fuscus, fasciis elytrorum transversis cinereis.

*Hab.* in Europa Australiori. D. de Schestedt.

*Desc.* Magnitudo & statura D. undati. *Caput* nigrum. *Thorax* niger, margine baseos cinereo. *Elytra* nigra, fasciis tribus undatis punctoque apicis cinereis. *Corpus* nigrum.

*Obs.* An dermestes? An ptinus Linn.? V.

Sanguinicol-D. ( le paré ) elongatus hirtus violaceus, thorace abdomineque rufis. *Mantiss.* dermest. 18.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner. In Gallia Aust. V.

*Desc.* *Antennæ* perfoliatæ hujus generis. *Thorax* hirtus, rufus, immaculatus. *Elytra* cyanea, nitida. *Abdomen* rufum. *Pedes* nigri.

Fuscus. D. ( le brun ) oblongus villosus fuscus, immaculatus. *Mantiss.* dermest. 21.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner, Kilix Daldorf.

*Desc.* Statura & magnitudo omnino D. tomentosi, villosus, fuscus, immaculatus.

**Picipes.** D. ( le picipede ) oblongus nigricans ,  
pedibus piceis. *Mantiss.* dermest. 23.  
*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner.

*Desc.* Statura & magnitudo D. *tomentosi*.  
*Corpus* totum nigrum , immaculatum.  
*Pedes* omnes picei.

**Elongatus.** D. ( l'alongé ) elongatus ater , pedibus  
ferrugineis. *Mantiss.* boft. 3.

*Hab.* in Upsaliæ ligno antiquo. D. de  
Pay. Kull.

*Desc.* *Corpus* medium , elongatum , fili-  
forme. *Antennæ* breves , perfoliatae.  
*Thorax* glaber , ater , nitidus , lineis  
tribus impressis intermedia altiori. *Elytra*  
crenato - striata. *Pedes* ferruginei.

**Bidentatus.** D. ( l'armé ) niger , coleoptris testaceis  
apice retusis bihamatis. *Mantiss.* boft. 8.  
*Herbst.* arch. 24. 6. t. 10. f. 10. dermestes  
bidentatus.

*Hab.* in Saxonia. D. Hybner. In Gallia  
Aust. Mus. D. Blain.

*Desc.* Magnitudo D. *polygraphi*. *Caput*  
& *thorax* nigra , immaculata. *Elytra*  
obscurè testacea , postice retusa , den-  
ticulo elongato hamato nigro ad futu-  
ram. *Pedes* testacei.

**Crenatus.** D. ( l'entaillé ) glaber , ater , elytris inte-  
gris piceis crenato - striatis. *Mantiss.*  
boft. 10.

*Hab.* in Germania D. Schneider. In Gallia  
Aust. V.

*Desc.* Statura & magnitudo omnino D.  
*scholyti* , at distinctus. *Caput* & *thorax*  
lævia , atra , immaculata. *Elytra* in-  
tegra , picea , crenato - striata. *Pedes*  
picei.

Pygmæus. D. ( le pygmée ) ater nitidus , elytris integris rufis , abdomine retuso. *Mantiff.* boft. 11.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. *Hybner.*

*Desc.* Statura & summa affinitas D. *scolyti* , at triplo minor , & *elytra* rufa.

Ligniperda. D. ( le Charpentier ) villosus testaceus , corpore nigricante , tibiis quatuor posticis ferratis. *Mantiff.* boft. 12.

*Hab.* in Germaniæ ligno. D. *Hybner.* In Gallia Aust. V.

*Desc.* Paullo major D. *piniperda*. Caput nigricans , antennis testaceis , articulo primo longiori , crassiori , incurvo , ultimo clavato. Thorax , elytra , abdomen villosa , testacea , immaculata. *Elytra* striata. *Pedes* breves , validi , testacei , tibiis quatuor posticis ferratis.

Testaceus. D. ( le testacée ) glaber testaceus , elytris lævibus longitudine abdominis. *Mantiff.* boft. 14.

*Hab.* in pini truncis. D. *Zschuck.*

*Desc.* Antennæ clava solida. Corpus testaceum , immaculatum , glabrum læve.

*Obs.* Variat rarius corpore nigricante.

Vittatus. D. ( l'orné ) subvillosus fuscus , elytris vitta abbreviata cinerea. *Mantiff.* boft. 16.

*Hab.* in truncis arborum. D. *Daldorf.*

*Desc.* Statura omnino D. *varii* , at duplo minor. Caput nigrum. Thorax fuscus , immaculatus. *Elytra* fusca , vitta a basi usque ad medium futuræ ducta cinerea.

Pallipes. D. ( le pallipede ) oblongus planus , ater , nitidus , antennis pedibusque testaceis. *Mantiff.* app.



*Hab. in Sueciæ floribus. D. de Pay Kull.*  
*Desc. Minutus, totus ater, nitidus. Thorax*  
*lævis. Elytra striata. Antennæ & pedes*  
*testacei.*

Lunatus. D. 12. ( le Turc ) oblongus niger, elytris  
 lunula dorsali cinerea. *Mantiss. app.*

*Hab. in Suecia sub arborum corticibus.*  
*D. Pay Kull.*

*Desc. Totus niger, obscurus. Coleoptra*  
*lunulis duabus connatis communibus*  
*in medio dorfi cinereis.*

*Ptinus.*

Longicornis. 7. P. *Desc. Magnitudo pt. furis. Antennæ*  
*filiformes corpore longiores. Corpus*  
*atrum, nitidum, immaculatum. Pedes*  
*flavi, plantis nigris.*

Latro. 8. P. *Desc. Statura & magnitudo omnino*  
*pt. furis, cujus forte varietas. Antennæ*  
*filiformes longitudine corporis. Thorax*  
*angustus, rotundatus, dentibus duobus*  
*dorsalisalibus. Elytra punctato-striata,*  
*testacea, immaculata.*

Scotias. 9. P. *Desc. Antennæ porrectæ, albo villosæ.*  
*Caput parvum reconditum, cum tho-*  
*race glabrum, læve, piceum. Elytra*  
*connata, lævia nitida, obscure testa-*  
*cea, immaculata. Pedes villosi-albi.*  
*Jaqu. miscell. aust. t. 23. f. 1.*

Semilunum. 10. P. *Desc. Fere sphæricus. Totus nitenti-*  
*testaceus. Elytra, quæ fere totum*  
*abdomen tegunt, valde convexa,*  
*diaphana, ita ut corpus animalis trans-*  
*pareat, cui non incumbunt, sed am-*  
*plum super illud fornacem constituunt.*

*Oculi* minime nigri. *Caput*, *thorax*, *elytra* testacea, s. testudineo - rufi coloris. *Antennæ*, pedes & exigua abdominis pars, quam *elytra* non tegunt, ex subtilissimo & denso tomento sulphureo. *Antennæ* filiformes, articulis omnibus æqualibus.

Rufo- villosus. II. P. *Desc.* Statura pt. *pertinacis*, at paullo major. *Totus* rubello-fuscus. *Oculi* nigri. *Elytra* scabra & uti totum animal, griseo vellere tectum.

Punctatus. 12. P. *Desc.* Pt. *pertinaci* simillimus, at multo minor, griseo-fuscus. *Thorax* in medio gibbosus. *Elytra* longitudinaliter punctato-fulcata.

Testaceo- villosus. 13. P. *Desc.* Omnibus congeneribus major. *Antennæ* filiformes lutescenti-rufæ. *Caput*, *thorax* nigra, villis fulvo-luteis tecta. *Elytra*, quæ lævia, antennis concoloria, at tomento rufescente lutea. *Thorax* convexus, postice angulatus, margine laterali prominulo.

Striatus. P. ( le strié ) thorace gibbo bituberculato, coleoptris globosis striatis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner.

*Desc.* Statura omnino pt. *scotias*. *Antennæ* porrectæ filiformes. *Thorax* elevatus, gibbus, griseis tuberculis duobus elevatis obtusis. *Elytra* connata, striata, grisea. *Pedes* grisei.

Rugosus. P. ( le ridé ) fuscus, thorace inæquali, elytris striatis. *Anobium* striatum.

*Mantiff.* I.

*Hab.* Kilix.

*Desc.* Duplo major pt. *pertinaci*. *Corpus* totum fuscum, immaculatum. *Thorax* inæqualis, vel potius rugis duabus dorsalibus abbreviatis impressus. *Elytra* striata.

Planus. P. ( le plan ) fuscus thorace plano, elytris crenato-striatis. *Anob.* 4. *Mantiss.*

*Hab.* Kiliæ. *D.* *Daldorf.*

*Desc.* *Antennæ* fuscae, clava elongata, ferruginea. *Caput* & *thorax* fusca, immaculata, thoracis margine parum reflexo. *Elytra* crenato-striata subpicea. *Corpus* fuscum.

### Hister.

Brunneus. 6. *Desc.* Simillimus H. *unicolori*, at color totus brunneus.

Æneus. 7. *Desc.* Æneus nitens. *Elytra* abbreviata, in medio lævia, apice irregulariter punctata, basi striis quatuor arcuatis.

Scaber. H. ( le chagriné ) niger, punctis elevatis scaber.

*Hab.* in Hispania. *D.* *Vahl.*

*Desc.* Magnitudo H. *unicolor*. *Corpus* nigrum. *Thorax*, *elytra* & *abdomen* prominulum.

Depressus. H. ( l'aplati ) depressus ater, nitidissimis elytris substriatis.

*Herbst. arch.* 20. 7. hister compressus.

*Hab.* sub betulæ corticibus. *Mus.* *D.* *Zschuck.*

*Desc.* Differt manifeste a H. *pigmeo*, magis depressus & nitidissimus. *Elytra* substriata.

Gyrinus.

*Gyrinus.*

Bicolor. G. ( le bicolor ) niger, subtus ferrugineus, pedibus posticis compressis.

*Hab.* in Sueciæ aquis. *Prof.* Leske.

*Desc.* Major G. natatore. Totus supra niger, subtus ferrugineus. Pedes postici valde compressi.

*Byrrhus.*

Varius. 7. B. *Desc.* Statura & summa affinitas B. pilulæ. Corpus subtus nigrum. Caput æneum, antennis extrorsum crassioribus nigris. Thorax ovatus obscure æneus, immaculatus. Elytra fusca, striis tribus nitentibus, dorsalibus, viridibus, fusco maculatis, quæ tamen apicem elytrorum non attingunt. Pedes nigri, tibiis compressis.

Ater. 8. B. *Desc.* B. pilulæ affinis, minor. Totus ater & lævis. Elytra obsolete striata.

Nitens. 9. B. *Desc.* Parvus. Thorax elytraque lævia, sed ad lentem irregulariter punctata.

Gigas. B. ( le géant ) niger, elytris punctatis ferrugineis.

*Hab.* in Austria. *Mus.* D. Zschuck.

*Desc.* Major B. pilula. Corpus nigrum, elytris solis punctatis, ferrugineis immaculatis. Pedes nigri, tibiis compressis, incurvis. Fæmina aculeo ani.

Dorsali. B. ( le dorsal ) nigricans, coleoptris macula transversa ferruginea.

*Hab.* Kiliæ. *D.* Daldorf.

*Desc.* Statura & summa affinitas B. atri,

*Insect.* Tomus IV.

P

at paullo minor. *Corpus* nigrum obscurum. *Thorax* maculis aliquot obsoletis. *Elytra* nullo modo striata, nigricantia, macula communi transversa ferruginea. Forte mera *B. atrī* varietas.

*Silpha*.

Bipustulata 3. *S. Laichart.* 1. 106. 3. ostoma bipustulata.

Littoralis. 8. *S. Fab.* S. 8.

*Bergst. nomencl.* 1. 24. 6. t. 3. f. 6.

Atrata. 9. *S. Laichart.* 1. 98. 10. *silpha tyrolensis*.

Ferruginea. 16. *S. Laichart.* 1. 102. 1. ostoma rubicunda.

Reticulata. 17. *S. Fab.* 11. *Mantiss.* 17. An *reticulata*. Syft.?

Grossa. 18. *S. Fab.* S. *lunata*, atra, elytris punctatis, lineis elevatis tribus, thorace emarginato. *Mantiss.* 14.

Scabra. 20. *S. Fab.* S. *dentata* oblonga nigra, elytris scabris, thorace subemarginato.

*Desc.* Statura & magnitudo *S. oblongæ*. *Corpus* nigrum. *Thorax* fuscus, valde marginatus, marginibus depressis, rotundatis, subciliatis. Margo anticus emarginatus, in medio bidentatus. *Elytra* nigra, lineis duabus valde elevatis, possice bidentatis. *Corpus* & *pedes* nigra.

Colon. 24. *S. Laichart.* 1. 107. 4. ostoma colon.

Grisea. 33. *S. Desc.* *Corpus* supra cinereum, im-



maculatum, subtus fuscum. *Thorax* planus, margine parum elevato. *Elytra* striis tribus elevatis, abbreviatis, postice dentatis.

Gibba. 34. *S. Desc.* Magnitudo omnino *S. sabulosa*, at magis oblonga & postice magis gibba. *Elytra* obsoleta, lineis elevatis striata.

Tibialis. 35. *S. Desc.* *Corpus* parvum. *Capitis clypeus* emarginatus. *Caput* & *thorax* lævia, nigra, immaculata. *Elytra* lineis elevatis obsoletis rugosa. *Tibiæ* antice basi bidentatæ, apice triangulares, compressæ.

Marginata. 37. *S. Desc.* Statura *S. 2-pustulata*. *Corpus* subtus piceum. *Thorax* niger, margine late ferrugineo. *Elytra* marginata, nigra, margine punctisque aliquot disci ferrugineis.

Varia. 38. *S. Desc.* Statura *D. ferruginei*. *Corpus* fuscum. *Thorax* marginatus, variegatus margine ferrugineo. *Elytra* striata, marginata, variegata, margine ferrugineo. *Pedes* ferruginei.

Bicolor. 39. *S. Desc.* *Antennæ* rufæ, clava solida. *Caput* & *thorax* ferruginea, immaculata. *Elytra* glabra, nigra, fascia lata baseos punctoque versus apicem ferrugineis. *Abdomen* fuscum. *Pedes* ferruginei.

Hæmorrhoidalis. 40. *S. Desc.* Statura *S. colon*, at duplo minor. *Thorax* marginatus niger, margine ferrugineo. *Elytra* lævia, nigra, apice late ferruginea. *Pedes* nigri.

Dioscoidea. 41. *S. Desc.* Statura & magnitudo *S. bipustulata*. *Caput* atrum. *Thorax* inæqualis, marginatus, margine obscure ferrugineo. *Scutellum* nigrum. *Elytra* nigra, macula magna orbiculata, communi, ferruginea. *Pedes* nigri.

Ænea. 42. *S. Desc.* Statura *S. bipustulata*, at duplo minor. *Corpus* totum viride-æneum, læve, glabrum.

Pubescens. 43. *S. Desc.* *Antennæ* clava solida. *Corpus* parvum, supra griseum, nitidum, pilis erectis brevibus adpersum.  
*Obs.* An silpha? An dermestes?

Nubila. 46. *S. Desc.* Statura omnino *S. aquatica*, at paullo minor. *Antennæ* clavatae. *Thorax* griseus, fasciis quinque exaratus. *Elytra* sulcata, obscure grisea. *Pedes* concolores.

Picea. 48. *S. Desc.* Major *S. 4-pustulata*. *Caput* nigricans, ore *antennisque* piceis. *Elytra* lævia, nigra, basi fasciaeque postica lunata ferrugineis. *Corpus* & *pedes* picei. *Ips.* Fab.

4-Guttata. 49. *S. Desc.* Præcedenti multo minor. *Caput* & *thorax* atra, nitida, immaculata. *Elytra* lævia, atra, maculis duabus transversis margines haud attingentibus albis, anteriore bisinuata. *Pedes* nigri. *Ips.* Fab.

Crenata. 50. *S. Desc.* Statura omnino *S. quadrupustulata*, at quadruplo minor. *Thorax* longitudinaliter rugosus, obscure niger. *Elytra* striis crenatis nigra, basi apiceque macula magna ferruginea. *Ips.* Fab.

- Rufifrons. 51. *S. Desc.* Magnitudo præcedentis. *Antennæ* nigrae, clava ferruginea. *Caput* nigrum, *fronte* ferruginea. *Thorax* glaber, ater, lævis, nitidus, immaculatus. *Elytra* lævia, nitida, punctis duobus ferrugineis, altero ad basin, altero ad apicem.
- Excavata. 52. *S. Desc.* Nimis affinis *S. atrata*, a qua tamen differt elytris lævibus nec striis tribus elevatis.
- Testacea. 53. *S. Desc.* Statura & magnitudo *S. atrata*. *Corpus* totum obscure testaceum, elytris tamen paullo pallidioribus. *Elytra* lævissima, punctata, lineis tribus elevatis, obsoletis. Ultimi tres articuli *antennarum* nigri.
- Villofa. 54. *S. Desc.* fusca. *Thorax* latus, minime marginatus. *Elytra* lævia tomentosa.  
*Obs.* An silpha?
- Tomentosa. 58. *S. Desc.* *Antennæ* capite thoraceque breviores. *Caput*, *thorax* & *elytra* tomentosa. *Elytra* striis tribus elevatis, quarum exterior major prominet.
- Rufipes. 59. *S. Desc.* Minuta, vix pulice major. *Antennarum* clava perfoliata. *Caput* supra nigrum. *Elytra* lævia, vix marginata.
- Obscura. *S.* ( l'obscure ) ovata nigra obscura, pedibus piceis.  
*Hab.* in Germania. *D. Haltorf.*  
*Desc.* Statura omnino *S. 2-pustulata*, at paullo minor. *Corpus* supra obscure nigrum, minime nitidum. *Elytra* lævia, immaculata. *Pedes* picei.

*Marginata*. S. ( la bordée ) lævis atra , elytrorum margine pedibusque ferrugineis. *Mant. sphær.* 5.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino S. glabrata ; at antennæ nigrae & margo elytrorum tenuissime ferrugineus.

*Ferruginea*. S. ( la rouillée ) ferruginea elytris striatis. *Mantiff. sphær.* 6.

*Hab.* Kilicæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Statura omnino præcedentis. *Corpus* totum ferrugineum , immaculatum.

*Ruficollis*. S. ( l'esclave ) atrum nitidum , thorace pedibusque anticis rufis. *Mantiff. sphær.* 10.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura parva , gibba S. hæmorrhoidalis. *Caput* , *elytra* , *corpus* atra , glabra , nitida. *Thorax* glaber , rufus , nitidus. *Pedes* antici rufi , postici nigri.

*2-Punctata*. S. ( la bipoûtuée ) atra elytris rufis , macula magna atra. *Mantiff. Ips.* 2.

*Hab.* in Europa Australiori. *D. Saldoner.*

*Desc.* Magna. *Corpus* totum atrum. *Elytra* sola rubra , macula magna nigra. *Anus* rufus.

*2-Pustulata*. S. ( la bipustulée ) atra elytris macula baseo rufa. *Mantiff. Ips.* 3.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Antennæ perfoliatæ rufæ. *Corpus* nigrum , elytris macula magna baseos rufa. *Pedes* rufi.

*Dorsalis*. S. ( la dorsale ) oblonga supra pallida , coleoptris macula media nigra. *Mantiff. Ips.* 4.

*Hab. in Europa Australi. D. Vahl. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Paulo major S. 4-pustulata. Antennæ perfoliatæ. Caput & thorax pallide testacea, immaculata. Elytra striata, pallida, macula magna, communi, lunata, nigra.*

**Humeralis. S.** ( l'épaulette ) nigra, capite, thorace elytrorumque puncto baseos pedibusque rufis. *Mantiss. Ips. 7.*

*Thunb. nov. sp. dermestes 2-pustulatus.*

*Hab. in Suecia. D. de Pay Kull.*

*Desc. Nimis affinis S. rufipes. Caput cum antennis obscure rufum. Thorax lævis, rufus, nitidus. Elytra nigra, nitida, puncto baseos rufo. Corpus nigrum, pedibus rufis.*

**4-Maculata. S.** ( la quadrimaculée ) rufa, thorace elytrisque nigris, his maculis duabus rufis. *Mantiss. Ips. 8.*

*AÆ. Hall. i. 236. silpha 4-maculata.*

*Hab. in Germania. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Media. Antennæ ferrugineæ ante apicem fuscæ. Caput rufum. Thorax niger, immaculatus. Elytra striata nigra, macula baseos aliaquæ ante apicem rufis. Corpus rufum.*

**Atomaria. S.** ( l'atome ) oblonga nigra, elytris punctis fasciæque postica fulvis. *Mantiss. Ips. 9.*

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hyöner.*

*Desc. Corpus parvum, oblongum. Caput & thorax nigra. Elytra striata, nigra, macula majori ad basin, punctis quinque in medio, fasciæ postica undata punctoque apicis fulvis. Pedes nigri.*



Sanguini- S. ( le collier ) atra, thorace elytrorumque  
collis. maculis duabus pedibusque rufis. *Mant.*

*Ipf.* 10.

*Añ. Hall.* 1. 255. silpha glabra.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Media. Caput atrum, antennis apice  
cinerascentibus. Thorax glaber, rufus,  
nitidus, immaculatus. Elytra glabra,  
lævia, nigra, maculis duabus rufis.  
Corpus nigrum. Pedes rufi.

Nigricornis. S. ( la nigricorne ) flava, antennis nigris.

*Mantiiff. Ipf.* 12.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* S. ænea paullo major. Antennæ  
moniliformes, extrorsum crassiores,  
nigræ. Corpus totum flavescens, im-  
maculatum.

Ænea. S. ( la bronzée ) coccinea, elytris æneis  
immaculatis. *Mantiiff. Ipf.* 13.

*Añ. Hall.* 1. 254. silpha ænea.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Corpus medium totum coccineum,  
immaculatum. Antennæ nigræ. Elytra  
ænea, nitida lævia, immaculata.

Bifasciata. S. ( la bifasciée ) nigra, elytris fasciis  
duabus punctoque apicis ferrugineis.

*Mantiiff. Ipf.* 17.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Minuta. Corpus totum nigrum.  
Elytra concoloria, fasciis duabus punc-  
toque apicis rufis. Pedes nigri.

Nigra. S. ( la noire ) oblonga nigra immaculata.

*Mantiiff. Ipf.* 18.

*Hab.* in Uplandiæ boletis. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Parva, tota nigra, immaculata.

Livida. S. ( la livide ) fusca , thorace elytris pedibusque lividis. *Mantiff. S. 3.*

*Herbst. arch. silpha livida.*

*Hab. in Germania. D. Hybner. In Gallia Auf. V.*

*Desc. Statura omnino S. littoralis , at duplo minor.*

Reticulata. S. ( la reticulée ) nigra , thorace lævi , elytris rugosis , lineis elevatis tribus.

*Mantiff. S. 17.*

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc. Statura & summa affinitas S. obscuræ , at elytra inter strias elevatas rugosa.*

Undata. S. ( l'ondée ) nigra nitida , elytris fasciis duabus undatis punctoque apicis albis.

*Mantiff. S. 26.*

*Hab. in Saxonia , sub arborum corticibus. D. Romanus.*

*Desc. Statura & magnitudo fere dermestes undati , at antennæ omnino hujus generis. Caput & thorax atra immaculata. Elytra lævia , nigra , fascia ante medium alteraque pone medium punctoque parvo apicis albidis. Corpus & pedes fusca.*

Agricola. S. ( la campagnarde ) nigra , thorace lævi , elytris striatis. *Mantiff. opatr. 8.*

*Herbst. arch. 30. opatrum agricola.*

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc. Corpus parvum , totum obscure nigrum , elytris striatis.*

Strigata. S. ( la striée ) ovata fusca , thoracis margine , elytri margine lineola baseos strigaeque apicis fulvis. *Mant. nitidula 7.*

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc.* Media. *Caput* fuscum. *Antennæ* clavatæ, clava apice ferruginea. *Thorax* lævis, fuscus, margine pallide fulvo. *Elytra* lævia, nitida, margine lineola baseos lunata strigaeque apicis incurve fulvis. *Corpus* nigrum. *Pedes* fulvi.

**Limbata. S.** ( l'entourée ) nigra, thoracis margine elytrorumque limbo ferrugineis. *Mant. nitidula* 11.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Parva. *Caput* & *thorax* nigra, thoracis margine ferrugineo. *Elytra* lævia, nigra, limbo omni, imprimis ad basin, ferrugineo. *Pedes* ferruginei.

**Litura. S.** ( l'arquée ) testacea, elytris litura arcuata nigra. *Mantiff. nitidula* 15.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Parva. *Caput* & *thorax* testacea, immaculata, nitida. *Elytra* lævia, nitida, testacea, litura una alterave arcuata nigra. *Abdomen* nigrum. *Pedes* testacei.

**2-Punctata. S.** ( la biponctuéée ) testacea, coleoptris maculis quinque nigris. *Mantiff. nitidula* 16.

*Herbst. arch.* 58. 32. *tab.* 23. *f.* 20. chrysomela scutellata.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* *Antennæ* clava solida, nigra, hujus generis. *Caput* & *thorax* rufo-testacea, nitida immaculata. *Elytra* lævia, nitida, rufo-testacea, puncto communi baseos duobusque in medio oblique positis, nigris. *Corpus* testaceum, abdomine basi nigro.

**Viridifcens. S.** ( la verdâtre ) viridi-ænea, thorace

marginato, pedibus folis rufis. *Mantiff. nitidula* 18.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Statura omnino *S. ænea*. *Tota* ænea, pedibus folis rufis.

Hæmorrhoi-S. ( l'hémorroïdale ) rufa, elytris nigris, dalis.

apice rufis. *Ipf. Mantiff. app.*

*Hab.* in Suecia. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Statura & summa affinas *S. rufipes*, at corpus totum rufum, exceptis elytris folis nigris apice rufis.

Lutea. S. ( la jaune ) lutea, elytris pubescentibus lævibus. *Sphær. Mantiff. app.*

*Desc.* Corpus totum fuscum, elytris pubescentibus, haud striatis.

*Obs.* An filpha? An dermestes? Non vidi. V.

### *Cassida.*

Tigrina. 7. *C. Desc.* Caput, corpus infra, femora, antennarum apex, nigra. Thorax diaphano-viridis, maculis duabus albis elevatis. Pedes virescentes.

*Hab.* in chenopodio hybrido.

Affinis. 8. *C. Desc.* Nimis. *C. maculatæ* affinis. Corpus atrum. Thoracis clypeus omnino flavescens, immaculatus. Elytra grisea, punctis numerosis nigris. Margo flavescens, antice immaculatus, postice punctis quatuor nigris.

Equestris. *C.* ( la chevaliere ) viridis, elytrorum basi argentea, abdomine atro margine pallido. *Mantiff.* 2.

*Hab.* in mentha aquatica Halæ. *D. Hybner.*

*Desc.* Major *C. viridi* & distincta. Supra

læte viridis, elytris striga baseos læte argenta, quæ vero cum vita perit. *Corpus* atrum, *abdominis* margine pallido. *Pedes* flavescens.

Atrata. C. ( la noircie ) atra, clypeo antice sanguineo. *Mantiff.* 7.

*Hab.* in Austria. *D. Saldoner.*

*Desc.* Statura *C. nebulosæ*, at minor & atra. *Clypeus* rotundatus, integer, lævis, niger, margine antico in medio sanguineo. *Elytra* rugosa, atra immaculata.

Limбата. C. ( la bordée ) capite thoraceque pubescentibus, obscure æneis, margine pubescente. *Mantiff.* 8.

*Hab.* in diantho Carthusianorum Halæ. *D. Hybner.*

*Desc.* *Thorax* æneus, margine obscure rufescente. *Elytra* punctata obscure viridia, margine obscure rufo. *Corpus* rufescens.

Margarita- C. ( la perlée ) virens, elytris viridi-argenteis nitidis, capite pectoreque nigris. *Mantiff.* 22.

*Schall. act hali.* 259. *cassida margaritacea.*

*Hab.* Halæ, sub lapidibus. *D. Hybner.*  
In Gallia Aust. V.

*Desc.* Statura & summa affinitas *C. nebulosæ*. Color perit cum vita.

### *Coccinella.*

2-Punctata. C. *Obs.* Cum 6-pustulata copula junctam vidit *Cavolinus.* *Vincent. Petagn.* pag. 8.

Unifasciata. 30. C. *Desc.* Media. *Caput* & *thorax* atra, immaculata, *Elytra* rubra, fascia media



testa, atra, quæ futuram tamen haud attingit & ad marginem punctis duobus parvis terminatur. Lineola parva obliqua nigra ad *scutellum*. *Corpus* atrum.

6-Lineata. 31. *C. Desc.* Magna. *Corpus* nigrum. *Caput* punctis duobus baseos albis. *Thorax* ater, punctis duobus baseos albis. Margo exterior albus, macula nigra. *Elytra* flava, lineis tribus atris, quæ tamen nec basin nec apicem attingunt, exterioribus duabus ante apicem coeuntibus. Punctum præterea oblongum versus apicem & commune, bifidum.

Flexuosa. 32. *C. Desc.* *Corpus* atrum, immaculatum. *Thorax* ater, macula laterali apicis albida. *Elytra* lutea, puncto baseos orbiculato, fascia in medio flexuosa & macula apicis transversa, clavata, nigris.

7-Macula- 33. *C. Desc.* Magnitudo & statura oblonga  
ta. *C. 13-punctatæ.* *Caput* atrum. *Thorax* lævis, ater, margine antico & laterali albo. *Elytra* rubra, punctis nigris tribus, primo baseos rotundato, secundo in medio transverso, tertio versus apicem rotundato. Punctum denique commune trilobum. *Corpus* nigrum.

8-Punctata. 34. *C. Desc.* Magnitudo. *C. 2-punctatæ.* *Caput* albicans, punctis quinque nigris ad basin & unico utrinque ad marginem.

13.-Macu- 35. *C. Desc.* Distincta sane a *C. 13-punctata* ;  
lata. tota fere orbiculata. *Thorax* albus, maculis quatuor nigris.

16-Punctata. 36. *C. Desc.* Major, oblonga. *Caput* albi-

dum, punctis quatuor nigris. *Thorax* albidus, punctis plurimis approximatis.

20-Punctata. 37. *C. Desc.* Parva. Statura *C. hieroglyphicæ*. *Caput* nigrum. *Thorax* flavus, punctis quinque baseos nigris.

Subpunctata. 38. *C. Desc.* *Thorax* flavus, punctis quinque nigris, tribus posterioribus, omnibus rotundis. *Caput* flavum. *Oculi* nigri. *Elytra* rubra aut fulva; ad marginem externum, in singuli elytri medio, punctum nigrum minutum.

Obverse- 39. *C. Desc.* *Thorax* niger, basi margi-  
punctata. neque utroque, nec non linea longitudinali in medio & utrinque puncto, flavis. *Caput* nigrum, *fronte*, *antennis*que flavis. *Elytra* rubra ad angulum scutelli flavicant habentque punctum commune nigrum; aliud punctum nigrum prope basin singuli elytri & duo sub medium.

11-Punctata. 40. *C. Desc.* Magnitudo. *Thorax*, *caput* habitusque *C. 9-punctata*. *Elytra* rubra ad angulum scutelli flavicant, post quem majusculo puncto communi nigro notantur; præterea citra medium singuli elytri puncta minuta duo nigra, ultra medium duo majora, ac tandem unum solitarium, quod jam majusculum, jam minutum est.

*Obs.* Qui speciem præsentem cum *C. 9-punctata*, *6-punctata* ac *obverse-punctata* eandem existimat, vix erraverit.

15-Guttata. 51. *C. Desc.* *Corpus* majusculum, rotundatum. *Thorax* luteus, margine laterali

albo, puncto medio luteo. Macula obsoleta albida ad basin thoracis. *Elytra* lutea, punctis septem rotundatis albis. Punctum commune fere obsoletum fere in medio dorso.

12-Guttata. 52. *C. Desc.* *Tota* lutea. *Oculi* atrii. *Thorax* luteus, margine utroque albo, ita diaphanus, ut oculi nigri, si caput intra thoracem retrahatur, transluceant. *Elytra* lutea; in singulo maculæ sex lacteæ.

Hæmorrhoidalis. 60. *C. Desc.* *Corpus* rotundatum. *Caput* obscure rufum. *Thorax* rufus interdum basi, interdum punctis tribus baseos nigris. *Elytra* atra apice rufa, fascia nigra quæ tamen futuram haud attingit.

Variabilis. 61. *C. Desc.* Differt manifeste a *C. bipustulata*. *Corpus* oblongum, immarginatum. *Caput* album. *Thorax* ater, margine albo. *Elytra* lævia atra, puncto rubro. Variat junior elytris luteis puncto flavescente, at ætate *elytra* nigra & puncta rubra evadunt.

12-Pustulata. 62. *C. Desc.* *Media*. *Caput* albidum, puncto frontali nigro. *Thorax* ater, margine antico & laterali pallido. *Elytra* atra, punctis sex albis 2, 3, 1, tribus exterioribus margine connatis. Punctum ultimum lunatum.

Austriaca. 63. *C. Desc.* Nigra, nitida. *Thorax* niger; lateribus pallide rubris. *Caput* nigrum, fronte rubra. *Elytra* nigra, tenuissime punctata. Basi a margine exteriori introrsum macula procedit in modum fasciæ, quæ tamen marginem

interiorem minime attingit. *Abdomen* nigrum, lateribus rubrum. *Pedes* rubri.

Obs. *Scop. carn.* 250. coccinella 4-maculata hujus est varietas?

Minutissi- 64. C. Desc. *Corpus* totum aterrimum, ut  
ma. byssus atra, tomentosulum. *Frons* rubra.

*Thorax* ater, latere utroque macula rubra notatus. *Elytra* atra, maculis duabus rubris, colore sanguinis concreti apicibusque similiter coloratis. Maculae elytrorum fasciam formare videntur, quod latiusculae sint. *Pedes* ex rubro nigri.

Obs. Hæ duæ coccinellæ ad enumerationem *Inf. Austriæ* pertinent; errore igitur *D. Fab.* attributæ fuerunt *tom. I. p. 115.*

Pygmæa. 65. C. Desc. Nigra, lævis, villosula. *Thorax* utrinque macula laterali rubra.

Pardalina. 69. C. Desc. Magna. *Corpus* atrum, maculis duabus baseos albis. *Thorax* ater, fascia media valde sinuata margineque laterali albis. *Elytra* margine sinubus tribus albo punctata in disco quinque 1, 2, 1, 1. *Corpus* atrum.

Margine- C. ( le bord ponctué ) coleoptris flavis,  
punctata. margine albido, punctis utrinque duobus nigris. *Mantiss.* 8.

*Adæ Hall.* 1. 260. coccinella margine punctata, thorace albo multipunctato, elytris rufis luteo maculatis, margine albido, 4-punctato.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.* In Gallia Auf. V.

Desc. Magna. *Caput & thorax* albida, punctis



punctis plurimis sparsis nigris. *Elytra* flava, maculis obsoletis pallidis. Margo albidus, semper punctis duobus distinctis nigris.

Oblongo- C. ( l'oblongue ponctuée ) coleoptris flavis, punctata. lineis quatuor abbreviatis punctis, sex atris. *Mantiss.* 13.

*Hab.* in Russia Australiori. D. Boeber.

*Desc.* Magna. *Caput* nigrum, punctis duobus baseos albis. *Thorax* niger, margine albo puncto nigro. *Elytra* flava, lineis duabus, exteriori abbreviata, interiori basi incrassata atris. Ad futuram puncta tria nigra. *Corpus* nigrum.

Rivularis. C. ( la sinuée ) coleoptris luteis, fasciis duabus dorsalibus sinuatis punctisque sex nigris, thoracè atro flavo bipunctato. *Mantiss.* 19.

*Thumb. nov. sp.* coccinella transversalis.

*Hab.* in Suecia. D. Pay Kull.

*Desc.* Media. *Caput* atrum, punctis duobus baseos flavis. *Thorax* ater, margine antico punctisque duobus flavis. *Elytra* flava, fasciis duabus marginem anteriorem haud attingentibus; altera baseos valde sinuata, altera in medio. Præterea puncta tria submarginalia, postico majori.

4-Notata. C. ( la quadripunctuée ) coleoptris rubris, punctis quatuor baseos nigris, thoracis marginibus albidis. *Mantiss.* 29.

*Hab.* Kilicæ. D. Daldorf. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Differre a reliquis videtur. *Caput* & *thoracis* margo anticus & lateralis obscure albidus. *Elytra* rubra, basi punctorum duorum pari nigro. *Pedes* testacei.



4-Maculata. C. ( la quadrimaculée ) coleoptris rubris ,  
punctis quatuor nigris , thorace atro ,  
macula marginali alba. *Mantiss.* 30.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Differt manifeste a C. 4-punctata.

*Caput* nigrum , punctis duobus baseos  
pallidis. *Thorax* niger , nitidus , macula  
marginali , magna , alba. *Elytra* rubra ,  
punctis duobus 1 , 1 nigris. *Corpus*  
nigrum.

5-Maculata. C. ( la 5-maculée ) oblonga , coleoptris  
flavescentibus , punctis nigris quinque ,  
thorace atro , margine antico trira-  
diato albo. *Mantiss.* 32.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.* In Gallia  
Aust. V.

*Desc.* Differre videtur a C. 5-punctata.

*Corpus* magis oblongum. *Caput* antice  
album , punctis duobus nigris. *Thorax*  
ater , margine antico & laterali albis.  
Margo anticus ramos tres exserit.  
*Elytra* flava , puncto baseos communi  
duobusque in medio nigris.

11-Maculata. C. ( la 11-maculée ) coleoptris rubris  
punctis nigris undecim , corpore fer-  
rugineo. *Mantiss.* 47.

*Hab.* in Hispania. *D. Vahl.* In Gallia  
Aust. V.

*Desc.* Differt manifeste a C. 11-punctata ,  
duplo fere major. *Corpus* ovatum ,  
rufum. *Elytra* punctis quinque 1 , 2 , 2  
oblique positis & baseos communi.

Chrysomeli- C. ( la chrysomeline ) coleoptris rufis ,  
na. punctis nigris duodecim , thorace  
immaculato.

*Vincent. Petagn. specim. n.* 35.

*Desc.* Major. *Caput* & *thorax* rubra ,

immaculata, margine paullo pallidiora. *Elytra* rufa, punctis sex nigris per paria dispositis, 2, 2, 2. *Pedes* flavescentes.

*Obs.* Huic respondet nostra in Acropoli reperta, e majoribus est, rubra. *Antennæ* apice fuscae. *Oculi* nigri. *Thorax* & *elytra* rubra, pube albescente. Singulum *elytrum*, punctis sex nigris grandiusculis, per paria distributis. *Abdomen* subtus nigricans, margine rubescente, *Pedes* flavescentes.

14-Maculata. C. ( la 14-maculée ) coleoptris luteis; sutura punctisque quatuordecim nigris distinctis. *Mantiss.* 57.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner, In Gallia Aust. V.

*Desc.* Distincta omnino a C. 14-punctata, major. *Caput* album. *Thorax* albus, nigro punctatus. *Elytra* lutea, punctis 3, 3, 1, anterioribus in semicirculo positis. Sutura nigra.

16-Maculata. C. ( la 16-maculée ) coleoptris rubris; punctis nigris sedecim, capite immaculato. *Mantiss.* 60.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner.

*Desc.* *Corpus* majusculum, oblongum; *Caput* album immaculatum. *Thorax* albis, punctis septem nigris 2, 5. *Elytra* rubra punctis octo 2, 2 approximata, 1, 3 oblique posita; puncta rarius connexa.

8-Guttata. C. ( les 8-gouttes ) coleoptris obscure rufis, punctis octo albis. *Mantiss.* 71.

*Hab.* in Kamtschatka. *Mus.* D. Banks.

*Desc.* Media. *Caput* atrum. *Thorax* ater; margine late albo; macula cordiformis

alba ad basin. *Elytra* obscura, puncto  
baseos ad futuram, duobus in medio  
versus futuram lineolaque apicis albis.  
*Corpus* atrum.

2-Guttata. C. ( les 2-gouttes ) coleoptris rufis,  
punctis duobus flavis. *Mantiss.* 72.

*Hab. Mus.* D. Hunter.

*Desc.* Parva. *Thorax* glaber ater, nitidus,  
margine laterali flavo. *Elytra* glabra,  
rufa. Macula baseos transversa flava.

Anal. C. ( l'enflammée ) coleoptris atris apice  
rubris immaculatis. *Mantiss.* 81.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner.

*Desc.* Nimis C. *hæmorrhoidali* affinis, at  
duplo minor. *Caput* rubrum, immacu-  
latum. *Thorax* rufus, basi in medio  
niger. *Elytra* lævia, atra, apice late  
rufa. *Abdomen* & *pedes*, rufa.

Frontalis. C. ( la frontale ) coleoptris nigris, punctis  
duobus rubris, fronte pedibusque an-  
ticis rubris. *Mantiss.* 86.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner.

*Desc.* Differt sane a reliquis. *Caput* fer-  
rugineum, immaculatum, *Thorax* niger,  
margine antico parum rufescente. *Elytra*  
nigra, puncto medio rufa. *Pedes* antici  
rufi, *postici* nigri, *tibiis* rufis.

*Desc.* Variat capite nigro & punctis ely-  
trorum quatuor.

Erythroce- C. ( l'érythrocéphale ) coleoptris atris :  
phala. punctis rubris sex, capite thoracif-  
que margine pallide rufescentibus.  
*Mantiss.* 82.

*Hab.* Kiliæ. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Differt manifeste a C. 6-punctata.  
*Corpus* multo minus, *Caput*, *thoracis*

margo pedesque pallide rufescentia.  
*Elytra* atra, nitida, punctis tribus  
 rubris 2. 1. *Abdomen* nigrum.

*Obs.* *Coccinella* 3-punctata Linn. sub  
 eodem nomine in *Mantiss.*

*Chrysomela.*

Linnæana. 37. *C. Desc.* Statura chryf. politæ. *Caput*,  
*thorax*, *femora*, *abdomen* nigra. *Antennæ*,  
*tibiæ*, *elytra* rubra; *thoraci*  
 quoque maculæ duæ sanguineæ insident,  
 permanentes, una ad quemvis margi-  
 nem anteriorem prope basin.

Bulgaren- 38. *C. Desc.* nigra. *Antennarum* primus &  
 fis. secundus articulus, rubri. *Antennæ* ipse-  
 filiformes. *Thorax* marginatus. *Elytra*  
 nigro-viridi-ænea punctata, quæ puncta  
 fatis profunda lineas decem constituunt.  
*Pedum* unguiculi rubri.

Erythro- 39. *C. Ovata*, atra, vix nitens, punctis  
 ptera. impressis, inordinate digestis, copiosis  
 obsita. *Thorax* minus punctatus, nec  
 tamen nitens. *Antennæ* basi rubro-  
 fuscae. *Pedes* ex nigro violacei. *Alæ*  
 læte coccineæ.

Viridicol- 40. *C. Desc.* *Thorax* marginatus viridis,  
 lis. basi apiceque cæruleus. *Elytra* cærulea,  
 inordinate punctata, lineis impressis  
 obsoletis. *Antennæ* sensim crassiores  
 nigrae, in medio rubrae. *Subtus* vio-  
 lacea. *Pedes* nigri.

Viennensis. 41. *C. Desc.* *Tibiæ* a medio *tarsisque* rufi  
 coloris. *Antennæ* nigrae, sensim cras-  
 siores. *Thorax* tenuissimè, magis conf-  
 picuè, *elytra* punctata.



20-Punctata. 42. C. Desc. Nigro-ænea, abdomine flavesciente. Thorax margine flavo. Elytra flava, maculis oblongis in singulo elytro decem nigris. Antennæ articulis tribus exterioribus crassioribus. Pedes subfusci, femoribus æneo-nigris.

Xanthomelæna. 43. C. Desc. Subtus nigra. Caput flavum, in fronte macula nigra. Oculi nigri. Antennæ filiformes nigræ. Thorax flavus, maculis quatuor nigris, quarum una utrinque prope marginem, una in medio & super hanc alia transversa. Elytra flava, sed futura nigra & linea lata longitudinali nigra prope latus externum; item alia brevissima prope internum. Animal, dum vivit, elegantissimum, at mortuum vera fluxæ pulchritudinis imago.

Obs. Licet chryf. *calmariensem* non citaverit D. Schrank; forsan tamen chryf. *xanthomelænæ* varietas. Nam, excepto elytrorum colore, vix differunt. V.

Dimidiata. 45. C. Desc. Tota nigra, sed pedes, os, elytraque a basi ad medium rufa.

Flavo-guttata. 46. C. Desc. Simillima chryf. *marginatæ* a qua differt sola pictura elytrorum thoracisque. Fronti puncta duo flava insunt. Antennæ basi fuliginose flavescunt.

Dubia. 47. C. Desc. Pertinet ad buprestes Scop. & cryptocephalos D. Geoff. Tota aterrima, nitens, sine ullis striis punctisve, etiam vel ad lentem conspicuis. Pedes non saltatorii. Decidat Linnaeus, an non tamen ejus chryf. *hemispharica* sit, cum chryf. *saltatoriarum* aliquæ varient pedibus simplicibus.



Clavicornis. 48. *C. Desc.* Caput, thorax, ( qui latus est & marginatus & elytrorum longitudine ) elytraque viridi-nigrescentia. Pedes rufi. Antennæ fuscæ, insigni clava instructæ. Caput intra thoracem fere totum retrahit; nec tamen thorax ita globosus, ut in cryptocephalis laudati auctoris.

Lusitanica. 49. *C. Desc.* Major chryf. *Bankii*. Caput nigrum, primo antennarum articulo violaceo. Thorax cupreus, obscure nitidus. Elytra vage punctata, ænea. Corpus subtus cum pedibus violaceum.

Bankii. 50. *C. Desc.* Statura chryf. *bicoloris*. Caput æneum, ore testaceo antennisque fuscis. Elytra ænea, punctata. Subtus tota cum pedibus & elytrorum margine inferiori testacea.

Adonidis. 51. *C. Desc.* Affinis chryf. *futurali*. Caput nigrum, fronte flava. Thorax ater, margine laterali flavo, puncto medio nigro. Scutellum atrum. Elytra flava, futura nigra, quæ tamen scutellum haud attingit. Vitta lata nigra in medio elytrorum, quæ nec ad basin nec ad apicem excurrit. Corpus & pedes atra, plantis fuscis.

*Obs.* In prima *Mantiss.* sub nomine chryf. *3-lineatæ* descripta.

Dorsalis. 52. *C. Desc.* Affinis videtur præcedenti, at minor. Elytra testacea, sola futura atra, quæ basin haud attingit. Antennæ & pedes nigri. Scutellum atrum.

Cuprea. 53. *C. Desc.* Statura & magnitudo omnino chryf. *graminis*. Corpus, antennæ &

*pedes*, nigra. *Caput* æneum, oculis fuscis. *Thorax* æneus, margine incrasato, punctato. *Elytra* omnino cuprea, nitida, basi gibba. *Abdominis* margo sanguineus.

Limbata. 54. *C. Desc.* Statura & summa affinitas chryf. *sanguinolenta*, a qua tamen manifeste differt elytris multo lævioribus & margine anteriori sanguineo. Color *omnis* niger, parum æneo tinctus.

Hannoveriana. 55. *C. Desc.* Statura chryf. *marginata*, cyaneo nitida, glabra. *Antennæ* moniliformes nigrae. *Thorax* margine late ferrugineo. *Elytra* punctato-striata, margine vittaque media ferrugineis, quæ postice cum margine coit.

Litura. 56. *C. Desc.* Statura chryf. *pallida*, at duplo minor. *Caput* rufum, margine postico nigro. *Thorax* rotundatus, nitidus, immaculatus. *Elytra* striato-punctata, sutura lineaque media nigris. *Subtus* nigra, pedibus pallidis. *Mus* pallidus, ubi *femina* rufescens; interdum linea nigra elytrorum deest.

Fucata. 57. *C. Desc.* Statura & magnitudo chryf. *hamorrhoidalis*. *Caput* uti *corpus* subtus, *pedesque* atra, immaculata. *Thorax* viridis, glaber, nitens. *Elytra* obscuriora vage punctata.

Fuscicornis. 58. *C. Desc.* Magnitudo præcedentis. *Caput*, *thorax*, *elytra* viridi-ænea, immaculata, glabra, nitida. *Corpus* subtus magis obscurum. *Antennæ* & *pedes* nigri.

- Ruficollis. 59. *C. Desc.* Statura chrysf. *betulæ*. *Antennæ* rufæ, apice fuscæ. *Caput* viridizæneum, ore rufo. *Thorax* rufus, immaculatus. *Elytra* viridia, nitida, immaculata. *Corpus* viride. *Pedes* rufi.
- Abfinthii. 60. *C. Desc.* *Corpus* magnitudine chrysf. *tanacetii*. *Caput* pallidum, bafi nigrum. *Thorax* pallidus, macula media nigra. *Elytra* pallida, lineis tribus atris, quæ tamen nec bafin nec apicem attingunt; exteriores apice coeunt. *Pedes* ferruginei, geniculis nigris.
- 4-Maculata. 61. *C. Desc.* Magnitudo & ftatura chrysf. *alni*. *Caput* testaceum, bafi inter oculos nigrum. *Thorax* rotundatus, testaceus, immaculatus. *Elytra* lævia, nitida, testacea, maculis duabus nigris, altera bafeos rotundata, altera pone medium transversali fere fasciam constituyente. *Abdomen* atrum. *Pedes* testacei.
- 20-Punctata. 62. *C. Desc.* Statura chrysf. *analisi*. *Thorax* æneus, marginibus incrassatis albis. *Elytra* alba, futura maculisque decem oblongis æneis. *Pedes* ænei, geniculis albis.  
*Obs.* Varietas videtur chrysf. *20-punctatæ*, n. 42; vix enim differt nisi colore. V.
- Ruficodis. 64. *C. Desc.* Magnitudo chrysf. *graminis*. *Tota* obscure ænea. *Antennæ* capitis thoracisque longitudinem æquant. *Thorax* antice concavus. *Abdomen* lateraliter rubrum. Alarum nervus exterior, bafi ad medium usque, ruber.
- Cæruleo-violacea. 65. *C. Desc.* Affinis chrysf. *alni*. cæruleo-violacea. *Thorax* elytrorum latitudinem

fere æquat. *Subtus* viridi-violacea. *Antennæ* apice crassiores caput thoracemque minime superant.

Griseo- 66. *C. Desc.* Supra griseo-fusca, nitens, nitida. *subtus* nigricans. *Antennæ pedesque* nigricante fusci.  
*Hab. in lilio.*

Ferruginea. 90. *C. Desc.* *Tota* pallide testacea, seu lucide castanei coloris, nitida, ovata. *Thorax* inflexus uti *chryf. elongata*. Ad lentem *elytra* striato-punctata. *Oculi* soli nigri. *Femora postica* crassiora, quod in saltatoriis omnibus obtinetur, si auctoribus fidas.

Euphorbiæ. 91. *C. Desc.* *Tota* atra, nitida minime æs aurumve inclinans. *Elytra* impunctata nec striata. *Antennæ tibiæque* omnes rufæ.

Altica. 92. *C. Desc.* *Frons* rufa. *Oculi* nigri. *Pedes* rufi. *Thorax* niger, basi utrinque in margine exteriori macula rufa. *Elytra* atra, nitida, irregulariter minutissime punctata, subtilissime tomentosa; singula prope basin puncto rubro.

Pulex. 93. *C. Desc.* Oblonga, tota nigra, nitens: *Thorax*, *elytraque* subtilissime, at irregulariter punctata.

Cincta. 94. *C. Desc.* *Caput* nigrum. *Thorax* obscure æneus, margine albo. Margo & anticus & posticus in medio albus. *Elytra* viridi-ænea, margine punctisque duobus dorsalibus albis. *Corpus* atrum. *Femora postica* valde incrassata.

- Nigripes. 95. C. Desc. Affinis chrysf. *hyosciani*, at *pedes omnes nigri*.
- Anglica. 96. C. Desc. Statura & summa affinitas chrysf. *atricillæ*, at *thorax* etiam ater. *Tibiæ pallidæ*.
- Testacea. 100. C. Desc. Differt sane à chrysf. *exfoleta*. Major est, magis gibba, *thoracè elytrisque lævissimis*, nitidis.
- Tabida. 101. C. Desc. Statura omnino chrysf. *exfoleta*, at paullo minor. *Tota pallida*, immaculata, *oculis solis nigris*, prominulis. *Elytra lævia*.
- Atra, 102. C. Desc. Parva, *tota atra*, solis plantis *pedum & antennarum subrufescentibus*.
- Cæruleo-  
striata, 103. C. Desc. *Antennæ* corporis dimidio longiores, *rufæ*. *Caput*, *thorax* *pedesque* lutescente-rufa, nitida. *Elytra* obscure violacea, striato - punctata. *Corpus* subtus nigrum.
- Violaceo-  
punctata. 104. C. Desc. Vix pulice major. *Antennæ* *rufæ*. *Caput thoraxque* aurato-cærulea, concavo-punctata. *Elytra* violacea, punctis concavis longitudinaliter digestis. *Corpus* subtus nitido-nigrum. *Pedes* rufi, *femoribus posticis fuscis*.
- Viridi-  
cærulea. 105. C. Desc. Minime ovata. *Antennæ* *rufæ*, ultimis articulis incrassatis, fuscis. *Caput*, *thorax* qui lævis, *elytraque* viridi - cærulea. *Pedes* obscure rufi, *femoribus* nitido-nigris.
- Bicolor. 106. C. Desc. Nimum affinis chrysf. *rufipedi*.



*Elytra* æneo-nigra, striato-punctata.  
*Pedes* nigri.

Ovata. 107. *C. Desc.* Tota viridescenti - nigra.  
*Elytra* irregulariter punctata.

Brassicæ. 108. *C. Desc.* Similis præcedenti, sed minor  
magisque elongata.

Lævis. 109. *C. Desc.* ovata nigra, subtilissime  
scabra.

Marginata. 110. *C. Desc.* Chryf. nemorum affinis.  
*Antennæ*, caput, corpus subtus pedes-  
que nigra. *Thorax* pallide luteus,  
lateraliter nigricans. *Elytra* lutea,  
extus & intus nigro marginata, quæ  
nigredo basin non attingit.

Cærulea. 111. *C. Desc.* *Antennæ* basi ferrugineæ.  
*Elytra* cærulea, irregulariter punctata.  
*Pedes* ferruginei.

Longipes. 136. *C. Desc.* Statura chryf. tridentatæ,  
at major. *Antennæ* breves, ferratæ.  
*Thorax* niger, subpubescens. *Elytra*  
pallida, punctis tribus nigris, unico ad  
basin & pari in medio. *Pedes* nigri, an-  
tici in omnibus, quas vidi, elongati.

6-Macula- 137. *C. Desc.* Paullo major chryf. 4-punc-  
ta. *Antennæ* breves, ferratæ, nigræ.  
*Thorax* rufus, nitidus, immaculatus.  
*Elytra* glabra, rufa, nitida, puncto  
unico ad basin & duobus in medio  
nigris.

Atraphaxi- 138. *C. Desc.* Magnitudo chryf. 4-punctatæ.  
Caput atrum, antennis ferratis cine-  
reis. *Thorax* rufus, maculis tribus

approximatis nigris ad basin. *Elytra* pallidiora, maculis tribus, posteriori majori transversa. *Pedes* rufi, *emorbibus* nigris. *Abdomen* nigrum, cinereo villosum.

Flavicollis. 139. C. Desc. Nimis affinis videtur chryf. 4-maculata. *Caput* nigrum, lieola inter antennis, punctis duobus inocularum orbita, fulvis. *Antennæ* nigræ, basi fulvæ. *Thorax* glaber, niger, fulvus, punctis sex nigris in stigam digestis. *Elytra* pallida, puncto laseos apiceque nigris. *Pedes* rufi, geniculis nigris. Punctum apicis elytrorum interdum deest.

Marginata. 140. C. Desc. Nimis chryf. longinqua affinis, cujus forte mera varitas. *Corpus* totum nigro-læneum. Punctum flavum ad os. *Elytra* flava, margine omni nigro.

2-Macula. 141. C. Desc. Nimis chryf. 2-punctata affinis & forte mera ejus varitas. Differt tantum thorace haud atro sed fulvo.

Cyanea. 143. C. Desc. Statura chryf. cordigera. *Caput* & *elytra* cyanea, nitida. *Thorax* glaber, rufus.

Collaris. 144. C. Desc. Major chryf. sericea. *Caput* cyaneum, antennis basi rufis. *Thorax* glaber nitidus, medio cyaneus, lateribus rufis. *Elytra* cyanea, macula magna apicis rufa. *Corpus* nigrum. *Pedes* nigri, femoribus rufis.

Quadrum. 145. C. Desc. Magnitudo chryf. Morai.

*Corpus* totum atrum nitidum. *Elytra* lævia, flava, vitta media lata atra, quæ apicem tamen haud attingit, sed ante apicem reflectitur ad futuram.

Vittata. 146. *C. Desc.* Magnitudo & statura chryf. *Moræi*. *Corpus* nigrum, nitidum. *Elytrorum* margo exterior flavus & in medio stria abbreviata flava.

2-Putula- 147. *C. Desc.* Nimis affinis chryf. 4-pustulata. *Tota* atra. *Elytra* striata, macula magna apicis rufa, margine tamen ipso tenuissime nigro.

listrio. 148. *C. Desc.* Magnitudo chryf. *Scopolinæ*. *Caput* nigrum, orbita oculorum rufa. *Thorax* niger, margine lineolisque tribus abbreviatis ferrugineis. *Elytra* punctata nigra, maculis apiceque ferrugineis. *Pedes* ferruginei, geniculis femorumque posticorum fascia rufa.

lufilla. 149. *C. Desc.* Parva, duplo minor chryf. *pini*. *Caput* fulvum, *antennis* pallidis oculisque nigris. *Thorax* fulvus, im-maculatus. *Elytra* substriata, punctis duobus baseos fasciaque postica, nigris. *Corpus* nigrum. *Pedes* pallidi.

*Obs.* Variant interdum maculæ elytrorum, mox confluunt, mox omnino desunt.

Vidacea. 152. *C. Desc.* *Antennæ* corpus fere æquant. *Elytra* regulariter punctato - striata. *Subtus* cæruleo-atra, *supra* cærulea.

cærulea. 153. *C. Desc.* Affinis præcedenti, at *elytra* punctis irregulariter sparsis.

- Nigra. 154. C. Desc. *Tota nigra, antennis basi pedibusque rufis. Thorax lævis. Elytra punctato-striata.*
- Fulva. 155. C. Desc. *Nigro-fusca. Antennæ nigræ. Caput, thorax lævis pedesque rubello-fulva. Elytra pallide flavescencia striis carent.*
- Lineola. 174. C. Desc. *Statura chryf. nymphaeæ. Caput griseum, antennis nigris. Thorax griseus, linea media nigra lateribusque subangulatis. Elytra grisea, puncto baseos nigro. Corpus subtus fuscum, cinereo pubescens.*
- Sanguinea. 175. C. Desc. *Statura omnino chryf. capreae, at rubra, antennis, oculisque nigris. Abdomen nigrum. Pedes cinerei.*
- Nigricor- 176. C. Obs. *Delenda species hæc; nam chryf. halensis Syst. est cistela 13 Mantiss.*
- Cantharoi- 177. Desc. *Statura chryf. nymphaeæ. Antennæ filiformes, basi rufescentes. Caput & thorax exacte chryf. nymphaeæ, rufa, immaculata. Elytra & abdomen cyanea, nitida.*
- 14-Puncta- 178. Desc. *Magnitudo & statura chryf. 12-punctata. Caput fulvum, ore, antennis punctoque verticali, nigris. Thorax fulvus, punctis quinque nigris 4, 1. Elytra pallidiora, punctis 1, 2, 2, 1, 1; quorum sextum majus, rotundatum, septimum terminale. Abdomen & Femora fulva.*



*Subspinosa*. 179. *C. Desc.* Statura *chryf. flavipedis*. *Caput* rufum, *antennis* filiformibus nigris, *basi* rufis. *Thorax* utrinque unispinosus, subpunctatus, rufus, immaculatus. *Elytra* punctata, obscure nigra. *Abdomen* nigrum. *Pedes* rufi.

5-Puncta- 180. *C. Desc.* Tota aterrima. *Oculi* proflantes. *Frons* inter oculos sulco profundo longitudinali. *Thorax* fulvus f. ruber. *Elytra* fulva, thorace pallidiora, punctato-friata, striis per singula decem, puncto minori ad basin exteriorem, majori ultra medium nigris, notata. *Margo internus* niger. *Scutellum* nigrum; & post hoc ex dilatata marginis nigredine macula magna, utrinque elytro communis nigra.

*Obs.* Fere omnino similis *crioc. 5-punctatae*. *Mantiss.* 29; eademque species videtur. Vix enim differt nisi coloris varietate.

*Varians*. *C.* ( la variable ) ovata cærulea f. viridis, *antennis* *pedibusque* nigris. *Mantiss.* 24.

*Añ. Hall.* 1. 272. *chrysomela varians*.

*Hab.* in Saxonia. in Gallia Aust. V.

*Desc.* Corpus medium, totum glabrum aut viridi-æneum, aut cyaneum, immaculatum. *Pedes* nigri.

*Centaurii*. *C.* ( de la centauree ) ovata cuprea nitens, subtus viridi-ænea, *pedibus* cupreis. *Mantiss.* 25.

*Hab.* in Germaniæ centaurea. *D. Schneider.*

*Desc.* Statura & magnitudo præcedentis. *Antennæ* nigrae. *Corpus* supra cupreum, nitidum, subtus viridi-æneum. *Scutellum* æneum. *Pedes* cuprei.

Tremula,



*Tremula*. C. ( du tremble ) ovata cærulefcens , elytris testaceis.

*Geoff. inf.* I. 252. 2.

*Hab.* in Europæ populo.

*Desc.* An fatis a chryf. *populi* diftincta? At duplo minor & *elytra* apice concolora.

*6-Punctata*. C. ( la 6-pouctué ) nigra , thorace rufo , punctis duobus , elytris rufis , punctis tribus nigris. *Mantiff.* 43.

*Hab.* in Europæ plantis. Circa Lugdunum. V.

*Desc.* Affinis chryf. *10-punctata* , omnino diftincta a *cryptocephalo* 6-punctato. *Caput* nigrum , ore rufo. *Thorax* rufus , punctis duobus nigris interdum bafi connatis. *Elytra* glabra rufo , punctis tribus bafeos 2 , 1 ; nigris. *Corpus* nigrum , ano rufo. *Pedes* rufi.

*Rumicis*. C. ( de la patience ) ovata , thorace fulvo , punctis quatuor nigris , elytris fulvis , futura vittaque media nigris. *Mantiff.* 47.

*Hab.* in rumici fpinofa Hifpaniæ. D. *Vahl.*

*Desc.* Statura & magnitudo chryf. *pallida* . *Antennæ* nigræ , articulo primo fulvo. *Caput* fulvum , læve , nitidum , puncto in medio bafeos nigro. *Thorax* lævis , nitidus , fulvus , punctis quatuor transverfim pofitis. *Scutellum* nigrum. *Elytra* lævia , fulva , futura tota vittaque media , quæ tamen nec bafin , nec apicem attingit , nigris. *Corpus* nigrum. *Pedes* fulvi.

*Ruficollis*. C. ( le collier ) ovata cyanea , antennarum bafi thorace pedibusque rufis. *Mantiff.* 55.

*Hab.* in Ruffia Meridionali. D. *Boeber.*

*Desc.* Statura omnino chryf. *polygoni* .

*Infeâ. Tomus IV,*

R

at paullo minor & alia. *Antennæ* basi rubræ, apice fuscæ. *Caput* cyaneum, utrinque puncto parvo baseos rubro. *Thorax* rufus, nitidus, immaculatus. *Elytra* nitida, cyanea, vix punctata. *Corpus* cyaneum. *Anus* & *Pedes* rufi.

Aucta. C. ( l'augmentée ) ovata, thorace cyaneo nitido, elytris punctatis cyaneis, margine rubro. *Mantiss.* 69.

*Hab.* Dresdæ. *D.* Zschuck.

*Desc.* Magnitudo & statura chryf. marginatæ. *Caput*, *thorax*, *elytra* cyanea nitida, margine elytrorum late rufo. *Antennæ* pedesque nigri.

5-Punctata. C. ( la 5-punctuée ) ovata nigra, thorace rufo, coleoptris testaceis punctis quinque nigris. *Mantiss.* 72.

*Hab.* Hamburgi. *D.* Schulz.

*Desc.* Media. *Caput* cum antennis, *corpus*, *pedes*, nigra. *Thorax* rotundatus, rufus immaculatus. *Elytra* lævia, testacea, puncto baseos apicisque & communi in medio nigris.

Scutellata. C. ( l'écuffonnée ) ovata rufa, coleoptris maculis quinque nigris. *Mantiss.* 73.

*Herbst. arch.* chrysomela scutellata.

*Hab.* in Germania. *D.* Schneider. In Gallia Aust. V.

*Desc.* Parva. *Caput* & *thorax* rufa, immaculata. *Antennæ* apice fuscæ. *Elytra* lævia, rufa, macula baseos communi duabusque in medio approximatis fere confluentibus, nigris. *Abdomen* basi nigrum.

Flavicans. C. ( la jaunâtre ) ovata flavescens, elytris viridi-cinereis. *Mantiss.* 75.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Statura & magnitudo omnino chryf. lituræ. *Caput*, *thorax*, *pedes* flavescencia. *Elytra* punctato-striata, viridicinea, margine parum flavesciente.

*Pallipes. C.* ( la pallipede ) ovata nigra, elytris pedibusque pallescentibus. *Mantiss.* 85.

*Hab.* Kilix. *D.* Daldorf.

*Desc.* Parva. *Antennæ* nigrae, basi pallidæ. *Caput* & *thorax* nigra, glabra, immaculata. *Elytra* lævissima, pallescentia. *Pedes* pallidi.

*Sophiæ. C.* ( du sisymbre ) ovata cærulea, tibiis plantisque flavis.

*Ad. Hall.* 1. 272. chrysomela sphiæ ovata viridis, elytris postice acuminatis, tibiis plantisque ferrugineis.

*Hab.* in sisymbrio sophia Halæ.

*Desc.* Statura & magnitudo chryf. armoraciæ. Totum corpus læve, glabrum, cæruleum, nitidum, folis tibiis plantisque flavescantibus. *Elytra* parum acuminata.

*Littoralis. C.* ( des rivages ) oblonga atra, elytris porcatis, atro-fusca, elytris lineis tribus elevatis, punctis numerosis. *Mantiss.* 93.

*Geoff. inf.* 1. 252. 1. tab. 4. fig. 6. galleruca.

*Hab.* ad Europæ Australis littora.

*Desc.* Statura omnino chryf. tanaceti, at major, tota atra immaculata. *Elytra* lineis quatuor elevatis postice coeuntibus, interjectis punctis impressis numerosis.

*Rustica. C.* ( la rustique ) oblonga nigra, thorace elytris griseis. *Mantiss.* 94.

*Ad. Hall. 1. 274. chrysomela rusticā, ovata nigra, elytris griseis, striis quinque eminentibus.*

*Hab. in Germaniæ fruticibus. Circa Lugdunum. V.*

*Desc. Affinis videtur chryf. tanaceti. Corpus nigrum, at thorax & elytra grisea. Elytra punctata, lineis tribus elevatis multo distinctioribus.*

*Lachicæ. C. ( la rouillée ) oblonga, capite thoraceque obscure ferrugineis, elytris nigro-æneis. Mantiss. 105.*

*Hab. Dresdæ. Mus. D. Romani. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Statura & magnitudo chryf. vitellinæ. Caput & thorax obscure ferruginea. Antennæ moniliformes sensim crassiores. Elytra punctato - striata, obscure ænea. Abdomen nigrum. Pedes ferruginei.*

*Cruciata. C. ( la porte-croix ) oblonga rubra, coleoptris cruce nigra. Mantiss. 110.*

*Schall. aḡ. Hall. 1. 273. chrysomela cruciata.*

*Hab. Halæ-Saxonum. In Gallia Aust. V.*

*Desc. Minor chryf. coccinea. Caput obscurum, antennis nigris. Thorax marginatus, lævis, nitidus, ruber, immaculatus. Coleoptra lævia nitida, rubra, futura fasciaque lata in media, atris. Corpus rufum, abdominis basi nigra. Pedes nigri.*

*Obs. Saltatoriæ femoribus incrassatis.*

*Brassicæ. C. ( du chou ) saltatoria atra, elytris pallide testaceis, margine omni fasciaque media, atris. Mantiss. 146.*

*Hab. in Germaniæ oleribus.*



*Desc.* Corpus parvum, atrum. *Antennæ* basi pallidæ. *Elytra* lævia, margine omni fasciaque media lata, atris. *Pedes* atri.

*Corpore cylindrico.*

**Rubrifrons. C.** ( la pudique ) cyaneus nitidus, fronte, thoracis fascia, femoribusque rubris. *Mantiss. crypt.* 37.

*Hab. Prof. Leske.*

*Desc.* *Antennæ* fuscæ, basi rufæ. *Caput* magnum, cyaneum, macula magna rufa. *Thorax* rotundatus, in medio late rufus, margine antico posticoque tenuissime cyaneo. *Elytra* glabra, lævia cyanea, immaculata. *Pedes* cyanei, femoribus imprimis in medio rufis.

**Bucephala. C.** ( la bucéphale ) cyanea, ore, thoracis marginibus pedibusque rubris. *Mantiss. crypt.* 41.

*Añ. Hall. i.* 276. chrysomela bucephala. Cylindrica, cyanea, thorace rufo, macula cyanea, pedibus rufis, femoribus basi plantisque cæruleis, maxillis forcipatis rufis.

*Hab. in anthylli vulneraria Saxoniae.*

*Desc.* Maxillæ in altero sexu magnæ, incrassatæ, forcipatæ, rubræ, apice nigræ.

**8-Guttata. C.** ( la 8-ponctuée ) atra, elytris maculis quatuor flavis. *Mantiss. clypt.* 50.

*Hab. in fraxino Saxoniae. D. Hybner.*

*Desc.* Magnitudo chryf. *Moræi.* *Caput* atrum, fronte flavo maculata. *Thorax* ater, nitidus, lævis, margine antico flavo. *Elytra* punctata, atra, maculis quatuor flavis, prima baseos, duabus



in medio & quarta ad apicem. *Pedes nigri, antici flavi.*

**Nitidula. C.** ( la brillante ) thorace æneo nitido , elytris cyaneis , capite , antennarum basi pedibusque flavis. *Mantiss. clypt. 65.*  
*Hab. in Russia Meridionali. D. Boeber.*

*Desc.* Major chryf. *labiata*. Caput flavum , basi parum æneum. *Antennæ* nigrae , basi flavescences. *Thorax* æneus , nitidus , immaculatus. *Elytra* subpunctata , cyanea , nitida , immaculata. *Corpus* nigrum. *Pedes* flavi , *femoribus* linea nigra.

**Flavilabris. C.** ( la bouche jaune ) obscure ænea , nitida , ore lutescente , antennis pedibusque nigris. *Mantiss. crypt. 67.*

*Myll. prodr. 519. cryptocephalus parvulus.*

*Geoff. inf. 1. 8.*

*Hab. in betula Saxoniae. D. Schaller. In Gallia Aust. V.*

*Desc.* Affinis chryf. *labiatae* , at *elytra* striato-punctata. *Antennæ* nigrae , basi lutescentes. *Pedes* nigri. *Larva* faccata , sacco antice oblique truncato.

*Corpore oblongo , thorace angustiore.*

**5-Punctata. C.** ( la 5-punctuée ) nigra , thorace rufo ; coleoptris flavescensibus , maculis quinque nigris. *Mantiss. crioc. 29.*

*Hab. in Germania Australiori. D. Schulz. In Gallia Aust. V.*

*Desc.* Caput cum antennis , nigrum. *Thorax* gibbus , rufus , nitidus. *Elytra* glabra , lævia , flava , puncto altero baseos , altero apice & quinto communi in medio dorsi. *Corpus & pedes* nigra immaculata.

Rufipes. C. ( la rufipede ) atra nitida, antennarum basi pedibusque flavis. *Mantiff. crioc.* 43.

*Hab. in Saxoniæ fruticibus. Musf. D. Romanus.*

*Desc.* Paulo major chryf. *melonopa*. *Antennæ* omnino hujus generis, at paullo longiores, nigræ, basi flavescentes. *Corpus* totum nigrum, glabrum, nitidum, immaculatum. *Pedes* flavescents.

*Elongatæ.*

Gigas. C. ( la gigantesque ) villosa fusca, elytris ; abdomine femoribusque testaceis. *Mant. cistela* 1.

*Hab. in Gallia Australiori. D. Broussenet.*

*Desc.* Gigas in hoc genere. *Antennæ* filiformes, villosæ, fuscæ. *Caput & thorax* villosa, immaculata. *Elytra* substriata, testacea. *Abdomen* dilute testaceum. *Pedes* fusci, femoribus testaceis.

Lepturoides. C. ( la lepturoïde ) atra, thorace quadrato ; elytris striatis testaceis. *Mantiff. cist.* 6. *Leske rusf.* I. pag. 15. 5. tab. A. fig. 4. *cistela* rustarhis.

*Hab. in Europæ Australioris spicis secularis. D. de Schestedt.*

*Desc.* Nimis affinis chryf. *ceramboides* ; at *thorax* omnino diversus, transversus, quadratus, paullo marginatus.

Varians. C. ( la variable ) testacea, oculis nigris ; elytris substriatis. *Mantiff. cistela* 12.

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc.* Statura & summa affinitas chryf. *marinæ*, at paullo major. *Corpus* totum

testaceum, oculis folis nigricantibus;  
*Elytra* substriata.

Variat obscurior, *antennis pedibusque*  
 testaceis.

Humeralis. C. ( la militaire ) nigra, *elytris puncto ba-*  
*feos ferrugineo. Mantiss. cistela 14.*

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Parva. *Corpus* totum nigrum, ferrugi-  
 neum ad basin *elytrorum. Tibiæ* testaceæ.

Morio. C. ( la Négresse ) nigra obscura, *pedibus*  
*testaceis. Mantiss. cistela 15.*

*Hab.* in Suecia. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Statura parva, oblonga, angusta,  
 villosa. *Pedes omnes* testacei.

Ambulans. C. ( l'ambulante ) glabra atra, *elytris*  
*punctis. Mantiss. lagria 9.*

*Hab.* in Germaniæ *D. Schneider.* In Gallia  
*Aust. V.*

*Desc.* Statura & summa affinitas, chryf.  
*elongatæ, at thorax corpore concolor,*  
*ater. Antennæ* ferratæ. *Elytra* glabra,  
 nitida, punctata.

Scutellaris. C. ( la chevaliere ) nigra cinereo hirta;  
*scutello albo. Mantiss. lagria 17.*

*Hab.* in Hispania. *D. Vahl.*

*Desc.* Statura & magnitudo L. *atræ, at*  
*corpus totum pilis densis cinereis hirtum*  
*& scutellum omnino album.*

Rufa. C. ( la rousse ) oblonga nigra, *pedibus*  
*piceis. Erotylus 15. sp.*

*Hab.* Kilix-Holfatorum. *D. Lund.*

*Desc.* *Antennæ* filiformes nigræ, primo  
*articulo ferrugineo. Caput & thorax*  
*nigra, obscura. Elytra* striata nigra,  
 immaculata, *Pedes* picei, *geniculis* nigris.

*Obs.* Nomen triviale primæ *Mantiff.* conservavi, ne confundatur cum *crioc. rufipede.* V.

*Hispa.*

*Obs.* Licet hujus generis nomen a *D. Fab.* conservatum fuerit, species tamen sub hoc genere incedentes, ad hispas *Systematis* non omnes referendæ sunt; sed hispa *picipes* *Mantiff.* 8. ad hoc genus pertinere videtur. V.

**Picipes.** B. ( la picipede ) antennis fusiformibus atra, elytris pedibusque piceis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura reliquis longior. *Antennæ* fusiformes, moniliformes, extrorsum crassiores. *Caput & thorax* lævia, glabra, atra, maculata. *Elytra* lævia, picea. *Pedes* breves picei.

*Bruchus.*

**Marginalis.** 5. B. *Desc.* *Antennæ* porrectæ nigræ. *Caput & thorax* atra, puncto parvo cinereo ad basin thoracis. *Elytra* lævia, cinerea, macula ad basin, altera majori in medio marginis exterioris tertiaeque in apice elytri, nigris. discus elytrorum immaculatus. *Pedes* nigri.

**Scabrosus.** 6. B. *Desc.* Statura B. *feminarii*, at paullo major. *Antennæ* nigræ, extrorsum subcrassiores. *Caput & thorax* nigra. *Elytra* rufa, striis elevatis scabris punctisque aliquot nigris, holosericeis, sparsis.

**2-Punctatus.** 7. B. *Desc.* Distinctus puncto magno ocellari nigro, iride flava ad basin elytrorum.

Varius, B. ( le varié ) elytris nigris, punctis albis nigrisque alternis striatis, femoribus muticis. *Mantiff.* 14.

*Hab.* in Sueciæ pinetis. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Corpus nigrum, cinereo paullo micans. *Elytra* punctis plurimis alternis albis nigrisque striata. *Pedes* nigri, femoribus muticis.

*Curculio.*

Jaceæ. 36. *C. Desc.* Statura curc. pini. *Antennæ* fractæ, nigræ. *Rostrum* crassiusculum, cylindricum, nigrum. *Thorax* ovatus, niger, cinereo irroratus. *Elytra* nigra, atomis cinereis villosis adpersa & puncto distincto baseos versus scutellum.

*Obs.* Junior, atomis plurimis e villo cinereo conflatis, adultior vero, magis glaber & niger.

Bilineatus. 37. *C. Desc.* Medius. *Rostrum* brevius, crassiusculum, nigrum. *Thorax* niger, lineis tribus albis. *Elytra* striata nigra, lineis duabus e punctis quadratis albis, quarum altera ad marginem, altera ad futuram. *Pedes* simplices, nigri.

Tesselatus. 38. *C. Medius.* *Caput* & *antennæ* fusca. *Thorax* & *elytra* grisea, at *elytra* apice striis quinque albis & in his puncta distincta atra.

Equiseti. 39. *C. Desc.* Nimis affinis videtur curc. *lapathi*. *Rostrum* atrum. *Thorax* niger, vix tuberculatus, lateribus albis. *Elytra* muricata, lateribus apiceque albis; in parte anteriori nigra puncta duo parva alba. *Femora* simplicia.



**Bufo. 40.** *C. Desc.* *Rostrum* elongatum, inflexum fuscum, litura dorsali cinerea antennisque piceis. *Thorax* fuscus, dorso plano, punctis duobus minutissimis nigris. *Latera scutellumque* alba. *Elytra* plana fusca, rufo-subvillosa, fascia in medio lata communi alba. *Litura* alba ad apicem.

**Æneus. 41.** *C. Desc.* *Parvus.* *Corpus* nigrum, *elytris* folis æneis. *Femora* mutica.

**Fusci-rostris. 42.** *C. Desc.* *Parvus.* *Statura* sequentis. *Rostrum* elongatum, cylindricum, nigrum. *Thorax* & *elytra* striata grisea, lineis duabus aut tribus albis ad suturam. *Pedes* rufi, *femoribus* basi nigris.

**Nigrirostris. 43.** *C. Desc.* *Corpus* fuscum, rostro cylindrico, atro, nitido. *Thorax* gibbus, rotundatus, viridis, lineis duabus dorsalibus fuscis. *Elytra* tomentosa, viridia, immaculata. *Pedes* fusci, *femoribus* simplicibus.

**Rufirostris. 44.** *C. Desc.* *Statura* & *magnitudo* curc. *aterrimi.* *Caput* nigrum, at anterior dimidia *rostri* pars rufa, apice tamen puncto parvo nigro. *Thorax* niger. *Elytra* striata immaculata. *Pedes* rufi, *femoribus* simplicibus.

**Variabilis. 45.** *C. Desc.* *Medius.* *Caput* pallidè testaceum, *rostri* apice fusco. *Thorax* obscurus, lineis tribus distinctis viridibus. *Elytra* pallide rufescentia, polline virescenti adspersa. *Pedes* rufi.

**Salicariæ. 46.** *C. Desc.* *Corpus* parvum, nigrum. *Antennæ* clavatæ nigrae, basi testaceæ.

*Rostrum* elongatum striatum & *thorax* ;  
 nigra immaculata. *Coleoptra* striata,  
 disco testaceo margine omni nigro.  
*Pedes* testacei, *femoribus* apice fuscis.

Sisymbrii. 47. C. (*du cresson amphibie*) Desc. Parvus.  
*Rostrum* elongatum, nigrum. *Antennæ*  
 fuscae, clavatae. *Thorax* albus, macula  
 fusca in qua linea dorsalis alba. *Elytra*  
 albo fuscoque varia & ad basin puncto  
 parvo oblongo atro. *Corpus* subtus  
 albidum. *Pedes* mutici.

Capreae. 48. C. Desc. Parvus. Caput, thorax,  
 corpus, atra. *Thorax* linea dorsali  
 cinerascens. *Elytra* striata, atra, fas-  
 ciis duabus sinuatis albis, quæ tamen  
 marginem anteriorem haud attingunt.  
*Pedes* inermes nigri.

Malvæ. 49. C. Desc. Parvus. *Rostrum* nigricans.  
*Thorax* & *abdomen* pilis cinereis grisea.  
*Elytra* testacea. *Pedes* testacei, *femo-  
 ribus* inermibus.

Bifasciatus. 50. C. Desc. Parvus. *Rostrum* elongatum,  
 cylindricum, atrum. *Antennæ* clavatae,  
 clava solida cinerascens. *Thorax*  
 rotundatus ater, linea dorsali paullo  
 pallidiori. *Scutellum* cinereum. *Elytra*  
 striata, fasciis duabus undatis cinereis  
 vix marginem anteriorem attingentibus,  
 quarum anterior, imprimis ad futuram,  
 major, altera in medio multo angus-  
 tior. *Pedes* nigri simplices.

Suturalis. 51. C. Desc. *Corpus* parvum. Statura curc.  
 violacei. *Rostrum* longum arcuatum,  
 nigrum. *Thorax* fuscus, linea dorsali

alba. *Elytra* striata, gibba, futura alba, subtus cinereus.

**Crux. 52.** *C. Desc.* Statura & magnitudo præcedentis. *Caput* atrum, immaculatum, *rostrum* incurvo. *Thorax* rotundatus ater, utrinque puncto oblongo baseos albo. *Scutellum* album. *Elytra* striata nigra, futura baseos punctisque plurimis vagis albis. *Pedes* nigri. *Corpus* subtus albidum.

**Venusus. 53.** *C. Desc.* Parvus. *Caput* fuscum, *antennis* testaceis lineaque dorsali albida. *Thorax* fuscus, lineis tribus albidis. *Elytra* punctato-striata, dilutiora, lineis duabus subinterruptis albis. *Pedes* testacei, *femoribus* muticis.

**Oryzæ. 54.** *C. Desc.* Statura & summa affinitas *curc. granarii*, at puncta duo rufa in elytris.

**Filiformis. 55.** *C. Desc.* Statura omnino *curc. paraplectici*, at quadruplo minor. *Rostrum* cylindricum, fuscum. *Thorax* cinereus, lineis tribus fuscis. *Elytra* cinerea immaculata, minime punctata, obtusa. *Pedes* fusci.

**Angustatus. 56.** *C. Desc.* Statura *curc. paraplectici*, at paullo major. *Thorax* scaber. *Elytra* striato-punctata.

**Cylindrus. 57.** *C. Desc.* Statura oblonga *curc. paraplectici*, at minor. *Rostrum* cylindricum atrum, *antennarum* clava acuminata. *Thorax* supra fuscus, subtus albus. *Elytra* substriata, acuminata, nigra, fascia pone medium lata alba, quæ antice ad futuram extenditur. *Abdomen*

nigrum ; apice album. *Pedes* breves simplices.

Linearis. 58. *C. Desc.* Statura valde oblonga & tenuis ; minor curc. *ascanio*. *Rostrum* mediocre , basi valde attenuatum , apice multo crassiore. *Antennæ* ferrugineæ. *Thorax* oblongus niger , punctatus. *Elytra* striata. *Pedes* picei.

*Obs.* Varietas tota ferruginea invenitur.

Crassipes. 59. *C. Desc.* Statura oblongiuscula curc. *ascanii*. *Antennæ* fractæ nigræ , apice fusæ. *Thorax* elongatus planus , crassitie fere elytrorum , postice rotundatus. *Elytra* abdomine breviora , lævia , atra.

Atriplici. 60. *C. Desc.* Statura & magnitudo curc. *linearis* , cui valde affinis. Differt tamen *antennis* apice haud ferrugineis , *rostro* tenui basi haud attenuato *thorace*que minus punctato nitido.

Cærulef- 61. *C. Desc.* Color nigro-cæruleo-viridescens ; subtus obscurior , etiam pectore excavato - punctatus. *Rostrum* tenue , longum. *Thorax* excavato - punctatus. *Elytra* decem striata , striis minime punctatis. *Femora* mutica.

Rhedi. 62. *C. Desc.* *Antennæ* breves non fractæ. *Rostrum* tenue. *Thorax* punctis prominulis confertis scaber. *Elytra* striata striis septem , non punctata , at inter quasvis duas strias puncta aliquot vix ad lentem visibilia. Nonnihil viridescit insectum ; *subtus* ex toto nigrum.

Cardui. 63. *C. Desc.* Parvus. Statura curc. *alliaria* , at totus ater. *Elytra* striata. *Pedes* flavi.

Palustris. 54. *C. Desc.* Cinereus totus ex tomento brevissimo decumbente. *Thorax* utrinque linea longitudinali flavescente. *Elytrum* singulum in medio notatur puncto albo. *Abdomen* subtus notatur utrinque linea ex punctis sordide albis sensim minoribus : quodvis *femur* ad apicem cingit fascia alba.

*Obs.* Curculio *bipunctatus*. *D. Geoff.*

Elegans. 65. *C. Desc.* niger. *Elytra* striata, striis novem, duplici punctorum serie inter singulam striam.

Incisus. 66. *C. ( le fillonné ) Desc.* Minor niger. *Thorax* punctatus. *Elytra* profunde punctato-striata. *Pedes* fulvescentes.

Funereus. 67. *C. Desc.* Niger. *Thorax* punctatus. *Elytra* striata, inter strias punctata. *Abdomen* subtus squamis albis.

Armatus. 68. *C. Desc.* Minimus, cinereo - niger. *Thorax* spina utrinque armatus. *Elytra* striata, duplici punctorum serie inter strias.

Pultiaris. 69. *C. Desc.* Minimus niger ovatus. *Thorax* in medio linea alba, lateraliter fasciis albis. *Elytra* striata, striis e pilis conflatis.

Cinctus. 70. *C. Desc.* Rufo-fulvus. *Elytra* striata, fasciis tribus albis, una transversa in medio, altera superne, inferne altera. Ambo ultimæ non raro defunt.

Fasciatus. 71. *C. Desc.* An præcedenti varietas? Vix enim nisi colore differunt.

*Obs.* Curc. *vittatus* Entom. parif.



- Murinus. 72. *C. Desc.* Niger, pilis murinis vestitus. *Scutellum* album maculaque alba in thorace prope scutellum.
- Marmora-  
tus. 73. *C. Desc.* Minimus. *Antennæ* rufæ. *Caput thoraxque* nigra. *Scutellum* albescens. *Elytra* striata, fusco-rubra, fasciis obliquis obscuris, lineola nigra ad futuram. *Pedes* rufi, *femoribus* nigris.
- Rugosus. 74. *C. Desc.* *Thorax elytraque* rugosa. Margo elytrorum exterior, duabus tribus striis longitudinalibus elevatis.
- Piceus. 75. *C. Desc.* Nitido-ater. *Antennæ* obscure rufæ. *Caput thoraxque* scabrosa. *Elytra* striato-punctata.
- Nigro-  
gibbosus. 76. *C. Desc.* Niger, postice cinereus. *Thorax* convexus scaber. *Elytra* fornicata, punctis concavis sulcata.
- Castaneus. 77. *C. Desc.* Affinis præcedenti, rufo-fuscus. *Corpus thoraxque* glaber, subtus nigra. *Elytra* punctis concavis longitudinaliter digestis.
- Plantaginis. 78. *C. Desc.* Minor. *Thorax* fuscus, fasciis tribus longitudinalibus griseis. *Elytra* maculis fuscis villosis longitudinaliter dispositis. *Pedes* obscure ochraceati, *tibiis* fuscis.
- Rostratus. 79. *C. Desc.* Minor. *Caput* viridescenti-cæruleum, nitidum. *Antennæ* dimidio rufæ. *Caput elytraque* viridescenti-cærulea, nitida. *Rostrum* latum, depressum *thoraxque* rufa. *Totus* supra concavo-punctatus. *Pedes* rufi.

Rufus,

- Rufus. 86. *C. Desc.* *Totus*, etiam rostro, antennis pedibusque, *rufus* & fere *ruber*; sed oculi, pectus abdomenque *nigra*; *femora* dentata postice crassiora.
- Pilosus. 87. *C. Desc.* *Corpus* parvum hirtum, nigro cinereoque variegatum. *Antennæ* testaceæ. *Femora* postica incrassata.
- Caliginosus. 102. *C. Desc.* *Statura* oblonga curc. *paraplectici*, at paullo minor; *totus* ater, obscurus, minime nitens. *Thorax* rotundatus, punctatus, carinatus. *Elytra* striato-punctata, striis per paria approximatis profundis. *Femora* acute dentata.
- Didymus. 103. *C. Desc.* *Parvus*. *Corpus* supra fuscum, subtus griseum. *Rostrum* elongatum, atrum. *Elytra* obscura, valde striata; macula transversa laterali alba e punctis tribus composita. *Femora* acute dentata.
- Trimaculatus. 104. *C. Desc.* *Caput* nigrum, immaculatum. *Thorax* supra fuscus, antice macula utrinque marginali cinerea lineaque dorsali brunnea. *Elytra* fusca; sutura baseos brunnea, puncto parvo albo, macula magna alba in medio marginis exterioris & altera lunata ad marginem.
- Litura. 105. *C. Desc.* *Statura* præcedentis. *Thorax* linea dorsali nigra, antice lineola; postice puncto, albis.
- Villosus. 106. *C. Desc.* *Magnitudo* præcedentium. *Rostrum* porrectum, cylindricum, atrum. *Thorax* griseus, linea longitudinali albicante. *Scutellum* album. *Elytra* grisea, postice fascia obliqua alba, quæ tamen marginem anteriorem haud attingit.

*Pedes* grisei , *femoribus* omnibus dentatis.

Ceraforum. 107. *C. Desc.* Statura curc. *nucum* , at triplo minor. *Rostrum* cylindricum , glabrum , atrum. *Thorax* fuscus , linea dorsali obsolete cinerea. *Scutellum* cinereum. *Elytra* striata , fasciis duabus repandis , cinereis , fere obsolete.

Tenuirof- 108. *C. Desc.* Statura præcedentis , at minor. *Caput* nigrum , rostro porrecto , tenui , glabro , atro. *Antennæ* rufæ , clava cinerea. *Thorax* niger , pilis brevissimis cinereis. *Scutellum* cinereum. *Elytra* nigra , fasciis plurimis undatis , pallidioribus.

Tæniatus. 109. *C. Desc.* Minor curc. *tortrice*. *Rostrum* nigrum , ore sanguineo. *Antennæ* testaceæ , clava nigra. *Thorax* lævis niger , margine antice posticeque rufo. *Elytra* subvillosa , substriata , pallida nigro maculata.

Danubia- 110. *C. Desc.* *Antennæ* fractæ. Color fuscus. *Rostrum* nigrum. *Elytra* cervina , punctis nigris irrorata , ad lentem excavatis punctis striata. *Tibiæ* *tarfique* testaceo colore.

Salicinus. 113. *C. Desc.* Niger. Per medium thoracem linea alba decurrit , per futuram elytrorum usque ad apicem continuanda. Hæc in medio cujusvis elytri ramum fere ad angulos rectos exferit , ut hinc infectum dorso crucem album gerere videatur , quæ in sole auri splendorem habet. *Femora* omnia dentata. *Elytra* striato-punctata. *Subtus* color griseus.

- Fraxini. 114. C. Desc. Inter minimos numerandus, griseus. *Caput rostrumque* obscure fusca. *Thorax* macula magna fusca, interdum in duas divisa. *Elytra* fasciis quatuor vel quinque similibus fasciis curc. *scrophulariæ*.  
*Larva* apoda, luteo-albida, capite nigro.
- Ulmi. 115. C. Desc. Rufo-brunneus. *Rostrum* nigrum. *Caput thoraxque* linea longitudinali albida. *Scutellum* album. *Elytra* maculis duabus, quarum anterior nigra; posterior transversalis albida. *Femora anteriora* incrassata.
- Geographi-116. C. Desc. Fusco-niger, squamulis albis cus: supra infraque tectus, quæ squamæ supra thoracem elytraque varias lineas formant. *Thorax* tribus lineis longitudinalibus tribusque aliis transversalibus. Variæ elytrorum lineæ secantur aliis duobus a scutello oblique descendentibus. *Pedes* nigri, albo variegati.
- Stellifer. 117. C. Desc. Fuscus. *Thorax* scaber. *Scutellum* puncto in medio flavo. *Elytra* decem punctorum striis longitudinalibus faciliisque tribus albidis.
- Hortula-118. C. Desc. Curc. *scrophulariæ* affinis; nus. sed griseus. *Elytra* striis elevatis punctis albis fuscisque variegatis, maculis duabus nigris ad futuram superne inferneque.
- Plebeius. 119. C. Desc. Nigro-fuscus. *Corpus* elongatum. *Elytra* striato-punctata.
- Scutella-120. C. Desc. Fuscus. *Thorax* scaber. *Scutellum* puncto albo. *Thorax* scaber.  
S ij

*Elytra punctato-striata, macula rubello-fusca in medio.*

Virgo. 121. *C. Desc.* Obscure fuscus, griseo-albidis pilis vestitus. *Oculi nigri. Elytra striata.*

Nubilus. 128. *C. Desc.* Corpus magnitudine & statura curc. *ligustici. Antennæ clavatæ, clava acuminata, nigræ. Caput & thorax grisea, immaculata. Elytra punctis striata punctisque plurimis vagis distinctis obscurioribus. Femora postica annulo albo.*

Nigrita. 129. *C. Desc.* Statura & magnitudine curc. *fulcati, at elytra immaculata.*

Sulcatus. 130. *C. Desc.* Major. *Totus ater. Elytra testaceo immaculata, crenato-striata.*

Gemmatus. 131. *C. Natur. fosc. sect. 6. t. 4.*

Picipes. 132. *C. Desc.* Major curc. *nebuloso. Antennæ fractæ, clavatæ, clava obtusiuscula. Rostrum crassum, breve, obtusum, apice nigrum. Thorax griseus, punctis elevatis globosis, minutissimis. Elytra nebulosa, punctis elevatis striata. Pedes itidem grisei, femoribus imprimis posticis rufis.*

Morio. 133. *C. Desc.* Magnus, *totus ater, glaber nitidus. Thorax rotundatus, immaculatus. Femora dentata.*

2-Sulcatus. 134. *C. Desc.* Statura curc. *fulcati. Rostrum breve, fulcis duobus dorsalibus impressis, apice incrassatum. Thorax supra niger, lateribus cinereis. Elytra obsolete striata nigra, margine antico &*



lateralis cinereis. *Pedes nigri, femoribus dentatis.*

Fullo. 135. *C. Desc.* Color niger. *Rostrum* valde breve, crassum. *Elytra* albo maculata uti *scarabæi fullonis*, etiam *thorax*, sed punctis minimis. *Abdomen* ovatum. *Pedes* fusci, *femora omnia* dentata.

Religiosus. 137. *C. Desc.* Magnitudo curc. *Germani*, cui etiam insectum habitu multum simile, sed magis atrum. *Rostrum* crassum. *Thorax* punctis prominentibus dense oblitus, uti & *elytra*. *Abdomen* fere globosum, quod magnam partem *elytra* etiam subtus tegunt, fortasse alas non recondentia. Hinc inde in *elytris* puncta nivea, quæ ope lentis conspecta, a pilis quibusdam minutissimis orta, reliquo insecto glaberrimo. *Pulvilli pedum* albi. *Femora* dentata.

Griseo- 138. *C. Desc.* Niger. *Antennæ* longæ fractæ, clava fusca. *Rostrum* latum. *Caput*, *thorax* *elytra*que scabra, tuberculis elevatis. *Abdomen* *elytris* crenatis fere obtectum.

Rugosissi- 142. *C. Desc.* Obscure fuscus. *Rostrum* latum, mus. crassum. *Thorax* scaber. *Elytra* coadunata, striis tecta rugosis.

Villosus. 144. *C. Desc.* Nigro-fuscus, pilis cinereis tectus. *Rostrum* crassum. *Thorax* oblongus. *Elytra* punctato-striata.

Splendidu- 159. *C. Desc.* Statura omnino curc. *argentati*, lus. at minor, & *femora* inermia. *Caput* cinereum, rostro apice subtestaceo. *Thorax* viridis nitens, dorso cinerascens, lineis

duabus atris. *Coleoptra* limbo viridi nitente, disco cinereo cupreo, fascia media angulata lituraque postica, nigris. *Corpus* viridi nitens. *Femora* inermia.

Lusitanicus. 160. *C. Desc.* Statura & magnitudo curc. incani. *Corpus* supra fuscum, subtus squamoso - aureum. *Elytra* macula oblonga baseos alba.

Raucus. 161. *C. Desc. Medius.* *Antennæ* medio fractæ, apice clavatæ. *Rostrum* breve, crassum, subplanum. *Thorax* nigricans, punctis elevatis parvis scaber. *Elytra* striata, striis crenatis, grisea, punctis plurimis cinereis sparsa. *Pedes* picei, *femoribus* muticis.

Griseus. 162. *C. Desc.* Statura curc. lineati, at paullo longior. *Rostrum* cylindricum, sulco longitudinali profundiore exaratum. *Supra totus* obscure griseus, subtus cinereus, immaculatus. *Femora* simplicia.

3-Guttatus. 163. *C. Desc.* Statura & magnitudo curc. tristis. *Rostrum* breve canaliculatum & *thorax* fuscus immaculatus. *Elytra* substriata grisea, puncto parvo albo in medio & macula majori communi versus apicem.

Coryli. 164. *C. Desc.* Affinis curc. cervino. *Rostrum* brevissimum, apice atrum. *Thorax* *elytraque* glabra, cinereo fuscoque varia; dimidia futuræ pars basi proxima atra, glabra.

Lunatus. 165. *C. Desc.* Parvus, statura curc. lineati. *Rostrum* breve, crassum, puncto frontis impresso. *Elytra* lineis tribus quatuorve

elevatis, acutis, quæ tamen apicem elytri haud attingunt, cinerea, fascia alba ab angulo humerali ad medium futuræ ducta, quæ in coleoptris semilunarem constituit. Postice macula magna communi alba, in cujus medio lunula communis nigra. *Pedes* cinerei, fusco fasciati.

Undatus. 166. *C. Desc.* Parvus, statura omnino curc. *lunati*.

Hispidulus. 167. *C. Desc.* Parvus, statura curc. *lineati*. *Antennæ* clavatæ, articulo primo longiori. *Thorax* punctatus fuscus, lineis tribus longitudinalibus cinereis, media tenuiore. Punctum utrinque laterale cinereum. *Elytra* fusca, pilis erectis hispida punctisque obscurioribus striata, interjectis pilis albis, qui quasi lineas et maculis nigris albisque constituunt. *Pedes* nigricantes.

Tristis. 168. *C. Desc.* Medius. Caput, thorax, abdomen & pedes obscure *nigra*. *Elytra* profunde striata, cinerea.

Punctatus. 169. *C. Desc.* Major ovatus. *Rostrum* brevissimum. *Thorax* gibbus, glaber. *Elytra* striato-punctata, at præterea punctis elevatis holoscericeis atris albisque conspersa.

Obscurus. 170. *C. Desc.* *Totus* obscure ferrugineus. *Elytra* lineis obsoletis elevatis.

Niger. 171. *C. Desc.* *Corpus* magnitudine & statura *tristis*, totum obscure nigrum, punctis parvis elevatis, scabrum. *Antennæ* nigræ. *Pedes* rufi, genibus plantisque nigris.

Variolosus. 172. *C. Desc.* Statura curc. punctati, totus niger. Thorax punctis majoribus passim confluentibus excavatus. Elytra connata, postice acuminata.

Latirostris. 173. *C. Desc.* Statura curc. albin. Corpus nigrum. Rostrum latissimum, planum, album, apice nigrum. Thorax niger, canaliculatus. Elytra nigra, striis interruptis glaucis, apice alba, punctis duobus nigris. Pedes nigri, albo annulati. Abdomen subtus album, lateribus nigris.

Vau. 174. *C. Desc.* Rostrum crassum. Insectum oblongum, cinereum. In singulo elytro infra medium macula albida, tum in medio macula oblonga obliqua cum altera alterius elytri signum arietis V f. litteram. V. constituens.

*Varietas.* Minor, magis fusca. Maculae albæ clariores & eæ, quæ infra medium, minores, rotundæ.

Affinis. 175. *C. Desc.* Totus niger, sed thorax lateribus & elytra per totum cinereo variegata. Rostrum sulcis duobus, striis f. carinis elevatis tribus, media in apice bifida. Thorax punctis elevatis confluentibus scaber. Elytra singula, decem ex punctis.

Maurus. 176. *C. Desc.* Rostrum breve crassum. Antennæ fractæ. Caput, rostrum, thorax punctis elevatis confita. Elytra, quæ magnam partem abdominis subtus tegunt, striata; striæ nudo oculo inspectæ adparent constare punctis excavatis, sed reipsa quasi quibusdam villis alternatim comparentibus nentur, eo



fere modo, quo vestium oræ a tartoribus suuntur. Color ater, minime nitens.

Austria- 177. *C. Desc.* Color totius fuscus, sed *thoracis & elytrorum* latera rubescunt. *Alæ* nullæ. *Totus* tomentosus. *Elytra* ex punctis impressis striata. *Rostrum* crassum.

Hinnulus. 178. *C. Desc.* Subfuscus oblongus. *Thorax* lateribus albidus. *Elytra* lucide fusca albo variegata, prorsus ut cervorum juniorum pellis. Latera elytrorum cinerea partem abdominis cinerei contingunt. *Alatus*.

Chrysopete- 179. *C. Desc.* Nomen ex vivo datum; at descriptio deinde ex mortuo, in quo aurum mutatur in ferrugineum colorem. Longus niger, obscure cinereo nebulosus. *Thorax* punctis excavatis cicatrisantibus. *Elytra* punctato - striata, hinc inde quasi pulvere ferrugineo adpersa; præsertim ad marginem interioriorem facile deciduo. *Abdominis* apex villo fulvo hirsutus.

Araneifor- 180. *C. Desc.* Magnitudo aranæ *rupestris*, totus ex rufo rubellus, cui in sole auri nitor accedit; valde refert araneam thorace brevi, rostro brevissimo ac vix ullo, abdomine globoso ovato. *Thorax* punctis excavatis inordinate adpersus, elytrorum partem abdominis etiam subtus amplectentium punctis in lineas decem longitudinales dispositis.

Linearis. 181. *C. Desc.* Color rufo-testaceo rufus. Magnitudine & habitu curc. *granarii*,



a quo præcipue differt thorace elytris notabiliter breviorè, *roſtro* brevi craſſo. *Thorax* excavato - punctatus. *Elytra* punctato - ſtriata. *Pedes* mutici.

Atro- 182. *C. Deſc.* Niger, nitidus, lævis. *Thorax* elongatus, fere cylindricus. *Elytra* coadunata, *abdomen* partim tegunt. *Femora* in medio incrassa.

Grifco- 183. *C. Deſc.* Supra rufo-brunneus. *Subtus* nigricans. *Oculi roſtrumque* apice nigra. *Thorax* rotundatus, convexus ſcaber. *Elytra* ſulcis elevatis. *Totum animal* ſquamis luteſcenti-grifeis marmoratum. *Elytra, antennæ, pedesque* ad lentem villoſa.

Flavipes. 184. *C. Deſc.* Parvus. *Corpus* oblongum. *Caput, thorax, elytra abdomenque* ſquamis aurato-viridibus obteſtum, ſub quibus inſectum nigrum eſt. *Antennæ pedesque* nudi, dilute lutei.

Capitatus. 185. *C. Deſc.* Niger, ſed ſquamulis cinereo-grifeis omnino teſtus, exceptis antennis pedibuſque fufcis. *Caput* thoracis latitudinem æquat. *Abdomen* breve, teres. *Elytra* lineis longitudinalibus concavo-punctatis.

Tereticol- 186. *C. Deſc.* Minor. *Antennæ pedesque* rufo-brunnei. *Corpus* nigrum æneo-cinereo grifeum, qui color e ſquamulis conſtat. *Thorax* fere cylindricus. *Elytra* concavo-punctata.

Piclus. 187. *C. Deſc.* *Corpus* ſupra nigricante-fufcum, ſubtus fulvum. *Thorax* lineis tribus longitudinalibus fulvis. *Elytra*

holosericea, striis novem punctatis, spatio inter strias interjecto punctato, alternatim nigro fuscoque maculato.

**Fasciatus. 188.** *C. Desc.* Supra cinereus. *Caput* nigrum. *Thorax* scaber, nigricans, lateraliter cinereus. *Elytra* nigricantia, fasciis duabus transversis griseis, una nebulosa ultra medium clytri, altera in parte postica.

**Fasciola- 189.** *C. Desc.* Albido-cinereus. *Rostrium* breve, carinatum, fulcis ad carinæ utrumque latus pilo ex ferrugineo rubente contactis. *Thorax* subfuscus, ad latus utrumque linea curva, albida, longitudinali; alia latior in medio in quinque minores subdivisa per lineas tres elevatas, quarum acies nuda. Hinc forte invenire licet individua recens exclusa, quæ mediam illam striam indivisam habent, eo quod pili linearum elevatarum detriti nondum sint. *Enum.*

**Spinifer. 190.** *C. Obs.* An curculio verrucosus. *Linn.?*

**Aurifer. 191.** *C. Desc.* Magnus. Niger nitidus. *Rostrium* latum. *Thorax* scaber. *Elytra* coadunata, apice acuminata, macula utrinque aurea lateraliter ab basin, margine exteriori aurato; tertia sæpe macula lineari aurata, oblique posita, ad partem posticam. *Abdomen* subtus squamis aureis tectum.

**S. 192.** *C. Desc.* Inter majores numerandus. Niger affinis curc. *bipunctato D. Geoff.* *Caput thoraxque* pilis flavicanti-griseis oblecta. *Thorax* linea flavescenti utrinque in parte antica. *Elytra*

coalita abdominis latera involventia.  
Sutura griseo fuscoque alternatim mar-  
morata. *Femora antica* incrassata.

Pulveru- 193. C. *Obs.* Nimium affinis curc. *pulverulenti*.  
lentus. n. 75. *Ent. carn.* sed *rostrum* breve.

\* *Longirostris femoribus simplicibus.*

2-Maculatus. C. ( le himaculé ) longirostris fuscus ;  
elytris puncto cinereo , rostro pedibus-  
que atris. *Mantiss. C.* 21.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura curc. *coloni* , at paullo  
minor. *Rostrum* incurvum , atrum , ni-  
tidum. *Thorax* fuscus , linea laterali  
cinerea. *Elytra* lævia , fusca , puncto  
distincto cinereo. *Pedes* nigri.

Abbreviatus. C. ( le retranché ) longirostris ater , tho-  
race plano punctato , elytris abbreviatis  
substriatis. *Mantiss. C.* 25.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura fere curc. *palmarum* , at qua-  
druplo minor. *Antennæ* fractæ , nigræ ,  
apice cinerascens. *Rostrum* cylin-  
dricum , incurvum , atrum , nitidum.  
*Thorax* planus , punctatus , linea media  
parum elevata. *Elytra* substriata abdo-  
mine breviora. *Corpus* atrum.

Cæruleoce- C. ( le cæruleo - céphale ) longirostris  
phalus. violaceus nitens , thorace elytris-  
que thorace testaceis. *Mantiss. C.* 33.

*Ad. hall.* 1. 282. curculio cæruleoce-  
phalus , longirostris atro - cæruleus ,  
elytris-que fulvis.

*Hab.* in Saxonizæ cratægo. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Caput* pu-  
bescentius , violaceum. *Thorax* & *elytra*

pubescentia , testacea , nitida. *Corpus* & *pedes* violacea. *Antennæ* extrorsum crassiores.

4-Tubercu- C. ( le quadrituberculé ) longirostris, tho-  
latus. race quadrituberculato nigro , elytris  
striatis cinereo variegatis. *Mantiss.* C. 39.  
*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.* In Gallia Aust. V.  
*Desc.* Parvus. *Rostrum* incurvum , atrum.  
*Corpus* cinereum. Thoracis dorsum ni-  
grum , tuberculis quatuor erectis , ele-  
vatis. *Elytra* striata fusco cinereoque  
varia. *Pedes* cinerei , *femoribus* *posticis*  
nigris.

Roboris. C. ( du roure ) longirostris , rostro tho-  
raceque rufis , elytris violaceis. *Mantiss.*  
C. 42.

*Hab.* in Saxoniz quercu. *D. Hybner.* In  
Gallia Aust. V.

*Desc.* Statura & magnitudo curc. *fusci-*  
*rostris.* *Caput* violaceum , rostro rufo.  
*Thorax* rotundatus , lævis , rufus , im-  
maculatus. *Elytra* vix striata , violacea ,  
nitida , immaculata.

Cuprirostris. C. ( le cuivreux ) longirostris oblongus  
viridi-æneus , elytris striatis , rostro  
cupreo. *Mantiss.* C. 43.

*Hab.* in betula Dresdæ. *D. Zschuck.*

*Desc.* *Corpus* parvum , oblongum. *Rostrum*  
arcuatum , cupreum. *Thorax* viridi-  
æneus , nitidus. *Elytra* striata , viridi-  
ænea , nitida. *Pedes* fusci.

Picrostris. C. ( le gluant ) longirostris oblongus  
niger , argento-holofericeus , rostro  
dimidiato pedibusque piceis. *Mantiss.*  
C. 47.

*Hab.* Hafniæ. *D. Lund,*

*Desc.* Affinis curc. *rufirostri*, at major & alius. *Caput* nigrum, rostro elongato ultra dimidium piceo. *Thorax* & *elytra* nigra, at villo argenteo holosericea. *Pedes* picei, geniculis nigris.

*Rana. C.* ( la grenouille ) longirostris, thorace fusco, limbo testaceo, elytris testaceis, fasciis tribus undatis cinereis. *Mantiss. C.* 52.

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc.* Parvus, gibbus. *Caput* fuscum; rostro apice testaceo. *Thorax* fuscus, margine omni testaceo. *Elytra* striata; testacea, fasciis tribus cinereis. *Corpus* cinereum. *Pedes* testacei.

*Erysimi. C.* ( de la tortelle ) longirostris niger, thorace bituberculato virescente, elytris cyaneis. *Mantiss. C.* 54.

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc.* Summa affinitas curc. *cyanei*, at magis gibbus. *Rostri* elongatum, incurvum, nigrum. *Thorax* obscure viridis, tuberculo utrinque elevato. *Elytra* striata, cyanea. *Pedes* nigri.

*Unifasciatus. C.* ( le fascié ) longirostris supra fuscus; fascia media cinerea. *Mantiss. C.* 59.

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc.* Medius. *Caput* fuscum, rostro elongato, arcuato atro. *Thorax* supra fuscus, subtus cinereus. *Elytra* substriata, fusca, fascia in media lata cinerea. Litura cinerea ad apicem. *Subtus* cinereus. *Pedes* nigri, femoribus albidis.

*Lythri. C.* ( de la salicaire ) longirostris ater, elytris fascia media abbreviata puncto-



que postico albis, pedibus flavis.  
*Mantiss. C. 61.*

*Hab. in lythri floribus Uplandiæ. D. Pay Kull.*

*Desc. Parvus. Caput & thorax atra nitida, immaculata. Elytra striata, nigra fascia media alba, quæ tamen marginem anteriorem haud attingit. Pone fasciam punctum parvum oblongum album. Pedes flavi, genubus nigris.*

*Quercus. C. ( du chêne ) longirostris cinereus, thoracis dorso fusco, elytris testaceis cinereo undatis. Mantiss. C. 67.*

*Linn. Syst. nat. curculio quercus an?*

*Hab. in Sueciæ quercu. D. Pay Kull.*

*Desc. Parvus. Corpus cinereum. Rostrum nigrum. Thoracis dorsum fuscum, linea media pallidiori. Elytra striata pallide testacea, fasciis. 4, 5 undatis cinereis. Pedes testacei.*

*Plantaginis. C. ( du plantain ) longirostris, elytris cinereis, macula media fusca. Mantiss. C. 72.*

*Deyur. inf. curculio plantaginis.*

*Hab. Halæ. D. Hybner.*

*Desc. Statura & omnino curc. rumicis. Rostrum nigrum. Thorax cinereus medio fuscus, linea dorsali cinerea. Elytra cinerea, macula magna media fusca, & præterea puncta aliquot ejusdem coloris.*

*Bardanæ. C. ( de la bardane ) longirostris cylindricus griseo tomentosus, pedibus anticis elongatis. Mantiss. C. 84.*

*Hab. in bardana Dresdæ. D. Romanus.*

*Desc. Statura & magnitudo curc. para-pleñici, junior totus tomento griseo*

tecus, adultior niger & glaber evadit;  
*elytra* rotundata, obtusa. *Pedes* ante-  
 riores parum elongati.

*Cæruleus*. C. ( le bleu ) *cæruleus* subvillosus;  
 antennarum basi pedibusque flavis.

*Hab.* in Europa. In Ulteriori Calabria:  
*Vincent. Petagn. t. f. 24.*

*Desc.* *Palpi* quatuor extrorsum crassiores;  
 articulo ultimo oblique truncato *an-*  
*tennæ*que setaceæ thorace longiores,  
 rostro crasso elongato plano insidentes  
 genus enunciant. *Corpus* totum cæru-  
 lescens supra subvillosum, subtus ni-  
 tens. *Elytra* tenuissime punctata, mar-  
 ginata. *Palpi* flavescentes, antennarum  
 basis, *femora* & *tibiæ* flavæ.

*Obs.* Si quis velit ad attelabi genus hoc  
 animal reducere & proprie ad *pubes-*  
*centem*, per me licebit; sed is ani-  
 madvertat palporum & antennarum  
 structuram, quæ excludit omnino ab  
 attelabis nostrum insectum. *Ibid.*

\*\* *Longirostris*, *saltatorii*, *femoribus* *posticis* *crassis*.

*Calcar*. C. ( l'épéronné ) *longirostris*, *femoribus*  
*saltatoriiis* unidentatis niger, *antennis*  
*plantisque* testaceis.

*Hab.* Kilicæ. D. Daldorf.

*Desc.* Parvus. *Corpus* nigrum. *Elytra* vix  
 striata. *Antennæ* plantæque testaceæ.  
*Femora* *postica* incrassata unidentata.

*Nicis*. C. ( du chêne-vert ) *longirostris*, *femo-*  
*ribus* *saltatoriiis*, nigricans, *elytris*  
 striatis cinereo variis. *Mantiss. C. 156.*

*Hab.* in Uplandicæ quercu. D. Pay Kull.

*Desc.* Parvus, statura *curc. viminalis*.  
*Corpus* nigrum. *Thorax* macula dorsali  
 triloba,

triloba , cinerea. *Elytra* cinereo varia.

Iota. C. ( Iota ) longirostris femoribus saltatoriis ater, elytris striatis, futura basi alba. *Mantiss. C.* 157.

*Hab.* in Uplandia. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Parvus. Totus ater, sola futura basi alba.

\*\*\* *Longirostres femoribus dentatis.*

Verbasci. C. ( du bouillon - blanc ) longirostris femoribus dentatis niger, thoracis lateribus flavescens, elytris punctis albis nigrisque alternis striatis. *Mantiss. C.* 121.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Statura & summa affinitas curculionum, cujus forte mera varietas. Caput nigrum, immaculatum. Thorax flavescens, linea dorsali sive potius dorso nigro. *Elytra* nigra, punctis elevatis holosericeis albis nigrisque alternis striata.

Guttula. C. ( le tuberculé ) longirostris femoribus dentatis, thorace tuberculato niger, elytris striatis puncto postico albo. *Mantiss. C.* 124.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Parvus. Rostrum porrectum, incurvum, nigrum. Thorax inæqualis linea dorsali impressa tuberculoque utrinque elevato, erecto. Margo anticus parum elevatus. *Elytra* vix striata, nigra, puncto apicis albo. Corpus subtile cinereum.

Troglodytes. C. ( le troglodyte ) longirostris femoribus dentatis fuscis, thorace linea dorsali

*Insect. Tomus IV.*

T

cinerea, elytris pedibusque testaceis.  
*Mantiff. C. 13.*

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc. Parvus. Caput fuscum, antennis subtestaceis. Thorax fuscus linea dorsali albida. Elytra striata, subtestacea, futura nigra. Pedes testacei.*

Fraxini. C. ( du frêne ) longirostris femoribus dentatis ferrugineis fuscus, capite dorsoque nigris. *Mantiff. C. 143.*

*Dey. inf. curculio fraxini.*

*Hab. in Sueciæ fraxino. D. Pay Kull.*

*Desc. Magnitudo curc. druparum. Caput nigrum, rostro incurvo. Thorax ferrugineo-fuscus, dorso nigro. Coleoptra subvillosa, ferrugineo-fusca, dorso nigro. Corpus ferrugineo fuscum.*

Tremulæ. C. ( du tremble ) longirostris femoribus dentatis nigricans, elytris striatis griseo irroratis. *Mantiff. C. 147.*

*Hab. in Sueciæ populo. D. Pay Kull.*

*Desc. Statura & magnitudo curc. tortricis. Rostrum porrectum, atrum. Thorax ater, lævis, nitidus, postice rubro nitens. Elytra crenato-striata, nigra, atomis plurimis griseis.*

4-Pustulatus. C. ( le quadripustulé ) longirostris femoribus dentatis niger, elytris maculis duabus ferrugineis. *Mantiff. C. 149.*

*Desc. Antennæ clavatæ, nigræ, clava apice alba.*

\*\*\*\* *Breviostres femoribus dentatis.*

Fusco-macu- C. ( le tacheté ) breviostres femoribus  
 latus. subdentatis ater, thorace elytrisque  
 lævibus fusco maculatis. *Mantiff. C. 272.*

*Hab. in Germania.*

*Desc.* Corpus magnum, læve, glabrum, atrum. Thorax maculis lateralibus, elytris numerosis fuscis. Pedes nigri, femoribus subdentatis.

\*\*\*\*\* *Brevirostres femoribus muticis.*

Fulvus. C. ( le fauve ) brevirostris fulvus, capituli basi pedibusque fuscis, rostro emarginato. *Mantiss. C. 177.*

*Hab. in Saxonia. D. Hybner.*

*Desc.* Parvus. Caput fulvum, basi fuscum. Rostrum breve, apice emarginatum. Thorax gibbus, lævis, fulvus, immaculatus. Elytra vix striata, obscuriora. Pedes fusci.

Palliatu. C. ( l'entouré ) brevirostris fuscus, thoracis elytrorumque margine cinereo. *Mantiss. C. 178.*

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc.* Statura omnino curc. viridis, at paullo minor. Corpus supra fuscum, subtus cinereum, quo colore & thoracis & elytrorum margo inficitur.

Tamarisci. C. ( du tamarisc ) brevirostris viriditens, elytris viridi-ferrugineo nigro cinereoque variis. *Mantiss. C. 181.*

*Hab. in Africæ tamarisco. D. Vahl.*

*Desc.* Statura omnino curc. splendiduli, at duplo fere major. Caput, thorax, corpus viridia, nitida. Elytra variegata, distincta imprimis maculis duabus marginalibus cinereis.

*Obs.* Nimis affinis curc. tamarisci, nostri *Mus.* forte regionis varietas. V.

Emarginatus. C. ( l'échancré ) brevirostris oblongus  
T ij



fuscus, coleoptrorum dorso cinereo, lineis duabus punctorum impressorum atrorum. *Mantiss. C.* 186.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura omnino curc. *nebulosi.*

*Rostrum* breve, crassiusculum, bifurcatum, fuscum. *Antennæ* apice cineræ.

*Thorax* fuscus, linea laterali albida.

*Elytra* punctis elevatis minutissimis substriata, fusca, interne cinerea, striga punctorum nigrorum. *Coleoptra* apice emarginata.

**Glaucus. C.** ( le verdâtre ) brevirostris rostro carinato thoraceque inæquali obscuris, elytris glaucis, puncto postice elevato. *Mantiss. C.* 188.

*Hab.* Kilix. *D. Daldorf.*

*Desc.* Magnitudo & statura curc. *albini.*

*Rostrum* breve, crassum, fuscum, supra ferrugineum, carina elevata acuta. *Antennæ* fuscæ, clava cinerea.

*Thorax* inæqualis, nigro cinereoque varius. *Elytra* lævia, glauca, puncto postico elevato, quasi fornicato, atro.

*Pedes*, uti & *corpus*, livida & immaculata.

**Albidus. C.** ( le blanchâtre ) brevirostris oblongus fuscus, elytris albidis, fascia media lituraque baseos apicisque fuscis. *Mantiss. C.* 189.

*Herbst.* 83. 75. *tab.* 24. *fig.* 31. curculio candidus.

*Hab.* in Germania.

*Desc.* Minor curc. *nebuloso.* *Caput* fuscum.

*Thorax* fuscus, antice utrinque litura albida nigro punctata. *Elytra* albida, litura baseos, fascia media, quæ interdum abbreviata lituraque apicis

fuscis. *Rostrum* carinatum. *Abdomen* albidum, lineis punctorum nigrorum elevatorum.

*Costatus*. C. ( le rayé ) brevirostris cinereis thorace nigro, lineis quatuor cinereis. *Mantiss.* C. 194.

*Hab.* in Gallia Australi. *Broussenet. Mus. D. Banks.*

*Desc.* Magnitudo curc. *incani*. *Antennæ* in medio fractæ basi ferrugineæ. *Rostrum* apice incrassatum, nigrum, dorso cinereo. *Thorax* rotundatus, niger, lineæ dorsali paullum elevata atra. *Elytra* pedesque cinerea.

*Geminatus*. C. ( les gémeaux ) brevirostris cinereus, thorace trilineato, elytris striis numerosis fuscis per paria approximatis. *Mantiss.* C. 203.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Medius fere globosus. *Antennæ* in medio fractæ, capitulo ferrugineo. *Rostrum* brevissimum, crassum, cinereum. *Thorax* rotundatus, cinereus, lineis tribus latis fuscis. *Elytra* globosa, cinerea, striis longitudinalibus fuscis per paria approximatis. *Pedes* cinerei.

*Fulvipes*. C. ( le fulvipede ) brevirostris tomentoso virescens, pedibus testaceis. *Mantiss.* C. 208.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura parva curc. *lineati*. *Rostrum* brevissimum, planum. *Corpus* pubescens, viride. *Abdomen* argenteo pubescens. *Antennæ* fractæ, fuscæ. *Pedes* testacei.

*Ruficollis*. C. ( le collier ) brevirostris testaceus

capite elytrisque striatis cinereo-fuscis.  
*Mantiss. C. 209.*

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Parvus. *Caput* fuscum, antennis fractis rufis, clava fusca. *Thorax* lævis, testaceus. *Elytra* striata, cinereo-fusca. *Corpus* testaceum.

**Albirostris.** *C.* ( le vieux ) brevirostris rostro latissimo plano elytrisque postice albis nigro variis. *Mantiss. C. 238.*

*Ad. Hall. 1. 287.* curculio albirostris brevirostris niger, rostro albo, elytris postice albis, punctis nigris contiguis. *Fycol. arch. 80. 66. tab. 24. fig. 26.* curculio albirostris.

*Hab.* Halæ in betula. *D. Hybner.*

*Desc.* *Curc. latirostris* duplo major. *Thorax* niger, immaculatus. *Elytra* nigra, apice alba, macula magna palmata nigra. *Pedes* nigri, tibiis tarsisque albo annulatis.

**Planirostris.** *C.* ( le difforme ) brevirostris rostro latissimo plano nigro æneus, rostro pedibusque testaceis. *Mantiss. C. 239.*

*Hab.* Kilix. *D. Daldorf.*

*Desc.* Parvus. *Rostrum* breve, latissimum, planum, testaceum. *Antennæ* fractæ, primo articulo longiori testaceo, reliquis brevibus, crassioribus, nigris. *Thorax & elytra* lævia, ænea, nitida, immaculata. *Pedes* simplices testacei.

**Fulvirostris.** *C.* ( le flavipede ) brevirostris nigro-æneus, rostro plano pedibusque flavescens. *Mantiss. app.*

*Hab.* in Scania. *D. Pay. Kull.*

*Desc.* Parvus. *Rostrum* planum depressum, flavescens. *Antennæ* extrorsum cras-

fiores, nigræ, basi flavescentes. *Thorax*,  
*elytra*, *corpus* æneo - nitidula. *Pedes*  
flavi.

*Obs.* An femora dentata, an mutica? V.

Triangularis. C. ( le triangulaire ) brevirostris obscurus  
flavicans, thoracis basi triangulari,  
elytris striato-punctatis.

*Hab.* in Europa. In Ulteriore Calabria.  
*Vincent. Petagn. specim. n. 71.*

*Desc.* E majoribus est, ovalis, color  
ferrugineo-cinereus flavo polline ad-  
sperfus; *subtus* pube cano-flavescente.  
*Rostrum* breve nigrum, linea unica  
elevata. *Thorax* punctis variolosis, in  
basi angulis tribus, medio loco scutelli.  
*Elytra* striato-punctata, punctis paten-  
tioribus striisque versus apicem per  
paria coeuntibus, maculis villosis-flavis  
undique adspersa. Inter nostra speci-  
mina varietas adnotanda in duobus,  
quorum color magis nigricans. *Rostrum*  
trifurcatum. *Dorsum* linea profunda lon-  
gitudinali excavatum. Anguli *thoracis*  
obtusiusculi. Omnium magnitudo & ha-  
bitus eadem.

#### *Attelabus.*

Mutillarius. 11. A. *Desc.* Statura & summa affinitas  
att. *formicarii*, at paullo major. *Corpus*  
nigrum, fronte hirsutic densa alba lata.  
*Thorax* niger vix pubescens. *Elytra*  
nigra, basi parum rufescentia fasciis-  
que tribus albis, quarum prima inter-  
rupta, tertia in ipso apice elytrorum.  
*Subtus* niger, abdomine rufo. *Clerus* I.

Ruficollis. 12. A. *Desc.* Statura att. *coryli*. *Caput*  
rufum, vertice late nigro. *Antennæ*  
T iv.



apice cinereæ. *Thorax* gibbus, rufus, immaculatus. *Elytra* cyanea, immaculata. *Abdomen* rufum, subtus nigrum, margine tamen rufo. *Pedes* rufi.

Pubescens. 13. A. Desc. *Antennæ* & *caput* hujus generis. *Corpus* totum violaceum hirtum, rostro solo nigro, magis quam in reliquis elongato.

2-Fasciatus. 14. A. Desc. Magnitudo att. *formicarii*. *Caput* & *thorax* virescenti-cærulea, pubescentia, immaculata. *Elytra* glabra nitida, cyanea, fasciis duabus coccineis, altera in medio, altera ante apicem. *Corpus* pubescens, viridicæneum. *Clerus* 7.

4-Maculatus. A. ( le quadrimaculé ) niger, thorace rubro, elytris punctis duobus albis. *Mantiff. Clerus* 7.

*Schul. ac. Hall.* 1. 288. attelabus 4-maculatus niger, elytris maculis duabus albis, thorace rubro.

*Hab. in* pinetis Hallensibus. D. Hybner.

Desc. Parvus. *Caput* atrum, antennis moniliformibus piceis. *Thorax* villosus, rufus. *Elytra* subvillosa nigra, punctis duobus albis. *Pedes* nigri.

Unifasciatus. A. ( le fascié ) nigra, elytris fascia alba basi rubris. *Mantiff. Clerus* 8.

*Sulz. hist. inf. tab.* 4. fig. 13. attelabus formicarius minor.

*Hab. in* Helvetiæ, Africæ onopordine. D. Vahl.

Desc. Similis præcedentibus, at fascia unica in medio elytrorum.

8-Punctatus. A. ( le 8-ponctué ) cyaneus, elytris



rufis, punctis quatuor nigris. *Mantiff. Clerus* 9.

*Hab. in Hispaniæ umbellatis. D. Vahl.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Corpus* totum cyaneum hirtum. *Elytra* rufa, punctis quatuor nigris 1, 2, 1. *Pedes* cyanei.

*Cerambyx.*

*Glycyrrhizæ.* 24. *C. Desc.* Triplo major cer. *fuliginatore*. *Caput* atrum, litura baseos albida. *Antennæ* breves, crassæ, nigræ, primo articulo ferrugineo apice nigro. *Thorax* utrinque spinosus, lineis tribus albis. *Elytra* nigra, lineis duabus lateralibus elevatis, carinatis, lævibus, fulcis inter has villosis albis. *Sutura* alba. *Pedes* ferruginei, apice nigri.

*Obs.* Variat sæpius ætate, thorace elytrorumque futura totis nigris, lanugine alba derasa.

*Carinatus.* 25. *C. Desc.* Statura & magnitudo cer. *fuliginatoris*. *Antennæ* breves, crassæ, nigræ. *Caput* & *thorax* punctata lineaque media impressa nigra. *Elytra* obtusa, picea, linea laterali elevata villosa albida. *Corpus* subtus villosus cinereum.

*Chrysogaster.* 26. *C. Desc.* Niger. *Thorax* utrinque spina armatus. *Pectus*, *abdomen* & nonnihil etiam *thorax* vellere aureo teguntur. *Elytra* attenuata, tomento subtilissimo tecta, ex atro in canum colorem inclinant.

*Elegans.* 27. *C. Desc.* Ater. *Antennæ*, *femora*, *abdomen* ex obscure testaceo rubent. *Thorax* utrinque spina armatus, *Elytra* ex læte

testaceo rubent, basi macula magna atra eam regionem omnem occupante & per marginem interiorem versus apicem decurrente, ac in ejus medio denuo magnam atram maculam utrinque elytro communem constituyente & postea iterum solam futuram, nec tamen ad apicem usque decurrente. Per media elytra fasciæ duæ flavæ, versus postica convexæ & denticulos emitentes.

*Fab.* Rhagium bifasciatum, elytris fuscis, fasciis duabus obliquis flavis.

*Geoff. inf. paris.* flencorus 1.

*Sulz. inf. t.* 5. f. 8.

**Sycophanta, 28.** *C. Desc.* Sp. cer. *inquisitori* plane habitu simillima; fors etiam incola & prior arborum abieti congenerum. Color prædominans ferrugineus est & hic *totus* ex concolori tomento ortus. *Oculi* punctaque *elytrorum* nigra. Puncta elytrorum tres constituunt præcipue fascias nigras, in quibus tomentum ferrugineum rarius est, quarum ea, quæ in medio est, latior, nigrior. Omnis nigredo ex corporis glabritie. Lineæ in singulo elytro elevatae duæ.

**Æthiops, 29.** *C. Desc.* *Caput* linea longitudinali media, depressa exaratum. *Abdomen* villosum, præsertim apice. *Elytra* abdomine breviora nonnihil.

**Timidus, 30.** *C. Desc.* *Facies* lepturæ. *Caput* antice elongatum, nitens, sub maxillis dente notatum, villosum. *Antennæ* breves. *Thorax* villosus. *Elytra* punctata, fordidâ, apice truncata. *Corpus* totum subtus rufo villo pubescens.

*Obs. Timidus* vocatus, cum a longe fugiat ab hoste, sub umbella sese recipiens.

Fulvus. 31. *C. Desc. Apteris punctatus. Elytra* subpellucida, obtusa, nitida, abdomine breviora.

*Variat*, abdominis elytrorumque basi nigra.

*Obs. Locus*, tempus, habitus cer. *fulvum* ab *æthiope* non differre demonstrant; inde hujus varietas videtur.

Scabricor- 32. *C. Desc. Antennæ* articulus primus  
nis. lin. 5 longus. *Thorax* marginatus, angulis posticis dentatis. *Elytra* lineis duabus elevatis, tuberculosis antice deletis, apice obtusa, thorace & capite pallidiora. *Pedes* antennis concolores.

Ovatus. 33. *C. Desc. Cer. hispido* paullo minor. *Antennæ* magnæ, basi minus fuscæ. *Elytra* striis longitudinalibus duabus elevatis, apice pilorum fasciculis.

Monilis. 34. *C. Desc. Antennarum* articuli nigro griseoque variegati. *Corpus* nigrum. *Thorax* longitudinaliter striis punctatis, e punctis pila grisea exsurgunt. *Elytra* eodem modo striata, fascia lata transversa nigro antice posticeque marginata. *Femora* brevia, lata basi grisea, apice nigra.

Fasciatus. 35. *C. Obs. An. cer. fuliginatois* species diversa?

Erythroce- 51. *C. Desc. Caput* rubrum. *Oculi antennæ-*  
phalus. que (non attenuatæ, sed filiformes)

nigro colore insignes. *Thorax* ruber ; villosus, basi apiceque nigris. *Elytra* nigra longitudinaliter punctata, non tamen striata. *Alæ* fuliginosæ. *Pedus* nigrum. *Abdomen* rubrum, subtrus ad basin macula magna nigra. *Pedes* rubri. *Fab. saperda* 13 *Mantiss.*

**Ferreus.** 52. *C. Desc.* *Pedus* scutellumque albida ex villo. *Elytra* inordinate punctata.

**Silphoides.** 54. *C. Desc.* *Cylindraceus*. *Thorax* inermis, ferri colore ; ad regionem scutelli macula exigua alba, tam viciniam thoracis, quam elytrorum occupans, ex villis albis orta. *Elytra* punctata, punctis in lineas longitudinales dispositis, non tamen punctato lineata, lineis subternis in singulo elytro elevatiusculis. *Abdomen*, certo situ luminis respectu, canescit. *Femora antica* usque ad apicem e medio & *tibiæ* ultra medium fulvo colore gaudent.

**Tremulus.** 55. *C. Desc.* *Statura* cer. *populei*, cui valde affinis. *Antennæ* mediocres, longitudine corporis.  
*Schæff. icon.* t. 101. f. 1.

**Ferrugineus.** 56. *C. Desc.* Delenda hæc species ; nam *cerambyx cantharinus* *Linn.*

**Testaceus.** 57. *C. Desc.* *Antennæ* longitudine corporis nigrae. *Corpus* totum nigrum, *clytris* solis testaceis.

**Violaceus.** 58. *C. Desc.* *Statura* & magnitudo cer. *cylindrici*. *Antennæ* nigrae, corpore vix longiores. *Thorax* rotundatus, sub-

pubescens. *Elytra* lævissima , rugosa.  
*Pedes* nigri.

Lincola. 59. *C. Desc.* Parvus. *Corpus* cylindricum ,  
 nigrum. *Antennæ* longitudine corporis.  
 Linea rubra in dorso thoracis. *Femora*  
*omnia* apice , uti & *tibiæ anticae* , rubra.

Minutus. 60. *C. Desc.* Parvus , *totus* fuscus imma-  
 culatus. *Femora omnia* clavata.

Lineatus. 61. *C. Medius.* *Antennæ* longitudine cor-  
 poris nigræ , articulis basi cinereis.  
*Caput* & *thorax* rotundatus inermis ,  
 ferruginea nigro lineata. *Elytra* punc-  
 tata , fuscoque varia , macula magna  
 cinerea in medio marginis exterioris.  
*Pedes* fusci.

*Obs.* *Leptura figurata* n. 34.

Villoso- 64. *C. Desc.* *Corpus* elongatum. *Antennæ*  
 viridescens. corpore longiores , nigro cinereoque  
 variegatæ. *Thorax* cylindricus , lineis  
 tribus longitudinalibus luteis. *Scutellum*  
 luteum. *Elytra* viridescenti - luteo  
 punctulata.

Pygmæus. 65. *C. Desc.* Magnitudine pulicis , supra  
 fuscus , subtus nigricans. *Antennæ* den-  
 ticulatæ , villosæ. *Thorax* lævis. *Elytra*  
 æqualia , apice rotundata.

Barbipes. 83. *Desc.* *Antennæ* in mare corpore lon-  
 giores , in foemina mediocres. *Totus*  
 niger tomentosus. *Thorax* globoso-  
 depressus niger , sed rufo villo *totus*  
 hirsutus , adparet rufus. *Elytra* fulvo-  
 testacea , nonnihil nitida , ad lentem  
 hirsuta. *Antennarum* articulus primus  
 crassus longior ; secundus , tertius ,



quartus, breves, simul sumti longitudine primi; hi omnes nigri; quintus iterum longus fusco-ferrugineus. *Reliqui* in unico, quod restat specimine deficient. *Subtus* totus niger villosulus. *Femora* secundi & ultimi paris barbata, barba rufa; unde nomen.

Ruficollis. 84. *C. Desc.* Differt manifeste a cer. *fennico*. *Corpus* minus. *Caput* nigrum, *antennis* mediocribus piceis. *Thorax* fere cylindricus, subspinosus, hirtus, rufus. *Elytra* violacea. *Pedes* nigri, *femoribus* subclavatis.

Clavipes. 85. *C. Desc.* Magnitudo cer. *bajuli*, totus niger, opacus. *Antennæ* corpore longiores. *Femora* omnia valde clavata.

Ruficus. 86. *C. Desc.* Statura cer. *bajuli*, at triplo minor. *Caput* nigrum, immaculatum, *antennis* longitudine fere corporis. *Thorax* niger verrucosus. *Elytra* lævia, testacea, macula media apiceque nigris. *Pedes* nigri, mutici.

Aulicus. 87. *C. Desc.* Valde affinis cer. *striati*, at *thorax* nitidus & *elytra* haud striata.

Hafnienfis. 88. *C. Desc.* Statura cer. *striati*. *Elytra* nigra, albedine irrorata.

Rufipes. 89. *C. Desc.* *Corpus* parvum. *Antennæ* breves, fuscae, basi ferrugineae. *Caput* & *thorax* lævia, nitida, violacea. *Abdomen* æneum, nitidum. *Pedes* violacei, *tibiis* rufis. *Femora* postica clavata, basi ferruginea.

Floralis. 90. *C. Desc.* *Caput* nigrum, *antennis*

ferrugineis. *Thorax* globosus niger, fasciis duabus albis. *Elytra* nigra, fasciis quinque, prima baseos, quinta apicis. *Pedes* rufi.

Trifasciatus. 91. C. Desc. Statura omnino L. *verbasci*. *Caput* atrum, *antennis* rufis. *Thorax* globosus, ferrugineus, tomento cinereo tectus. *Elytra* atra, fasciis tribus albis, prima annulari. *Abdomen* subtus annulis albis.

Obs. Inter lepturas ordinanda hæc species quæ Galliæ Aust. incola. V.

Nigricornis. 92. C. Desc. Statura omnino cer. *cardui*, at paullo minor. *Antennæ* mediocres, totæ nigræ. *Thorax* rotundatus, niger, lineis tribus pallidis, lateralibus abbreviatis. *Elytra* lævia, fusca, unicoloria. *Corpus* cinerescens. *Spec. app.*

Virefcens. 93. C. Desc. *Antennæ* longitudine corporis, fuscae. *Caput* & *thorax* rotundata, obscure cinerea, villosa. *Elytra* apice attenuata, viridia. *Pedes* cinerei.

\*\*\* *Thorace rotundato, spinis fixis lateralibus mucronato.*

Varius. C. ( le varié ) thorace spinoso tuberculatoque, corpore nigro cinereoque variegato, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Mantiff. Cer. 2.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Zschuck.*

Desc. Minor cer. *ædili*. *Antennæ* corpore parum longiores cinereo nigroque annulatæ. *Caput* fuscum. *Thorax* spinosus dorsoque trituberculato. *Elytra* rotundata, cinereo nigroque varia. *Corpus* subtus nigrum. *Femora omnia clavata,*

nigricantia. *Tibiæ* atræ, cinereo annulataæ. *Tarsi* cinerei.

Heres. C. ( l'analogue ) thorace spinoso rugoso niger, elytris apice subspinosis testaceis, antennis longis. *Mantiss. Cer.* 22. *Schaff. icon. tab.* 24. *fig.* 3.

*Hab.* in Europæ quercu.

*Desc.* Affinis cer. *cerdo*, attamen distincta species videtur.

Fasciculatus. C. ( le fasciculé ) thorax spinoso, elytris integris punctis tribus hispidis, antennis mediocribus hirtis. *Mantiss. Cer.* 37.

*Hab.* in Germania. *D. Schneider.*

*Desc.* Medius quasi inter cer. *nebulosum* & *hispidum*. *Antennæ* mediocres, hirtæ, fuscæ. *Caput* & *thorax* fusca. *Elytra* fusca, punctis tribus hispidis, basi pallidiora uti in cer. *hispidum*, at apice omnino integra. *Pedes* grisei.

Pilosus. C. ( le velu ) thorace bispinoso, elytris griseis apice unidentatis, antennis mediocribus hirtis. *Mantiss. Cer.* 39.

*Hab.* Halæ. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura omnino cer. *hispidi*, at distinctus. Minor. *Antennæ* longitudine corporis, hirtæ. *Thorax* utrinque bispinosus, griseus. *Elytra* punctis tribus elevatis, hispidis, grisea, basi parum pallidiora, apice unidentata.

Sartor. C. ( le ravaudeur ) thorace spinoso, niger, scutello flavo, elytris immaculatis, antennis longissimis. *Mantiss. Lamia* 18.

*Hab.* Dresdæ in æsculo hippocastano. *Mus. D. Zschuck.*

*Desc.* Affinis cer. *futoris*, cujus forte  
mera

mera varietas major. *Frons* inter antennas valde canaliculata. *Antennæ* longissimæ. *Scutellum* flavum.

**Funestus. C.** ( le funeste ) thorace spinoso fuscus ,  
elytris lævibus , maculis duabus atris ,  
antennis brevibus. *Mantiff. Lamia.* 38.  
*Hab.* frequens in Galliæ sambuco. *D.*  
*Broussenet.*

*Desc.* Nimis affinis cer. *tristi* , at duplo  
minor. *Elytra* haud scabra , sed  
quasi holosericea. *Antennæ* multo  
breviores.

**Cruciatus. C.** ( le porte - croix ) thorace spinoso  
niger , coleoptris cruce media alba.  
*Mantiff. Lamia.* 43.

*Pall. icon. tab. F. fig. 5.* cerambyx cruciatus.

*Hab.* in Russia Australiori. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino cer. *fuliginatoris* ,  
at paullo major. *Antennæ* breves ,  
nigræ. *Caput* nigrum. *Thorax* acute  
spinofus , niger , linea dorsali alba.  
*Coleoptra* nigra , sutura lata fasciaeque  
media abbreviata albis. *Pedes* nigri.

**Cinerarius. C.** ( le cendré ) thorace spinoso cinerascens ,  
antennis brevibus. *Mantiff. Lamia* 45.

*Pall. icon. tab. F. fig. 11.*

*Hab.* in Russia Meridionali. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & summa affinitas cer. *fuliginatori* ,  
at duplo fere minor & totum  
corpus cinerascens.

**Morio. C.** ( le morio ) thorace spinoso niger ,  
elytris unicoloribus , antennis brevibus.  
*Mantiff. Lamia* 54.

*Scop. ent. carn.* 169. cerambyx Æthiops.

*Insect. Tomus IV.*

V.

*Hab. in Germania Australiori. Mus. D. Zschuck.*

*Desc.* Nimis cer. *pedestri*, affinis, at paullo major & *elytra* unicoloria, mox nigra, mox testacea. *Antennæ* breves, nigrae, articulo primo interdum testaceo. *Pedes* mox nigri, mox testacei.

**Lineatus. C.** ( le porte - ligne ) thorace spinoso ater, *elytris* marginalibus lineisque duabus utrinque coeuntibus albis. *Mantiss. Lamia* 55.

*Herbst. arch. inf.*

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino cer. *pedestris*. *Caput* & *thorax* atra, linea dorsali alba. *Elytra* atra, margine futura lineisque duabus antice posticeque coeuntibus albis. *Pedes* nigri.

**Mordax. C.** ( le méchant ) thorace spinoso griseus, *elytris* nebulosis testaceo subfasciatis. *Mantiss. Rhagium* 2.

*Schæff. icon. tab. 8. fig. 2.*

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc.* Nimis affinis cer. *inquisitori*, at paullo major & *corpus* haud nigrum, sed griseo villosum.

**Indagator. C.** ( le curieux ) thorace spinoso cinereus, *elytris* striatis, atomis fasciisque duabus nigris. *Mantiss. Rhagium* 3.

*Hab. in Germania. D. Schulz.*

*Desc.* *Antennæ* nigrae in medio piceae. *Caput* planum, cinereo villosum. *Thorax* spinosus, cinereo villosus. *Elytra* cinerea, atomis fasciisque duabus nigris. *Pedes* nigri.

**Cinctus. C.** ( le mandarin ) thorace spinoso niger,



elytris subferrugineis, fascia flava, femoribus posticis unidentatis. *Mantiss. Rhagium* 5.

*Hab. in Austria. D. Saldoner.*

*Desc.* Magnitudo & statura cer. *cursoris*. *Antennæ* longitudine fere corporis, ferrugineæ, apice compressæ. *Caput* nigricans. *Thorax* inæqualis, spinosus, nigricans, lobo antico distincto. *Scutellum* pube flavescente. *Corpus* subtus pube aurea. *Pedes* ferruginei, femoribus quatuor posticis ante apicem intus unidentatis.

**Minutus. C.** ( le Pygmée ) thorace spinoso, elytris clavato striatis cinereis nigro undatis. *Mantiss. Rhagium* 9.

*Hab. Kilix.*

*Desc.* *Corpus* cer. *inquisitori*, triplo minor.

**Cærulescens. C.** ( le bleuâtre ) thorace mutico cylindrico albo - cæruleus, lineis tribus thoracis scutelloque pallidioribus.

*Scop. n.* 160.

*Vincent. Petagn. inf. specim. t. f.* 18.

*Fuesly arch. entom. t.* 26. *f.* 5.

*Hab. in Austria, in Ulteritri Calabria.*

*Desc.* *Totus* tomentosus hirsutulus, albo-cæruleus seu coloris gallice *couleur d'eau*, sed minus saturate, fronte, lineis in dorso thoracis tribus scutelloque pallidioribus. *Elytra* lineis longitudinalibus punctorum, diffitorum tamen, nec magnorum.

\*\*\*\* *Thorace inermi subcylindrico.*

**Ferrugineus. C.** ( le rouillé ) hic est cerambyx cantharinus. *Syst.*

**Ruficollis. C.** ( le collier ) thorace cylindrico subspinoso niger , antennis thoraceque ferrugineis , elytris cyaneis. *Mantiff. Saperda*. 36.

*Hab.* Monspelix. *D.* Brouffenet.

*Desc.* Major L. *præusta*. *Antennæ* longitudine corporis , ferrugineæ , primo articulo crassiori , nigro. *Corpus* nigrum. *Thorax* ferrugineus , utrinque dente obsoleto. *Elytra* cyanea. *Pedes* atri.

\*\*\*\*\* *Thorace inermi subrotundo seu ex globoso depresso.*

**Agrestis. C.** ( l'agreste ) thorace nudo niger. Elytris striatis fuscis , antennis brevibus. *Mant. Callidium* 16.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Statura omnino cer. *rustici* , at duplo minor , & *elytra* striata , fusca.

**Fuscus. C.** ( le brun ) thorace subtuberculato canaliculato nudo niger , elytris striatis obscure testaceis , antennis mediocribus. *Mantiff. Callidium* 30.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Statura & magnitudo omnino cer. *luridi*. *Antennæ* breves , fuscae. *Corpus* & *thorax* nigra , immaculata. *Elytra* striata obscure testacea. *Pedes* nigri , *femoribus* brevibus , crassis , compressis.

**Tristis. C.** ( le sombre ) thorace subtuberculato nudo , elytris substriatis , corpore lurido immaculato. *Mantiff. Callidium* 31.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Statura & summa affinitas cer. *rustici* , at triplo minor , & *elytra* magis striata,

Salicis. C. ( du saule ) thorace tuberculato spinosoque rufus, pectore elytrisque nigris. *Mantiss. Callidium* 38.

*Herbest. arch. stenocorus ruficollis.*

*Hab. in Lipsiæ salicibus. D. Zschuck.*

*Desc. Antennæ breves, rufæ. Thorax rufus, tuberculis duobus dorsalibus spinæ utrinque acuta. Elytra vix striata nigra. Pectus nigrum. Abdomen pedesque rufa.*

Pusillus. C. ( le délicat ) thorace rotundato niger, antennis tibiisque testaceis. *Mantiss. Callidium* 39.

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc. Corpus parvum, nigrum. Antennæ corpore longiores, testaceæ. Thorax rotundatus, muticus. Femora clavata nigra, tibiis testaceis.*

Gibbosus. C. ( le bossu ) thorace rotundato niger, elytris cinereo fasciatis, basi bituberculatis, apice acuminatis. *Mantiss. Callidium* 64.

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc. Statura & magnitudo cer. mystici. Antennæ longitudine corporis, subferrugineæ. Caput & thorax nigra, obscura, immaculata. Elytra fascia lata ante medium apiceque cinereis. Tubercula duo baseos elevata, compressa & apice margo exterior excurrit in spinam validam.*

### *Leptura.*

Ferruginea. 29. L. *Desc.* delenda est hæc leptura. Oculi enim lunares sunt, nec a cer. scabricorne differt.

Variegata. 31. L. Desc. Nigra. *Caput* maculis duabus oblongis inter antennis. *Thorax* maculis plurimis transversalibus. *Elytra* maculis inæqualibus, omnibus luteo villosis. *Pedes* nigri.

Villosa. 32. L. Desc. Nigra, sed e pilis flavis, flava adparet. *Antennæ* nigricantes. *Oculi* nigri. *Elytra* quatuor maculis nigris lævibus. *Corpus* subtus nigrum. *Pedes* nigri.

Punctata. 33. L. Desc. *Caput* obscure rubrum, puncto nigro inter antennis, tribusque aliis postice. *Thorax* supra capite concolor, septem punctis nigris. *Elytra* nigricantia, punctulata. *Pedes* rufi, articulis nigris.

Figurata. 34. L. Obs. A leptura *rustica* Linn. differre videtur, uti D. Schrank optime animadvertit.

*Scop. carn. n. 176.*

*Beyt. Zur. Nat. p. 67.*

*Enum. n. 306.*

Desc. Nigra. *Caput* nigrum. *Thorax* niger, postice albo vix conspicuo marginatus. *Scutellum* album, lineis duabus albis divergentibus in elytra descendentibus; sed non ultra medium, tunc punctum album, macula alba oblonga, strigaeque alba transversalis arcuata cujus apex per futuram ascendit. *Elytra* apice albo maculata. *Corpus* subtus nigrum, maculis duabus albis utrinque ad pectus, tribusque lineis albis in incisuris. *Femora antica* in medio incrassata.

Cyanea. 35. L. Desc. Cærulea. *Antennæ* basi fulvæ, apice nigricantes. *Thorax* elytraque

scabra. *Femora* crassa cærulea. *Tibiæ* *tarsique* fulvi.

Atra. 39. L. *Pod. gr. p.* 28.

*Desc.* Tota nigra sericea.

Maculicor- 44. L. *Desc.* Nigra. *Antennæ* nigrae, fulvo-  
nis. luteo variegatae. *Elytra* testacea, apice  
truncato nigro. *Pedes* nigri.

Nigripes. 45. L. *Desc.* Nigra. *Elytra* obscure tes-  
tacea.

Tabacifor- 46. L. *Desc.* Minor. *Palpi labiaque* lutea.  
mis. *Antennæ*, *caput thoraxque* nigra.  
*Elytra* lutescenti-fusca, punctulata,  
nigro marginata. *Femora tibiæque* au-  
rantia. *Tarsi* fusci.

2-Punctata. 47. L. *Desc.* Differt a lept. *melanura*, quam-  
vis valde affinis. *Corpus* majus nigrum,  
tomento cinereo villosus. *Elytra* li-  
vida, rarius testacea, futura, puncto  
medio apiceque nigris. *Elytra* apice  
rotundata, nec emarginata.

Villica. 48. L. *Desc.* lept. *melanurae*, paullo major.  
*Antennæ* nigrae, articulo primo rufo.  
*Caput* rufum, *oculis* nigris. *Thorax*  
rufus, angulis posticis acutis, subspini-  
osis. *Abdomen & pedes* ferruginea.

Scutellata. 49. L. *Desc.* Major lept. *atra*. *Corpus* ni-  
grum, *scutello* albo. *Elytra* apice emar-  
ginata. *Abdomen* serico albo nitet.

Ruficornis. 50. L. *Desc.* Minuta. *Corpus* totum nigrum,  
pube flavescente sericeum. *Antennæ*  
rufæ. *Pedes* rufi, *femoribus posticis*  
apice nigris.



*Obs.* Variat femoribus omnibus apice nigris.

**Marginata.** 51. *L. Desc.* Statura lept. *nigræ*. Corpus totum nigrum, obscurum, exceptis margine *clytrorum tibiisque posticis* rufis.

**12-Macu- 52. L. Desc.** Statura lept. *6-maculata*, at  
lata. paullo major. Corpus totum nigrum, immaculatum. *Elytra* lævia, glabra, flava, maculis sex nigris: 1a. ad scutellum; 2a. ad marginem exterio-rem; 3a. ad marginem interiorem; 4a. ad marginem exteriorem; 5a. in medio; 6a. ad apicem. *Pedes* nigri.

**Dubia.** 53. *L. Desc.* Nimis affinis videtur lept. *attenuata*. Corpus totum nigrum, tomento fulvo nitidulum. *Elytra* glabra testacea, antice punctis tribus parvis, intermedio anteriore, in medio puncto majusculo & versus apicem altero paullo minori. *Pedes* nigri.

**6-Guttata.** 54. *L. Desc.* Corpus statura lept. *attenuata*, totum nigrum, *elytris* solis maculis tribus flavis, quarum anterior baseos ad futuram; reliquæ duæ in medio.

**Cerambyci- 55. L. Desc.** *Thorax* antice angustior, formis. lana flava rara tectus. *Elytra* cereæ recentis colore, fasciis tribus nigris, prima ex maculis in singulo elytro quatuor, quarum intermediæ duæ coactæ & minores. Fascia secunda latior, nec ad marginem interiorem pertingens; tertia apicem occupat.

**Consimilis.** 56. *L. Desc.* Nigro-aurea, subtus obscurior.

*Antennæ* fusco-testaceæ. *Elytra* non lacunosa, striis singula decem punctis exarata. *Pedes* rubro-testacei, *femoribus* posticis dentatis.

Affimilis. 57. L. Desc. Nigra. *Elytra* singula striis novem punctata. *Pedes* testacei. *Femora* postica dentata.

Chrysomeloides. 58. L. Desc. Nigra. *Thorax* antice angustior. *Elytra* punctis excavatis sparsis, castanea, utroque margine nigro. *Pedes* castanei.

Bifasciata. 59. L. ( la bifasciée ) Desc. *Tota* nigra subulata. *Elytra* rubra, sutura fasciisque duabus nigris, quarum una in apice, altera post medium versus apicem. *Abdomen* rubrum, apice nigro. *Alæ* fuliginosæ.

Thalassina. 60. L. Desc. Chrysomelis affinis. *Thorax* globosus ruber. *Elytra* minime attenuata, nec apice truncata, sed obtusa, nitide cærulea, manifeste sed irregulariter punctata. *Caput*, *antennæ*, *pedes* *pectus*que nigra. *Abdomen* rubrum.

Oo. 61. L. Desc. Nigra, sed *thorax*, & multo magis *elytra*, punctis minutissimis canis confita. In medio cujusvis elytri punctum majusculum canum & in cujusvis elytri apice ellipsis cana oblonga.

Spinosæ. 62. L. Desc. Nigra. *Antennarum* bases, articulus primus totus & secundus dimidius testudineo-rubri, uti & *pedes*, sed *plantæ* & *femorum*, quæ clavata, clavæ nigri coloris sunt. *Thorax* postice angustior, ipse, uti & *elytra*, punctis

crebris, minutis, sparsis, excavatis.  
Color thoracis elytrorumque profunde  
cyaneus.

Unipunctata. L. ( l'étoilée ) nigra, elytris rufis, puncto  
medio nigro.

*Hab.* Dresdæ. *D. Romanus.*

*Desc.* Elytra sola rufa, puncto unico in  
medio. *Antennæ & pedes nigri.*

Hastata. L. ( la belle ) atra, elytris rubris, apice  
futuraque media rubris.

*Sulz. inf. t. 5. f. 11. leptura hastata.*

*Geoff. inf. paris. tom. 1. p. 226. 6. ste-  
nocorus niger, elytris rufescentibus,  
apice futuræque medietate nigris.*

*Hab. in Europa Australiori.*

*Desc.* Affinis lept. *melanuræ*, at *elytra*  
in omnibus rubra & futura a medio  
ad apicem nigra, versus apicem  
tamen color niger angustatus. *Abdo-  
minis* segmenta margine villis argenteis  
splendent.

*Obs.* *Mas* minor, *abdomine* magis ru-  
fescente.

Picipes. L. ( la gluante ) thorace globoso, elytris  
striga obliqua alba.

*Hab. in Europa. Mus. D. Hunter. In  
Gallia Aust. V.*

*Desc.* *Corpus* lept. *alni*, paullo majus.  
*Antennæ* longitudine corporis picei.  
*Thorax* globosus, ater immaculatus.  
*Elytra* lævia, atra, in medio striga  
abbreviata, obliqua, alba. *Pedes* picei,  
*femoribus* clavatis, nigris.

Pubescens. L. ( la cotonneuse ) nigra, cinereo vil-  
losa, costa alarum basi testacea.

*Hab. in Suecia. D. Pay Kull.*

*Desc.* Affinis lept. *testaceæ*. *Corpus* totum nigrum, cinereo villosum, sola costa alarum basi testacea.

**Humeralis.** L. ( la militaire ) nigra, humeris abdomineque ferrugineis.

*Hab.* in Germania. *D. Schneider.* In Bressia. V.

*Desc.* Statura omnino lept. 4-punctatæ, at duplo fere major. *Elytrorum* basis exterior sive humeri abdomenque ferruginea.

**Suturalis.** L. ( la suturale ) cinerea, elytris testaceis, futura nigra.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Lept. *atra*, paullo major. *Antennæ* testaceæ, apice nigræ. *Caput*, *thorax*, *abdomen* cinereo villosa. *Elytra* lævia, testacea, futura sola atra. *Pedes* rufi, geniculis nigris.

**Femorata.** L. ( la pudique ) nigricans, femoribus basi rufis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & magnitudo lept. *nigræ*. *Caput*, *thorax*, *elytra*, *corpus* nigricantia. *Pedes* nigri, femoribus basi rufis. *Tibiæ anticae* etiam rufæ.

*Obs.* Variat pedibus omnibus nigris, femorum annulo tantum rufo.

**Præusta.** L. ( la brûlée ) aureo-pubescens, capite elytrorumque apicibus nigris.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Paullo minor lept. *nigra*. *Caput* nigrum, *antennarum* primo articulo ferrugineo. *Thorax*, *elytra*, *pectus*, *abdomen* tomento aureo tecta. *Elytra* apice nigra. *Pedes* rubri.

4-Guttata. L. ( la quadripunctuée ) fusca , elytris nigris , punctis duobus baseos ferrugineis.

*Desc.* Magnitudo & statura lept. *nigra*. *Corpus* fuscum. *Thorax* cinereo pubescens. *Elytra* nigra , punctis duobus baseos ferrugineis. *Femora* basi ferruginea.

*Armata*. L. ( l'armée ) thorace ovato , margine postico scutelloque flavo , elytris fastigiatis , antennis brevibus.

*Hab.* in Europa. In Ulteriori Calabria. *Vincent. Petagn. t. fig. xxxvi.*

*Desc.* Tota nigra. *Thorax* ovatus postice latior , punctis elevatis. *Elytra* fastigiata , basi excavato-punctata. *Antennæ* articulis extrorsum dentatis , corpore breviores. *Anus* acuminatus aculeum mentiens. *Thorax* pone & *scutellum* flava. *Pedes antici* pube flava. Forte stencori nova species ? Conf. leptura *scutellata* Fab. spec. n. 10.

*Obs.* Ad lepturas hoc insectum retuli , licet in specimine D. *Vincent. Petagn.* sub nomine rhagii *nigri* ordinatum fuerit. Mas foeminae similis. *Elytra* tota concavo - punctata. *Scutellum* albicans , non flavum , nec *thorax* postice flavo marginatus. Species nova non videtur. V.

### *Necydalis.*

Ruficollis. 15. N. *Desc.* Statura & magnitudo omnino N. *caerulefcentis*. *Caput* viride , nitidum , *antennis* nigris. *Thorax* terebrinisculus , rufus , nitidus , immaculatus. *Elytra* viridia. *Abdomen* rufum. *Pedes* nigri.



*Sanguinicollis*. N. ( le collier rouge ) thorace teretiusculo rufo , corpore fusco.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Magnitudo & statura N. *cærulescentis*. *Caput* , cum antennis, fuscum. *Thorax* punctis duobus impressis, teretiusculus, rufus. *Elytra* lineis elevatis tribus striata, fusca. *Corpus* fuscum, sive obscure nigrum.

*Ustulata*. N. ( la brûlée ) nigra, elytris basi futuraque lata testaceis.

*Herbst. arch.* necydalis ustulata.

*Hab.* in Germaniæ plantis.

*Desc.* Statura omnino N. *humeralis*.

*Melanura*. N. ( la mélanure ) nigra, thorace elytrisque testaceis, his apice nigris.

*Hab.* in Hispaniæ plantis. *D. Vahl.*

*Desc.* Statura & magnitudo N. *ruficollis*:

*Caput* , *antennæ* , *corpus* , *pedes* nigra:

*Obs.* In *Enum. cantharis rufiventris* *D. Scop. n. 139.* inter necydales ordinata fuit, licet *elytra* minime sint attenuata, eo quod lineis tribus insignantur, intima brevissima, extima longissima. Huic characteri in hoc genere multum tribuit *D. Schrank* omnesque cantharides *Linn.* *Thorace teretiusculo* ad genus præsens libenter referret. Notis hujus generis characteristicis oculos lunares addidit *D. de Geer.* sed superflua videtur utraque nota, forma enim elytrorum sufficienter distinctæ necydales videntur.

### *Pyrochroa.*

Hoc novum genus admiserunt *D. Fab. de Geer, Geoff. Schrank* , sed synonymia variat.

Pyrochroam *D. Geoff.* non citavit. *Linn.*

Pyrochroa *D. Geoff.* lampyris coccinea  
*Syst.* apud *D. Fab.*

. . . . . cantharis *peḏinicornis* teste  
*D. de Geer.*

. . . . . species propria sub nomine  
pyrochroæ *satrapæ* in *Enum.*

*Obs. 1.* In cantharide *peḏinicorni* *caput*,  
*corpus* & *scutellum* nigra, in pyrochroa  
*D. Geoff.* ignita, non eadem igitur  
insecta.

*Obs. 2.* In secunda *Mantiss.* ad pyro-  
chroas relata fuit cantharis *peḏini-*  
*cornis* *Linn.* major *L. coccinea.* *Ant-*  
*ennæ* nigræ valde *peḏinataæ* aut potius  
*flabellatæ.* *Caput* atrum. *Thorax* testa-  
ceus, macula media atra. *Elytra* glabra,  
testacea, immaculata. *Corpus* atrum.

*Obs. 3.* Cantharis *peḏinicornis* *Linn.* sta-  
tura lampyris *sanguineæ*; ergo minor  
lamp. *coccinea* & non major. Pyrochroa  
3 novæ *Mantissæ* videtur pyrochoa  
*purpurata.* *D. Schrank.* In Gallia *Aust.*  
utraq̃ue species descriptionique ejusdem  
Entomologis conformis.

*Pyr. purpuratæ desc.* Color insecti aterri-  
mus. *Caput* cordatum. *Labium* superius  
magnum, reliquo capite depressius;  
*labium* inferius dimidio brevius, corpo-  
ribus duobus, quæ *palpi* inferiores,  
membranaceis fuscis, apice denticulatis  
instructa; *palpi* superiores atri, teretes,  
apice rubri. *Maxillæ* ante apicem fascia  
coccinea. *Antennæ* *peḏinataæ*, decem  
articulatæ: articulus primus & secundus  
qui etiam reliquis brevior, cuneiformes,  
tertius dente modico in latere  
interiori, reliquorum dentibus successive  
majoribus, septimo, octavo, nono,  
decimo ramum longum emittentibus;

undecimus cylindricus. Post antennis *oculi* reniformes, transversi. Regio inter oculos antennisque sita, cujusque quasi in angulis dicta membra sita sunt, depressior. *Collum* inter caput & thoracem atrum. *Thorax* fere orbicularis, medio sulco læviusculo & utrinque puncto excavato, colore eleganter rubro, inter rubrum commune & igneum, intermedio; *totus* pilis hujus coloris minutissimis, subtilissimis, densissimis tectus, unde sericeo splendore nitet. *Pectus* atrum. *Elytra* ejusdem ac *thorax* coloris, eodem sericeo splendore nitentia. *Pedum anticorum* tarsi lobos utrinque quatuor, post quos unguis bifurcatus, at *postici* tres tantum gerunt. *Alæ* fuliginosæ.

*Obs. 4.* In nostris punctum rubrum in occipite. Sequenti rarior majorque. V. *Satrapa*. Color aterrimus. *Caput* cordatum, supra infraque ignei coloris. Structura labiorum palporumque, ut in priore. *Palpi* superiores toti atri. *Antennæ* atræ, articulis tribus primis cuneiformibus, secundo brevissimo, quarto ramum longum emittente, quod & reliqui deinde facere pergunt, sed undecimus teres. *Oculi* atri, reniformes, ab antennis magis, quam in priore specie remoti, una sui parte tantum in superiore capitis siti. In fronte fovea ampliuscula, caput mortuum repræsentatura, si esset, quod oculorum foramina referret. *Thorax* structura prioris, sed tam ipse, quam pectoris latera, ignei coloris, sterni atro. *Pectus* pedesque & abdomen punctis minutissimis, creberrimis, excavatis conspersa. *Elytra* sericea ex

pilis ut in priore, sed ignei coloris.  
Univerſim præſens ſpecies priori elegantia multum concedit.

Minuta. 1. P. ( la petite ) atra, antennarum apicibus elytrisſque ſanguineis.

*Drury inf. pyrochroa nigro-rubra.*

*Hab. in Norwagia. D. Lund.*

*Deſc. Minor. Thorax, uti totum corpus, ater. Antennæ apice ruſæ.*

*Cantharis.*

Nigra. 17. C. *Deſc. Antennæ fulvæ, apice nigricantes. Caput poſtice nigrum, antice fulvum. Oculi nigri. Thorax ruber immaculatus. Elytra cineraſcente - nigra. Abdomen ſubtus nigrum, annulis rubris. Pedes rubelli.*

Thoracica. 18. C. *Deſc. Nigra. Antennæ flaveſcentes. Thorax ruber. Elytra lævia, viridia.*

Plumbea. 20. C. *Deſc. Antennæ maris vix thoracem æquant, fœminæ dimidii corporis longitudine. Nitida nigra.*

Cinerea. 21. C. *Deſc. Oculi nigri exſerti. Antennæ caſtaneo-fulcæ. Totum inſectum pilis cinereis tectum, inde cinerea, licet nigra.*

Rotundata. 22. C. *Deſc. Corpus plumbeum. Elytra lævia. Pedes pallide flaveſcentes.*

Maculata. 23. C. *Deſc. Caput, corpus ſupra & infra, pedesſque rubello-lutea. Antennæ, oculi tarſique nigri. Elytra obſcure ochraceata, apice macula nigra. Alæ nigricante-fulcæ.*

Pallipes.

- Pallipes. 24. *C. Desc.* Caput atrum, palpis pallidis. Antennæ fuscæ, basi pallidæ. Thorax marginatus ater. Elytra glabra, pallida, apice fusca. Pedes pallidi.
- Ruficollis. 25. *C. Desc.* Summa affinitas canth. fuscæ, at duplo minor. Caput, cum antennis ferratis, atrum. Thorax marginatus, rufus, immaculatus. Elytra, alæ & pectus atra. Abdomen rufum. Pedes nigri.
- 2-Punctata. 26. *C. Desc.* Caput & antennæ nigra, fronte testacea. Thorax marginatus, marginibus reflexis testaceis, punctis duobus nigris. Elytra serico aureo splendentia, apice nigra. Abdomen nigrum, apice ferrugineum. Pedes testacei, geniculis posticorum nigris.
- Pulicaria. 27. *C. Desc.* Parva, tota atra, excepto thoracis marginibus tentaculisque abdominalibus.
- Nigripes. 36. *C. Desc.* Caput & thorax lutea. Antennæ fuscæ & punctum fuscum inter antennis. Elytra pallide testacea, apice nigra. Abdomen & pedes atra. Similis canth. melanuræ, attamen omnino distincta.
- Proboscidea. 37. *C. Desc.* Forte proprii generis insectum. Caput & thorax planâ, depressa, nigra, immaculata. Palpi porrecti nigri; articulo penultimo majori, subtus appendiculo ovato, irregulari, fissio, ultimo arcuato hamato, acuto. Elytra lævia, testacea, apice nigra. Abdomen nigrum, apice testaceum.
- Lymexylon* 4.
- Inseâ. Tomus IV. X



- Formicoides. 38. { An inter cantharides , an inter  
 Variegata. 39. { meloes numerandæ ? Dubium idem  
 Testacea. 40. { de tribus sequentibus quas inter  
 cucujos collocavit. *D. Fab.*

Depressa. 41. *C. Desc.* Statura depressa & magnitudo cantharidis. *Antennæ* nigræ , moniliformes , pilosæ , articulis undecim , ultimo acuto. *Caput* depressum , planum , rufum , *ore oculisque* nigris , pollice utrinque angulo obtuso globoso acutum. *Thorax* planus , subfulcatus.

Dubia. 42. *C. Lege* Flavipes ( la flavipede ) thorace denticulato nigro , pedibus flavescens , antennis filiformibus longitudine corporis.

*Iter.* Norwag.

*Hab.* in arborum truncis decorticatis Norwagiæ.

Mutica. 43. *C. Desc.* *Antennæ* filiformes , corpore breviores. *Caput* & *thorax* atra , immaculata ; ad basin thoracis puncta duo impressa. *Elytra* filiformia , striata , obscura sive fusca. *Pedes* simplices , nigri.

Berberidis. 44. *C. Desc.* *Palpi* rufi. *Antennæ* fuscæ , basi rubræ , reliqua testacea. *Thorax* in medio linea longitudinali rubra percurritur , quæ dein totum marginem posteriorem occupat. Vel si præplacet , *thorax* rufus est , lateribus nigris. *Femora* nigra. *Tibiæ* flavescens.

Pallida. *C.* ( la pâle ) thorace marginato atra , elytris pedibusque pallide testaceis.

*Hab.* Kilix. *D. Daldorf.*

*Desc.* Parva. *Caput* atrum, *antennarum* basi *palpisque* pallidis. *Thorax* marginatus, ater, immaculatus. *Corpus* atrum, pedibus pallidis. *Elytra* pallide testacea, immaculata.

Viridis. C. ( la verte ) æneo-viridis, ore flavescente.

*Hab.* in Scania. D. Pay Kull.

*Desc.* Statura & magnitudo canth. 2-pustulatae. *Caput*, *thorax*, *elytra* viridi-ænea, immaculata, solo ore flavescente. *Antennæ* nigræ. *Corpus* obscurum, tentaculis abdominalibus sanguineis.

Sanguinolenta. C. ( la sanguinolente ) nigro - ænea, thoracis margine elytrisque sanguineis.

*Mantiff. Malach.* 4.

*Hab.* Kiliæ. D. Daldorf.

*Desc.* Staturâ præcedentium, at duplo minor. *Caput* & *thorax* nigro - ænea. *Thoracis* margo sanguineus. *Elytra* omnino sanguinea, immaculata. *Abdomen* & *pedes* nigra.

Cyanea. C. ( la bleue ) cyanea, thorace abdomineque rubris. *Mantiff. Malach.* 5.

*Hab.* in Hispaniæ umbellatis. D. Vahl.

*Desc.* Statura præcedentis. *Caput*, *antennæ*, *elytra*, *pedes*, cyanea, nitida, immaculata. *Thorax* & *abdomen* rufa, nitida.

Flavipes. C. ( la flavipede ) nigra, antennarum basi tibiisque flavis. *Mantiff. Malach.* 10.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner.

*Desc.* *Corpus* parvum, nigrum, nitidum, immaculatum. *Antennæ* nigræ, basi flavæ. *Pedes* flavi, femoribus nigris.

**Barbata. C.** ( la barbue ) fusca , antennis tibiisque piceis. *Mantiff. Lymexylon.* 3.

*Schall. act. Hall.* 1. 322. *tab.* 1. *fig.* 7. mordella barbata fusca , palpis ensiformibustrilobis , lobis lateralibus latissimis.

*Schæff. icon. tab.* 279. *fig.* 7. *a. b.*

*Hab. in Germaniæ lignis.*

*Desc. Corpus* fuscum , tomento aureo fugaci , nitidulum. *Antennæ & pedes* pallidiores.

**Favipes. C.** ( la flavipede ) nigra , elytris basi , abdomine apice pedibusque flavis. *Mant. Lymexylon.* 5.

*Hab. in Saxoniae ligno. D. Hybner.*

*Desc. Statura & magnitudo canth. navalis. Caput , thorax , antennæ , nigra immaculata. Elytra nigra , basi ad futuram flava. Corpus nigrum. Abdomen apice flavum. Pedes flavi.*

**Morio. C.** ( la morio ) nigra , pedibus anticis flavis. *Mantiff. Lymexylon.* 6.

*Hab. in Saxoniae lignis. D. Hybner.*

*Desc. Duplo præcedente major. Corpus totum nigrum , pedibus quatuor anterioribus solis flavis.*

*Obs. Ad quod genus Syst. referendus sit cucujus D. Fab. incertum mihi videtur. Post cantharides ordinavi , licet cerambycem planatum comprehendat hoc genus. V.*

**Sulcata. C.** ( la fillonnée ) thorace sulcato nigra , elytris crenato-striatis. *Mant. cucujus* 2.

*Hab. in Croatiae ligno putrescente. D. Saldoner.*

*Desc. Corpus* medium , elongatum. *Antennæ* breves , moniliformes. *Caput* nigrum trisulcatum sulco intermedio

longiore. *Thorax* planus, itidem trifurcatus, furcis lateralibus apicem haud attingentibus. *Elytra* crenato - striata. *Abdomen* piceum. *Pedes* simplices.

**Cærulea.** C. ( la bleue ) thorace fulcato nigra, elytris striatis cæruleis, abdomine rufo.

*Mantiss. cucujus* 3.

*Hab.* in Germania. D. Schneider.

*Desc.* Major canth. depressa, at statura eadem depressa. *Caput* nigrum, ore piceo. *Thorax* depressus, canaliculatus sulcoque utrinque profundo abbreviato exaratus. *Elytra* cærulea nitida, striata. *Abdomen* rufum. *Pedes* nigri.

**Flavipes.** C. ( cérambyx ) planatus Syst.

**Testacea.** C. ( la testacée ) thorace subquadrato mutico testacea, femoribus compressis.

*Mantiss. cucujus* 7.

*Hab.* sub betulæ corticibus. Mus. D. Romani.

*Desc.* Triplo minor canth. flavipede. *Antennæ* longitudine fere corporis, filiformes, testaceæ. *Corpus* elongatum, testaceum, immaculatum. *Pedes* breves, testacei, femoribus compressis.

**Monilis.** C. ( le collier ) thorace quadrato mutico supra nigra, thorace margine, elytris macula ferrugineis. *Mantiss. cucujus* 9.

*Hab.* in Germania.

*Desc.* *Antennæ* breves, moniliformes. *Corpus* subtus testaceum.

**Mutica.** C. la pacifique ) thorace mutico nigro, puncto utrinque impresso, elytris striatis fuscis. *Mantiss. cucujus* 8.

*Hab.* in Germania. D. de Hattorf.



*Desc.* Statura depressa præcedentium.  
*Antennæ* filiformes corpore breviores.  
*Caput & thorax* atra immaculata; ad  
 basin thoracis puncta duo impressa.  
*Elytra* filiformia, striata, obscura sive  
 fusca. *Pedes* simplices nigri.

*Elater.*

Thoracicus 31. *E. Desc.* Fuscus. *Thorax* elytraque  
 sparsa inordinate punctis albidis. *Ab-*  
*domen* superne sub elytris rubrum s.  
 aurantium.

Carbona- 32. *E. Desc.* Totus aterrimus, minime  
 rius. nitidus. *Antennæ* thorace breviores,  
 ferratæ. *Elytra* punctato-striata, sed  
 hæ striæ non comparent, nisi dedita  
 opera deleantur squamulæ queis totum  
 corpus omnesque artus, quasi quodam  
 pulvere teguntur: squamulæ hæ ater-  
 rimæ, intermixtæ pilis albis.

Hæmatoce- 33. *E. Desc.* Simillimus *E. aterrimo*; sed  
 ras. *antennæ*, quæ subtus ferratæ *pedesque*  
 ex fusco-sanguinei.

Austriacus. 34. *E. Desc.* Tomentosulus per omnia fer-  
 rugineus. *Elytra* subtiliter striata. *Oculi*  
 soli nigri. *Antennæ* longæ, prope  
 filiformes.

Purpureus. 35. *E. Desc.* *Antennæ* nigrae pectinatae.  
*Caput* nigrum. *Thorax* antice angustior,  
 niger, bysso coccinea tectus, hinc  
 purpuram sub vario situ oculi exhibens.  
*Scutellum* atrum. *Elytra* coccinea, li-  
 neis duabus elevatis, striato-punctata.  
*Alæ* fuliginosæ. *Subtus* omnibus artibus  
 aterrimus.



- Fuscus.** 36. *E. Desc.* *Totus* niger. *Thorax* non nihil ex nigro - æneus, ad lentem punctatus. *Elytra* thorace pallidiora, ad lentem punctato striata & præterea adhuc subtilissime punctata.
- Cupreus.** 37. *E. Desc.* *Statura* omnino & *magnitudo* *E. pectinicornis*, obscure cupreus, f. rufo-æneus. *Antennæ* nigrae, pectinatae. *Elytra* striata, basi testacea, apice cuprea.
- Filiformis.** 38. *E. Desc.* *Corpus* filiforme, *E. obscuro*, duplo minus, totum aureo - fuscum, immaculatum.
- Striatus.** 39. *E. Desc.* *Medius*. *Caput* & *thorax* obscure nigra. *Elytra* fusca, lineis quatuor pallidis, ad apicem coeuntibus. *Antennæ* ferrugineae. *Pedes* fusci.
- Limbatus.** 40. *E. Desc.* *Statura* & *magnitudo* *E. minuti*, cui valde affinis, at *elytra* testacea, margine omni nigro.
- Marginatus.** 41. *E. Desc.* Simillimus præcedenti, at paullo major. *Corpus* nigrum. *Thorax* niger obscurus, margine omni ferrugineo.
- Rufus.** 42. *E. Desc.* *Maximus*. *Totus* rufus. *Antennæ* ferratae. *Oculi* nigri nitentes. *Elytra* striis longitudinalibus profundis.
- Fuscus-major.** 43. *E. Desc.* *Fuscus* nitidus. *Totus* villosus. *Antennæ* capite thoraceque longiores. *Abdomen* supra rubellus. *Pedes* castaneo-fusci nitidi.

- Fuscus- 44. *E. Desc. Antennæ nigricantes uti caput*  
 minor. *thoraxque supra & infra. Elytra, pedes,*  
*abdomen infra obscure fusca.*
- Obtusus. 45. *E. Desc. Medius. Antennæ rufæ. Caput,*  
*thorax, quæ pilis griseis vestita,*  
*abdomen infra, nigra. Elytra obscura*  
*fusca, griseo villosula.*
- Inæqualis. 46. *E. Desc. Major niger. Antennæ ferrati-*  
*formes. Thorax & elytra squamis pi-*  
*lisque griseis lata atraque cum capite*  
*scabra.*
- Undulatus. 47. *E. Desc. Majusculus. Antennæ arti-*  
*culis conicis. Corpus nigrum; sed*  
*e pilis griseis murinum adparet. Elytra*  
*longitudinaliter sulcata, in singulo*  
*fasciis tribus transversis undulatis ni-*  
*gris pilorum defectu. Subtus nitidus*  
*niger.*  
*Larva 6-poda castaneo-fusca in terra*  
*subque lapidibus reperitur: incisuræ*  
*fasciis luteis separatæ sunt.*
- Nigro- 48. *E. Desc. Parvus. Antennæ nigræ,*  
 maculatus. *primo articulo rufo. Thorax rufus,*  
*linea nigra subtus, maculis tribus*  
*elongatis nigris supra. Pectus nigrum.*  
*Abdomen subtus rufescens, basi late-*  
*raliterque nigricans. Pedes ochraceati.*
- Æneo-niger. 49. *E. Desc. Minimus. Totus ochrescenti*  
*niger nitidus.*
- Balteatus. 54. *E. Desc. Magnitudo variat. Caput,*  
*thorax corpusque subtus nigra. Elytra*  
*itidem nigra, fascia longitudinali fulva*  
*in medio.*

Advena. 60. E. *Desc.* *Thorax* villosus, antennis paullo brevior. *Elytrum* striatum, villosulum, striis binatis excavatis, una solitaria: hujus color dupliciter sumi potest, vel enim talis, qualem dixi, vel universo modo, nempe castaneus, apice basi fasciaque media repanda testaceis.

Istriacus. 61. *Desc.* *Antennæ* subpectinatae, thorace duplo longiores. *Caput* nigrum, oculis prominulis. *Thorax* in medio æque latus ac longus, sulco longitudinali, postice inter angulos dentatos nigredine inquinatus. *Scutellum* nigrum. *Elytrum* punctulis congestis scabrum, inter quæ villi parvi adscendentes prodeunt; idem tribus lineis elevatis parallelis longitudinaliter striatum est, margine utroque cujusque lineæ excavata lineola notato. *Abdominis* apex ruber. *Corpus* subtus pedesque nigri, nitore aliquo lucidi.

Degener. 62. E. *Desc.* *Statura* E. *sanguinei*. A fociis vere degener, ob thoracis angulos posticos rotundatos, non vero dentatos. *Totus* niger & villosus, *antennas* gerit dentatas, thorace vix longiores. *Thorax* in latitudinem magis quam longitudinem extensus. *Elytrum* striatum, striis 12, valleculis interjectis punctatis. *Corpus* subtus modice nitens. Puncta flava in thorace tria, in quolibet elytro octo alterna, subrotunda, aureo colore, non vero nitore, prædita, æqualis magnitudinis, unico excepto, nempe antico penultimo prope marginem interiorem collocato.

**Elongatulus. E.** ( l'alongé ) ater, elytris testaceis apice nigris. *Mantiss. Elater* 42.

*Hab. in Austria. D. Saldoner.*

*Desc.* Statura & summa affinitas E. balteati. *Caput*, *thorax*, *scutellum* atra, nitida, immaculata. *Elytra* punctatofriata, testacea, apice nigra. *Corpus* nigrum, *pedibus* apice testaceis.

**Pilosus. E.** ( le velu ) fuscus cinereo subvillosus, elytris striatis. *Mantiss. Elater* 45.

*Leske itin. I. p. II. I. tab. A. fig. I.* elater pilosus.

*Hab. in Lusatiæ montibus.. D. Prof. Leske.*

*Desc.* Parvus, totus obscurus, villo parvo cinereo tectus. *Elytra* striata.

**Advena. E.** ( le passager ) ater, elytris striatis pedibusque obscure cinereis. *Mantiss. Elater* 50.

*Hab. ad Bizerta Hispaniæ. D. Vahl.*

*Desc.* Parvus. *Caput* & *thorax* atra, parum nitida. *Elytra* acuminata, striata, obscure cinerea. *Abdomen* nigrum, *pedibus* cinereis.

**Buprestoides. E.** ( le buprestoïde ) cylindricus niger immaculatus, capite retracto. *Mantiss. Elater* 55.

*Linn. Syst. nat. 2. 656. 36. in Sv. 746.* elater buprestoides.

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc.* *Corpus* medium cylindricum, nigrum, minime nitidum. *Caput* intra thoracem retractedum. *Elytra* striata.

**Dermestoides. E.** ( le dermestoïde ) subvillosus cinereus, elytris striatis, capite retracto. *Mantiss. Elater* 56.

*Linn. Syst. nat.* 2. 656. 37. Sv. 747.  
elater dermestoides.

*Hab. in Suecia. D. Pay Kull.*

*Desc.* Parvus. *Corpus* totum cinereum,  
subvillosum, immaculatum.

*Obs.* Hi duo ultimi in speciebus non  
reperiuntur. V.

*Cicindela.*

*Biramofa.* 11. *C. Thumb. nov. sp.* 1. 26. f. 40.

*Desc.* *Corpus* totum supra obscure æneum,  
subtus aureum, nitidum. *Elytrum* margo  
exterior albus ramos five dentes duos  
emittens, altero in medio, altero  
versus apicem.

*Semipunctata.* 12. *C. Desc.* Statura & summa affinitas  
cic. *ripariæ*. *Corpus* totum æneum.  
*Elytra* striato-punctata, in medio ad  
futuram quasi polita, glaberrima. *Pedes*  
nigri.

*Caraboides.* 14. *C. Desc.* *Caput* & *thorax* nigro-ænea.  
*Oculi* exserti, & *maxillæ* insignes. *Tho-*  
*rax* perfecte cordatus, marginatus ut  
in carabis, sed margo angustius, linea  
longitudinali excavata. *Elytra* nigro-  
ænea, maculis viridi-æneis variegata,  
minutissime punctata; ad utrinque mar-  
ginem puncta excavata lata in lineam  
longitudinalem disposita. *Pedes* fusci.  
*Pectus* nigro-æneum; abdomen atrum  
nitens.

*Flexuosa.* *C.* (la tortueuse) obscura, elytris punctis  
quatuor lunulisque tribus albis, in-  
termedia flexuosa. *Mantiss. cicindela* 13.  
*Hab.* ad Hispaniæ littora. *D. Vahl.*  
*Desc.* Statura & summa affinitas cic.



*luridæ. Caput* obscurum, labio dentato albo margine nigro. *Maxillæ* nigræ. *Thorax* obscurus, basi apiceque impressus immaculatus. *Elytra* obscura, punctis duobus baseos ad futuram oblique positis; tunc lunula ad marginem exteriorem, tunc punctum ad futuram, demum lunula in medio marginis flexuosa & fere duplicata. Punctum magnum album ad marginem & denique lunula elytrum terminat. *Abdomen* æneum. *Pedes* cuprei.

Capensis. C. ( du Cap ) subænea, elytris albis, linea fusca triramosa.

*Hab.* ad C. B. Spei. *Tulbagh.* In Ulteriori Calabria.

*Vincent. Petagn. specim. n. 214.*

*De Geer tom. 7. t. 6. f. 11.*

*Desc. Corpus* testaceum. *Maxillæ* subnigræ.

*Oculi* perlati, nitentes. *Caput* viride, fronte testaceo-aurata. *Thorax* margine albidior, macula viridi-cuprea triloba.

*Elytra* striata, macula ad basin, fasciisque duabus repandis transversis, viridicupreis, omnibus futuræ connexis.

*Alæ* hyalinæ, nigro maculatæ.

*Obs.* Ad hoc genus & ad hanc speciem hoc insectum referre maluit *D. Vincent.*

*Petagn.* quam vel ad aliud genus, vel novam conficere speciem.

### *Buprestis.*

*Acuminata.* 21. B. *Desc.* Parva. *Corpus* elongatum. *Elytra* angustissima, flexibilia, viridia, ad lentem scabra. *Alæ* nigricantes.

*Lugubris.* 23. B. *Desc.* *Corpus* magnitudine & statura bup. tenebrionis, *Caput* obscurum,

griseum, *antennis* griseis. *Thorax* obscurus, griseus, lævis, margine auro paucò nitidulo. *Elytra* integra, obscura, grisea, punctis plurimis elevatis, oblongis, glabris, scabra. *Corpus* subtus cupreum, nitidum.

Læta. 25. B. Desc. *Corpus* lineare, magnitudine & statura bup. *viridis*. *Caput* & *thorax* rubra, aurea, nitida. *Elytra* viridia, integerrima, sutura aurea. *Pedes* rufescentes.

Salicis. 26. B. Desc. Statura & magnitudo bup. *nitidulæ*. *Caput* viride pubescens, *antennis* fuscis. *Thorax* depressus, marginatus, viridis, maculis duabus cyaneo impressis. *Elytra* integra, rufo-aurea, basi, imprimis ad futuram, viridia. *Subtus* viridia immaculata.

Cyanea. 27. B. Desc. Statura & magnitudo bup. *viridis*. *Corpus* totum cyaneum, nitidum, oculis testaceis.

Berolinensis. B. ( le Prussien ) *elytris* bidentatis viridi nigroque variis, ano tridentato. *Mant.* Bup. 7.

*Herbst. arch. inf.* buprestis Berolinensis.

*Pall. icon. tab. D. fig. 10.*

*Hab. in Germania.*

Desc. Statura & magnitudo bup. *obscuræ*.

*Caput* & *thorax* punctata, viridia. *Elytra* viridi nigroque varia, substriata, apice bidentata. *Corpus* subtus cupreum.

Flavomacu- B. ( le maculé ) *elytris* truncatis dentatis  
lata, striatis nigris, maculis quatuor flavis,  
*Mantiss. Bup. 22.*

*Deyur. inf. 4. 137. 6. buprestis flavo maculata.*

*Hab. in Scania. D. Pay. Kull.*

*Desc. Media. Caput æneo-nigrum, fronte flava. Thorax niger, margine flavo. Elytra striata apice truncata, dentata, maculis quatuor flavis, postica didyma. Abdomen æneo-nigrum, apice punctis duobus fulvis. Pedes nigri.*

*Tæniata. B. ( le fascié ) elytris ferratis cinereo villosa, elytris nigris, fasciis duabus ferrugineis. Mantiss. Bup. 42.*

*Hab. in Europa Australiori. Mus. D. Banks.*

*Desc. Parva. Antennæ nigræ. Caput & thorax villosa, obscure grisea. Elytra ferrata, substriata, fasciis duabus pone medium ferrugineis, quarum postica margines haud attingit. Ante fascias punctum unum alterumve ferrugineum. Corpus cinereo villosum.*

*Decostigma. B. ( le saillant ) elytris integris elevato-striatis fuscis, punctis quinque flavis. Mantiss. Bup. 47.*

*Hab. in Austria. D. Saldoner.*

*Desc. Statura bup. chrysofigmæ. Thorax punctatus, nigricans, cupreo nitens. Elytra striis elevatis tribus abbreviatis nigra, punctis quinque flavis, primo solitario, reliquis octo, elytris complicatis, in circulum dispositis. Corpus nigro-æneum.*

*Onopordinis. B. ( de l'onopordon ) elytris integris cupreis, fulcis punctisque numerosis albo villosis, thorace scabro. Mant. Bup. 51.*

*Hab. in Hispaniæ onopordine. D. Vahl.*

*Desc. Paullo bup. fasciculari minor. Corpus æneum, nitidum, albo villosum.*

*Thorax* punctis elevatis scaber. *Elytra* ænea, fulcis punctisque pluribus magnis, impressis albo villosis. *Pedes* cuprei.

**Acuminata.** B. ( le pointu ) elytris integris attenuato-acuminatis obscuris, corpore cupreo. *Mantiss. Bup.* 58.

*Pall. icon. tab. D. fig. 10.* buprestis acuminata.

*Hab. in Russia Meridionali. D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino bup. *rusticæ*, distincta elytris postice elongatis, attenuatis. *Caput* cupreum. *Thorax* cupreus, nigro maculatus. *Elytra* striata, obscura. *Corpus* cupreum, nitidum.

**Cariosa.** B. ( le carié ) atra, elytris integris atomis albis, thorace varioloso. *Mant. Bup.* 61.

*Pall. iter. 3. app. 708. 52. icon. D. fig. 6.* buprestis cariosa.

*Hab. in Russia Australiori. D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino bup. *tenebrionis*, at duplo major. *Corpus* nigrum, atomis albidis adpersum. *Elytra* substriata. *Thorax* maculis plurimis elevatis glabris.

**Undata.** B. ( l'ondé ) viridi-ænea, elytris integris apice obscuris, strigis undatis albis. *Mantiss. Bup.* 64.

*Hab. in Germania. D. Schulz.*

*Desc.* Major. bup. *rubi. Caput & thorax* ænea, nitida, immaculata. *Elytra* basi viridi-ænea, strigis aliquot fere obsoletis albis, apice nigricantia, strigis albis distinctis, valde undatis.

**Aurulenta.** B. ( le porte-or ) supra obscure viridis; elytrorum margine aureo. *Mantiss. Bup.* 67.

*Hab.* Halæ. *D. Hybner.*

*Desc.* Media. *Antennæ* nigræ. *Caput* & *thorax* viridia, obscura, lævia, immaculata. *Elytra* obscuriora, margine exteriore late aureo. *Corpus* cupreum.

**Elata.** B. ( l'élégant ) elytris integerrimis linearibus, corpore elongato aureo nitido. *Mantiss. Bup.* 84.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura bup. atræ oblonga, at minor & tota ænea nitida.

**Brutea.** B. ( le Calabrois ) nigra punctis albicantibus maculata, thorace varioloso dilatato albidior, maculis quinque nigris notato.

*Hab.* in Europa. In Ulteriori Calabria. *Vincent. Petagn. t. f. xx. n. 108.*

*Desc.* Hæc e maximis est. Tota nigra punctata, punctis maculisque albis confersa. *Frons* orbicularis, punctis albis. *Thorax* maculis quinque nigris nitidis inter albedinem maculatam ipsius, quarum duæ in singulo latere; quinta in medio thoracis. In basi ante scutellum fovea triangularis. *Elytra* sulcatopunctata, maculis punctisque albis.

*Obs.* Cum bup. tenebrione, non confundenda. Distincta enim species, cum illius diversus sexus non sit atque in dissitis locis inveniuntur & in diversis plantis constanter habitent. *Ibid.*

**Stephanelli.** B. ( le Stéphanelli ) viridi-aurea nitens; thorace lineis fuscis elytris integris.

*Hab.* in Ulteriori Calabria. *Vincent. Petagn. specim. n. 110.*

*Desc.* *Corpus* oblongum colore viridi-aureo splendente sericeo. *Oculi* testacei. *Antennæ*



*Antennæ* cæruleæ. *Thorax* lineis duabus fuscis in medio parallelis. *Elytra* integra. *Femora antica* in parte anteriori rubro fulgentia. *Anus* linea nigro-cærulea. *Ungues* nigro-cærulei.

Diversa igitur species, neque cum bup. viridi, neque cum bup. manca confundenda. Inter minores locum habet.

*Dytiscus.*

Fenestratus. 23. D. Desc. Statura omnino dyt. 2-pustulati. *Corpus* subtus ferrugineum. *Caput* nigrum, ore, *antennis* punctisque baseos ferrugineis. *Thorax* niger, margine ferrugineo. *Elytra* nigra, punctis duobus fenestrato-hyalinis, altero in medio, altero versus apicem.

Hermanni. 25. D. Desc. Statura dyt. erythrocephali. *Caput* obscure ferrugineum, oculorum orbita nigra. *Thorax* ferrugineus, margine antico & postico nigris. *Elytra* lævia, nigra, basi ferruginea, apice truncata. *Abdomen* ferrugineum, apice nigrum.

Gibbus. 26. D. Desc. Statura dyt. erythrocephali, at paullo minor. *Caput* ferrugineum, basi parum nigricante. *Thorax* ferrugineus, margine postico nigro. *Elytra* lævia, nigra, basi margineque obsolete ferrugineo maculata. *Corpus* & *pedes* ferruginea, *abdomine* apice nigro.

Depressus. 28. D. Desc. *Corpus* parvum, depressum. *Caput* ferrugineum, oculis nigris. *Thorax* ferrugineus, margine antico maculisque duabus baseos nigris. *Elytra*

fusca, maculis tribus marginis & quibusdam disci ferrugineis.

6-Pustulatus. 29. D. Desc. Minutus. *Caput* ferrugineum, oculorum regione nigra. *Thorax* niger, lateribus ferrugineis. *Elytra* glabra, lævia, nigra, maculis tribus ferrugineis, prima baseos majore lunata, reliquis duabus versus marginem. *Corpus* atrum, *pedibus* ferrugineis.

Lituratus. 30. D. ( l'effacé ) Desc. *Corpus* parvum, depressum, atrum. *Basis elytrorum* pallida & versus apicem punctum unum alterumve. *Pedes* picei.

Lineatus. 31. D. ( le rayé ) Desc. *Caput* ferrugineum, basi parum nigricans. *Thorax* lævis, ferrugineus. *Coleoptera* fusco cinereoque mixta ( vel cinerea *Linnaei* ) margine pallidiore. Per medium dorsi lineæ quatuor distinctæ, albicantes.

Inæqualis. 32. D. Desc. Magnitudo dyt. *lineati*. *Caput* ferrugineum, oculorum orbita nigra. *Thorax* ferrugineus, postice niger. *Elytra* lævia, nigra, margine ferrugineo ramulos inæquales abbreviatos exferente. *Subtus* ferrugineus.  
*Variat* interdum linea media elytrorum flava a macula baseos ad medium marginis exterioris ducta.

Pusillus. 33. D. Desc. *Corpus* vix magnitudine pediculi, nigrum. *Thorax* ater, margine albo. *Elytra* nigra, margine imprimis antico & apicis albo.

Planus. 34. D. Desc. Statura omnino dyt. *erythrocephali*, at *caput* nigrum. *Corpus*

planum læve, vix nitidum. *Tibia* ferrugineæ.

**Orbicularis.** 35. *D. Desc.* Statura fere dyt. *scarabæoidis*, at minor & fere orbiculatus. *Antennæ* perfoliatæ. *Totus* lævissimus, nitens.

**Bipunctatus.** 36. *D. Desc.* Parvus, statura omnino hujus generis. *Caput* atrum, puncto utrinque marginali griseo. *Thorax* ater, nitidus, margine griseo. *Elytra* fusca, margine pallidiori & puncto distincto griseo versus apicem.

*Obs.* Ad dytiscos antennis perfoliatis hi duo ultimi pertinent. V.

**Gyrinoides.** 37. *D. Desc.* *Antennæ* perfoliatæ. Ovatus, convexus, niger. *Oculi* huic insecto, ut in toto genere, tantum duo, sed ita facti, ut eisdem usus præstent ac gyrini *natatoris* quatuor: oculus enim uterque deorsum oblongus, inflexus, majori tamen sui parte pagina corporis inferiori existens. *Elytra* manifeste striata, striis in singulo decem. *Antennæ* clavatæ, articulis tribus extremis crassioribus, testaceæ, clava nigra. *Palpi* antennis longiores, ferruginei; *tibiæ* testudineæ. *Pedes* natatorii nulli.

**Immaculatus.** 38. *D. Desc.* Major femine cucurbitæ vulgaris, ater *totus*, lævissimus, nec punctis nec striis, etiam ad lentem conspiciendis; nec tamen valde nitens. *Antennæ* filiformes, *tibiæ*que obscure castaneæ.

**Coccinelloi-** 40. *D. Desc.* Habitus coccinellæ, & ita convexus; subtus niger, pedibus pallide testacei. *Caput* nigrum, ante

acutum, utrumque macula exigua flavescenti. *Thorax* niger, lateribus flavicantibus. *Scutellum* nigrum. *Elytra* flavicantia, sed singula striis 18 punctorum munitissimorum nigrorum.

Fimbriatus. 41. D. Desc. Fusco-niger sine punctis aut striis, hinc glaberrimus. *Subtus* colore cinnicis *leclularii* dilutiore. Latera *inoracis*, margoque *elytrorum* exterior flavus, sed hæc flavedo in elytris tres quatuorve dentes introrsum emittit.

Fusculus. 42. D. Geoff. *ins paris. t. I. n. 9.*  
Desc. Parum nitet, etsi nec striatus nec punctatus.

Unilineatus. 43. D. Desc. Ater lævis. *Thorax* lateribus obscure ferrugineus. *Elytra* lævia, margine exteriori toto, striaque a basi non ultra medium pertinente pedibusque flavescantibus.

Nigricans. 44. D. Desc. Niger, nitidus. *Elytra* fusca nitida. *Antennæ* filiformes, apicem versus tamen nigricantes, *pedesque* lucide castanei nitentes.

Bilineatus. 45. D. Desc. Corpus ovatum depressum. *Caput* lineolis transversis nigris. *Antennæ* rufo-flavescentes. *Thorax* antice polliceque nigro marginatus. *Elytra* ad lentem rufo maculata.

Seminiger. 46. D. Desc. Magnitudo præcedentis. *Corpus* supra & infra nigrum nitidum. *Caput* rufo variegatum. *Antennæ* rufæ. *Thorax* *elytraque* lævia, lateraliter rufo marginata. *Pedes* castaneo-brunnei.

- Griseo-  
striatus. 47. D. Desc. *Antennæ* luteo-griseæ, apice  
brunæ. *Caput*, *thorax*, nigro griseoque  
variegata. *Elytra* nigra, griseo margi-  
nata, lineis longitudinalibus griseis. Do-  
sum sine scutello. *Pedes* rufo-brunnei.
- Hyalinus. 48. D. Desc. *Caput* latissimum *thoraxque*,  
pallida. *Oculi* nigri *Corpus* infra antice  
viride, postice brunneum. *Antennæ*  
fusæ. *Elytra* diaphana. *Pedes* fulci,  
*posteriores* crassiores longioresque.
- Stagnalis. 49. D. Desc. *Antennæ* fulvæ. *Caput*, *thorax*,  
nigra. Foveolæ duæ in capite. *Elytra*  
lævia, ad lentem transversim striata,  
luteo marginata, striis duabus longi-  
tudinalibus punctulatis.
- Lactuosus. 50. D. Desc. *Totus* niger. *Antennæ* fus-  
cescentes. *Elytra* lævia.
- Tesselatus. 51. D. Desc. *Corpus* nigrum. *Antennæ* ful-  
vescentes. *Caput* fulvum. *Oculi* nigri.  
*Thorax* capiti concolor, fascia fusca  
in medio. *Elytra* fulva, lævia, punctis  
impressis regulariter dispositis.
- Variegatus. 52. D. Desc. *Caput* luteum. *Oculi* nigri.  
*Thorax* fuscus luteo marginatus. *Elytra*  
fusca, maculis quatuor pallide flaves-  
centibus margines versus, in medio  
maculis duabus parvis. *Corpus* subtus  
fulvescenti-luteum. *Tarforum* primus  
articulus vix conspicuus.
- Melanoph-  
thalmos. 53. D. Desc. *Corpus* infra, *caput thorax-*  
*que*, flavescentia. *Oculi* nigri. *Elytra*  
lævia fusca.
- Quadratus. 54. D. Desc. *Oculi* nigri. *Caput* flavum.



*Thorax* capiti concolor, antice niger.  
*Elytra* nigra, lævia, maculis quatuor  
 luteis versus marginem exteriorem,  
 quatuorque aliis in medio in quadratum  
 dispositis.

Monoftria- 55. D. Desc. Niger. *Thorax* *elytraque*,  
 lateraliter luteo maculata. Stria unica  
 prope futuram longitudinalem.

Clavicornis. 56. D. Desc. Fuscus. *Oculi* nigri. *Caput*  
*thoraxque*, rubro-fusca. *Antennæ* cla-  
 vatae. *Elytra* lævia.

*Antennis* perfoliatis.

Picipes. D. ( le gluant ) niger, pedibus piceis,  
 elytris lævibus. Mantiss. Hydroph. 6.  
 Hab. in Germaniæ aquis.

Desc. Hujus generis videtur. *Antennæ*  
 mihi defunt. *Corpus* læve, glabrum.  
*Elytra* vix striata. *Pedes* picei.

Griseus. D. ( le gris ) supra cinereus, subtus fuscus.  
 Mantiss. Hydroph. 11.

Hab. in Saxoniae aquis. D. Hybner.

Desc. Statura & magnitudo dyt. minuti,  
 at supra totus cinereus. *Pedes* cinerei.

*Antennis* setaceis.

2-Punctatus. D. ( le biponctué ) ater, thorace flavo,  
 punctis duobus nigris, elytris flavo  
 fuscoque variis. Mantiss. Dyt. 19.

Hab. in Germaniæ aquis

Desc. Medius. *Caput* nigrum, ore sub-  
 ferrugineo. *Thorax* flavus, punctis  
 duobus dorsalibus atris. *Elytra* lævia,  
 glabra, nigro-fusca, flavo variegata.  
*Corpus* atrum. *Pedes* ferruginei.

**Hybneri. D.** ( l'Hybner ) lævis ater , ore thoracif-  
que margine , ferrugineis , elytris linea  
marginali flava. *Mantiff. Dyt. 21.*

*Hab. in Germaniæ aquis. D. Hybner.*

*Desc.* Magnitudo & statura dyt. *transver-*  
*salis.* *Caput* nigrum , ore ferrugineo.  
*Thorax* niger , margine imprimis an-  
tice ferrugineo. *Elytra* lævia , atra ,  
linea marginali flava , quæ tamen  
apicem haud attingit. *Corpus* nigrum.

**Stagnalis. D.** ( des étangs ) lævis niger , thorace  
antice ferrugineo , elytris fuscis flavo  
lineatis. *Mantiff. Dyt. 22.*

*Hab. in Germaniæ aquis. D. Hybner.*

*Desc.* Statura & magnitudo præceden-  
tium. *Caput* nigrum , ore ferrugineo.  
*Thorax* niger antice ultra dimidium  
ferrugineus , margine tamen ipso nigro.  
*Elytra* lævia fusca , flavo lineata. Margo  
flavescit. *Corpus* nigrum , *pedibus* flavis.

**Abbreviatus. D.** ( l'abrégé ) niger , elytris frigida abbre-  
viata baseos punctisque duobus flaves-  
centibus. *Mantiff. Dyt. 25.*

*Hab. in Kilicæ aquis. D. Daldorf.*

*Desc.* Statura omnino dyt. *transversalis* ,  
at duplo minor. *Caput & thorax* , nigra ,  
margine obsolete ferrugineo. *Elytra*  
glabra , lævia , nigra , nitida , frigida  
undata baseos flavescente , quæ tamen  
futuram haud attingit. In medio versus  
marginem anteriorem macula & versus  
apicem punctum , ferruginea. *Pedes*  
picei.

**Hæmorrhoidalis. D.** ( l'hémorrhoidale ) niger , thorace ely-  
trorumque basi apiceque , ferrugineis.

*Mantiff. Dyt. 27.*

*Hab. in Kilicæ aquis. D. Daldorf.*

*Desc.* Magnitudo dyt. uliginosi. *Caput*, cum antennis, obscure ferrugineum. *Thorax* ferrugineus, margine antico nigro. *Elytra* lævia, nigra, basi apiceque, obscure ferruginea. *Corpus* nigrum, *pedibus* ferrugineis.

**Dorsalis. D.** ( le dorsal ) capite thoracis margine elytrorumque puncto baseos distincto margineque inæquali ferrugineis. *Mant.* *Dyt.* 36.

*Hab.* in Kiliæ aquis. *D. Daldorf.*

*Desc.* Nimis affinis dyt. 6-pustulato, at major & puncto tantum unico distincto baseos. *Pedes* ferruginei.

**Picipes. D.** ( le picipede ) niger, thorace antice ferrugineo, elytris flavo lineatis. *Mant.* *Dyt.* 40.

*Hab.* in Germaniæ aquis. *D. Hybner.*

*Desc.* Parvus. *Caput* nigrum, ore ferrugineo. *Thorax* antice ferrugineus, postice niger. *Elytra* lævia, nigra, lineis plurimis flavescentibus. *Corpus* nigrum, *pedibus* piceis.

**Chrysomeli- D.** ( le chrysoméline ) supra cinereus, nus. subtus niger. *Mantiff.* *Dyt.* 42.

*Hab.* in Germaniæ aquis. *D. Schneider.*

*Desc.* Parvus. *Caput*, *thorax*, *elytra* lævia, obscure cinerea, immaculata. *Corpus* nigrum. *Pedes* cinerei, femoribus nigris.

**Halenfis. D.** ( de Hall. ) ater, thorace rufo, baseos medio nigro, puncto rufo, elytris cinereis nigro striatis. *Mantiff.* *Dyt.* 44.

*Hab.* in Germaniæ aquis. *D. Hybner.*

*Desc.* Parvus planus. *Caput* rufum imma-

culatum. *Thorax* rufus, in medio ad basin macula magna nigra & in hac punctum rufum. *Elytra* cinerea, striis plurimis approximatis, confluentibus, imprimis ad futuram nigris, quæ tamen nec basin nec apicem attingunt. *Corpus* atrum, *pedibus* rufis.

Confluens. D. ( le confluent ) niger, capite thoraceque ferrugineis, elytris pallidis, lineis quatuor disci nigris. *Mantiff. Dyt.* 46.  
*Hab.* Kilix. D. *Daldorf.* Halæ. D. *Hybner.*  
*Desc.* Parvus. *Caput* & *thorax* obscure ferruginea, immaculata. *Elytra* pallida, in medio lineolis quatuor postice confluentibus nigris. *Pedes* flavescèntes.

Obliquus. D. ( l'oblique ) ferrugineus, elytris maculis quinque obliquis fuscis. *Mantiff. Dyt.* 47.

*Hab.* in Kilix aquis. D. *Daldorf.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Caput*, *thorax*, *corpus*, ferruginea. *Elytra* ferruginea, maculis quinque elongatis, obliquis, fuscis, exteriore hamata. *Pedes* ferruginei.

Impressus. D. ( l'imprimé ) oblongus flavescens, elytris cinereis, punctis impressis striatis. *Mantiff. Dyt.* 48.

*Ad. Hall.* 1. 312. dytiscus impresso punctatus.

*Hab.* in Europæ aquis.

*Desc.* *Corpus* magis oblongum, antice attenuatum. *Corpus*, *caput*, *thorax*, flavescèntia, oculis folis nigris. *Elytra* cinerea, striis plurimis punctorum impressorum.

Crassicornis. D. ( le crassicorne ) fuscus capite thora-

ceque flavis, antennis medio incrassatis.

*Mantiss. Dyt. 52.*

*Myll. prod. 1001. dan. 779. dytiscus crassicornis.*

*Hab. Lipsiæ. D. Prof. Laske.*

*Desc. Parvus. Antennæ singulares, flavæ, articulo medio incrassato, & uti videtur, fissio. Caput & thorax, flava immaculata. Elytra fusca, basi parum flavescencia.*

**Pictus. D.** ( le peint ) ferrugineus, thorace nigro, elytris pallidis, futura maculaque laterali nigris. *Mantiss. Dyt. 53.*

*Hab. in Germaniæ aquis. D. Hybner.*

*Desc. Minutus. Caput & corpus ferruginea. Thorax niger, margine parum ferrugineo. Elytra glabra, lævia, flavescencia, futura lata maculaque magna laterali nigris.*

### Carabus.

**Convexus. 13. C.** *Desc. Corpus car. violaceo duplo minor, totum atrum, læve.*

**Catenulatus. 14. C.** *Desc. An sit car. intricatus Linn. ex ejus descriptione eruere non possum? Hortensis certe non est, ut striæ & puncta minime excavata, sed elevata & catenulis similia, docent. Præterea huic thorax prioris, sed angulis posticis longioribus & dentiformibus. Inter marginem exteriorem & ei viciniam feriem punctorum, sunt plures quam tres lineæ longitudinales. Corpus pedesque nigri.*

**Purpuraf- 15. C.** *Desc. Nigro-violaceus, elytra subtilissime striata.*



- Rufipes. 48. C. ( le rufipede ) *Desc. Elytra punctato-striata. Pedes rubelli.*
- Flavipes. 49. C. ( le flavipede ) *Corpus nigrum læve. Antennæ pedesque flavescentes. Elytra lævia.*
- Vinearum. 50. C. *Desc. Corpus viridescente-nigrum. Thorax postice foveatus. Puncta inter antennis duo. Elytra striis octo punctato-striatis.*
- Agrorum. 51. C. *Desc. Aurato-viridis, punctulatus. Antennæ pallide fulvæ. Elytra striis octo.*
- Lucorum. 52. C. *Desc. Totus lævis. Puncta tria longitudinaliter disposita ad futuram elytrorum.*
- Bicolor. 53. C. *Desc. Rubella sunt, antennæ, oculi, pedes. Caput thoraxque viridia. Elytra basi fulva, apice viridia, striis octo. An varietas præcedentium?*
- Thoracicus. 54. C. *Desc. Affinis car. 6-punctato, & forte mera ejus varietas. Caput elytraque viridia. Thorax rubro-cupreus.*
- Equestris. 55. C. *Desc. Niger. Thorax scaber, cordatus, niger. Elytra striis novem punctatis, fascia nigra cruciformi futura interrupta.*
- Crucifer. 56. } C. *Desc. An species, an præce-*  
 Quadrifer. 57. } *dentium varietates? Vix nisi colore differunt.*
- Minutus. 58. C. *Desc. Minimos inter ordinandus. Totus niger lævis, immaculatus.*

- Piger*. 63. *C. Desc.* *Niger*. *Thorax* late marginatus, minime cordatus, pollice foveis duabus. *Elytra* striis octo punctulatis.
- Viridulus*. 65. *C. Desc.* *Præcedenti* similis. *Elytra* lævia. *Corpus* viride nitidum. *Antennæ* pedesque fuscii.
- Luctuosus*. 68. *C. Desc.* *Niger*. *Thorax* latitudinem elytrorum æquat, lævis. *Elytra* striis octo lævibus. Variat antennis pedibusque fuscis.
- Sericeus*. 70. *C. Desc.* *Niger*. *Antennæ* basi rubrofuscae. *Thorax* elytraque punctulata, villosula. *Pedes* rubro-fusci.
- Leporinus*. 72. *C. Desc.* *Nimum car. sericeo* affinis; sed *elytra* minime sericea, striis 3a, 5a, ultimaque punctis impressis.
- Ruficornis*. 77. *C. Desc.* *Affinis car. leucophthalmo*. *Antennæ* palpique obscure rufi. *Elytra* profunde sulcata. *Corpus* subtus castaneo-fuscum.
- Rufipes*. 78. *C. (le rufipede)* *Desc.* *Caput thoraxque* fusca nitida. *Antennæ* rubro-flavæ. *Corpus* infra castaneo-fusca. *Elytra* striis longitudinalibus concavis. *Pedes* rufescentes.
- Æneus*. 79. *C. Desc.* *Antennæ* fuscae, basi rufæ. *Caput thoraxque* nigro-caprea, nitida. *Corpus* subtus nitens, nigrum. *Elytra* fere lævia, capiti thoracique concoloria, striis septem longitudinalibus vix conspicuis.

Bimaculatus. 80. C. (le bimaculé) Desc. Corpus fulvius, antennæ pedesque, aurantio - lutea. Caput, thorax nigra nitida. Elytra itidem nigra, longitudinaliter striata, basi macula ovata ochracea.

4-Punctatus. 81. C. (le quadripunctué) Desc. Totus æneo-niger nitidus. Elytra subtilissime striata, punctis quatuor concavis prope marginem interiorem. Abdomen breve, ovarum.

Arenarius. 82. Desc. Statura omnino car. caliginosi. Maxillæ exsertæ, pallidæ, apice nigræ. Caput pallidum, oculis testaceis. Thorax obcordatus; antice posticeque truncatus, immaculatus. Elytra striata, pallida, maculis duabus communibus angulatis, atris. Pedes pallidi.

Madidus. 83. C. Desc. Statura & magnitudo car. leucophtalmi. Corpus atrum, quasi humore inunctum. Antennæ apice fuscescentes. Thorax basi puncto majori utrinque excavatus. Abdomen obtusum.

Spinibarbis. 84. C. Desc. Statura car. cuprei. Caput prominens, ore antennisque rufis.

Pilicornis. 85. C. Desc. Statura præcedentis. Antennæ pilis longioribus hirtæ, ferrugineæ, primo articulo æneo. Thorax rotundatus, æneus, postice utrinque impressus. Elytra ænea, striata punctisque tribus impressis. Pedes rufi, femoribus nigris.

Azureus. 86. C. Desc. Statura car. lati. Elytra striata,

Pallens. 87. *C. Desc.* Statura & magnitudo car. vulgaris. *Totus pallidus. Elytra striata.*

Æneus. 88. *C. Desc.* Statura & magnitudo car. cuprei. *Caput*, cum antennis, ferrugineum, oculis verticeque nigris. *Thorax* transversus, canaliculatus, æneus, nitens. *Elytra* striata, ænea, nitida immaculata. *Subtus totus* pallide ferrugineus.

Limbatus. 89. *C. Desc.* Magnitudo car. melanocephali, at latior. *Antennæ* pallidæ. *Caput* virescens, linea frontali antice bifida, albida. *Os* testaceum, maxillis apice nigris labioque albo. *Thorax*, latitudine fere elytrorum, viridis, margine antico & laterali pallidis. *Elytra* viridia, margine pallido, a quo fasciæ duæ flexuosæ abbreviatæ exeunt. *Corpus* testaceum, *pedibus* pallidis.

*Ad. soc. Berol. phys. 4. t. 7. f. 4.*

Andrææ. 90. *C. Desc.* Statura omnino car. crucis minoris. *Elytra* apice parum fusca. *Pedes* pallidi. Fascia in medio elytrorum ad futuram dilatata.

Rufescens. 91. *C. Desc.* Parvus, totus ferrugineus, solo vertice anoque nigris.

2-Pustulatus. *C.* ( le bipustulé ) *Desc.* Statura omnino & magnitudo car. crucis majoris. *Antennæ* thorace longiores, nigræ. *Thorax* rotundatus, ater, villosus, punctatus. *Elytra* obtusa, crenato-striata, villosa, nigra, maculis duabus magnis rubris, quarum anterior major ad marginem anteriorem, posterior orbiculata.

4-Guttatus. *C. Desc.* Differt manifeste a car. quadri-

*maculato. Elytra* haud obtusa. *Thorax* valde rotundatus, ater. *Tibiae* pallidae.

Affinis. 96. *C. Desc.* Car. lato simillimus, sed major.

Teutonus. 97. *C. Desc.* Similis præcedenti. *Caput* nigrum nitens, sed *palpi* inferiores ferruginei, superiores fuscii. In media fronte punctum impressum, sæpe tamen oblitteratum. *Antennæ* nigræ, articulis primo & secundo ferrugineis. *Thorax* aurantius glaber, latus, marginatus, non tamen cordatus. *Elytra* fulva, postice macula magna profunde cyanea, plus quam dimidia elytra occupante, margine tamen exteriori elytrorum fulvo usque ad apicem; striæ in singulo elytro novem, non punctatæ. *Subtus* cæruleo-niger est, *pectore* aurantio, *pedibus* ferrugineis.

Eques. 98. *C. Desc.* Elegantissimorum hujus generis animalium unum, nec tamen decipienti auro ingratum foetorem contgens. *Caput* nigrum, punctis sparsis copiosis. *Thorax* perfecte cordatus, levissime marginatus, saturate fulvus. *Elytra* rufa, & obsolete striata sub-tomentosa. Circa eorum medium atra macula magna, cum ea, quæ in altero existit elytro, fasciam constituens, quam tamen futura, ibi adhuc fulva, dirimit; haud procul ab apice alia macula similis cum priori ope marginis exterioris inter utramque atri cohærens, & cum socia, nihil jam prohibente futura, fasciam continuam constituens. Sinus inter utramque maculam pallidius fulvus, & fere albidus, uti



& apices. Præterea in basi cujusvis elytri ad marginem anteriorem macula atra. *Abdomen* profunde cyaneum, minutissime punctatum; *pedus* aurantium; *femora* basi ferruginea, apice nigra; *tibiæ*, basi & apice, nigrae, medio ferrugineæ.

Quadrifria-99. C. Desc. Nitidus, nigro-fuscus. *Thorax* elytraque obscure castanea, nitidissima. *Elytra* prope marginem tantum interiorem striis quatuor longitudinalibus percurreuntur, reliquo elytro lævi.

Cordatus. 100. C. Desc. Caput & thorax fusco-virent & valde nitent. *Antennæ* basis fusco-rufa. *Elytra* striata ut in priore æneo-virentia. *Corpus* subtus fusco-virens. *Tibiæ* fusco-rufescentes, spinosociliatæ.

Junceus. 101. C. Desc. Sub nomine carabi *spinipedis minoris* missus etiam a Doctiss. & R. P. *Podæ*. *Antennæ* villosæ, apice piceæ. *Elytra* striata, striis elevatis (9), infra apicem in margine externo obiter erosis. *Tibiæ* piceæ, spinosæ.

Salicinus. 102. C. Desc. Ubi niger, ubi lucidior. *Elytra* villosula, punctata striataque. *Tibiæ* & manus spinosæ.

Arenarius. 103. C. Desc. Pediculo vix duplo major, nitidissimus. *Antennæ* villosæ. *Elytra* punctatim striata. *Tibiæ* & manus ciliato-spinosæ.

#### Majores.

Variolosus. C. ( le variolé ) apterus ater, elytris punctis

punctis variolosis impressis. *Mantiss.*  
*Carab.* 4.

*Hab.* in Transylvania. *D. Saldoner.*

*Desc.* Magnus, totus ater. *Antennæ* nigrae, apice fuscae. *Thorax* planus, marginatus, fere quadratus, ater immaculatus. *Elytra* connata, punctis magnis variolosis sparsis, tunc inde confluentibus impressis. *Corpus* atrum:

**Purpuraf- C.** ( le pourpré ) apterus ater, thoracis elytrorumque margine violaceo, elytris striatis. *Mantiss.* *Carab.* 6.

*Hab.* in Germania. *D. Schulz.*

*Desc.* Magnus, a car. violaceo omnino distinctus. *Elytra* haud connata, at absque alis, striata, nigra, margine purpureo.

**Hispanus. C.** ( l'Espagnol ) apterus niger, thorace cyaneo, elytris rugosis aureis. *Mantiss.* *Carab.* 8.

*Hab.* in Hispania. *D. Vahl.*

*Desc.* Statura omnino car. cyanei. *Corpus* atrum. *Thorax* supra cyaneus. *Elytra* subrugosa, aurea, margine cyaneo. *Pedes* atri:

**Arvensis. C.** ( le campagnard ) apterus nigro-cupreus, elytris striatis punctis excavatis triplici serie. *Mantiss.* *Carab.* 18.

*Hab.* in Germania. *D. Schneider.*

*Desc.* *Corpus* atrum, nitidum. *Antennæ* atræ. *Caput*, *thorax* obscure cuprea. *Elytra* striata obscuriora, margine cupreo punctisque excavatis triplici serie:

**Reticulatus. C.** ( le réticulé ) alatus niger, elytris reticulatis viridi-æneis, thoracis margine virescente. *Mantiss.* *Carab.* 33.

*Hab.* in Europa. *Mus. D. Zschuck.*

*Insect. Tomus IV.*

Z

*Desc.* Statura & magnitudo car. *inquisitoris*. *Caput*, cum antennis, nigrum, ultimo articulo ferrugineo. *Thorax* nigricans, margine reflexo aureo. *Elytra* subtilissime reticulata, viridia, micantia. *Pedes* nigri.

*Minores.*

**Sabulosus. C.** ( des sables ) pallidus, capite coleoptrorumque macula dorsali, nigris. *Mantiss. Carab.* 47.

*Hab.* in Saxoniae fabuletis. *Mus. D. Romani.*

*Desc.* *Caput* atrum, nitidum, mandibulis pallidis apice nigris. *Antennæ* pallidæ. *Thorax* cordatus, pallidus. *Elytra* striata pallida, macula magna communi nigra a basi ultra medium ducta. *Corpus* nigricans. *Pedes* pallidi.

**Flavicornis. C.** ( le flavicorne ) niger, thoracis margine, antennis pedibusque flavescens. *Mantiss. Carab.* 50.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* *Medius.* *Caput* atrum, antennis flavescens. *Thorax* cordatus ater, margine flavo. *Elytra* striata nigra, in altero sexu basi ad futuram rufa. *Pedes* flavescens.

**2-Notatus. C.** ( le frontal ) ater, capite, punctis duobus frontalibus rubris, antennis basi flavis. *Mantiss. Carab.* 54.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Statura & magnitudo fere car. *ruficornis*, totus ater. *Caput* læve, nitidum, punctis duobus impressis & inter hæc puncta duo minutissima uti in dytisco 2-pustulato. *Thorax* lævis, glaber. *Elytra* striata.

**Lateralis.** C. ( le latéral ) niger, thorace elytrorumque margine ferrugineis. *Mant. Carab.* 55.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Caput nigrum, antennis ferrugineis basi nigris. Thorax ferrugineus, margine antico posticoque lateribusque ante marginem nigris. Elytra striata nigra, margine ferrugineo basi latiori. Pedes ferruginei, femoribus nigris.

**Holoseri-** C. ( le foyeux ) holosericeo-niger, capite ceus. æneo nitido. *Mantiss. Carab.* 52.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Caput æneum, nitidum, ore antennisque nigris. Thorax & elytra quasi holosericea, minime nitida. Elytra striata. Pedes nigri.

**Lepidus.** C. ( l'agréable ) viridi-æneus, thorace quadrato postice utrinque bifstriato, elytris striatis. *Mantiss. Carab.* 67.

*Leske iter.* I. 17. 8. tab. A. fig. 6. carabus lepidus.

*Hab.* in Lusatia arenosis. *Prof. Leske.*

*Desc.* Magnitudo & statura omnino ceræulescentis. Corpus nigro-violaceum, supra viridi æneum, nitidum. Antennæ pedesque nigri. Thorax quadratus canaliculatus & utrinque lineolis duabus approximatis impressis. Elytra striata. Tibiæ anticæ apice parum incrassatæ.

**Erythrocephalus.** C. ( l'érythrocéphale ) niger, capite rufo, antennis pedibusque flavis. *Mantiss. Carab.* 72.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Medius. Caput rufum, nitidum. Thorax glaber nitidus, niger, immaculatus. Elytra striata, nigra. Pedes & antennæ flavescents.



**Oblongo-** C. ( l'oblong - ponctué ) niger , elytris  
**punctatus.** striatis , punctis dorsalibus plurimis  
 impressis. *Mantiff. Carab.* 80.

*Hab.* Hafniæ. *D. Lund.*

*Desc.* Medius , ater. *Caput & thorax*  
 atra , nitida , immaculata. *Elytra* obscu-  
 riora , striata , punctis plurimis dorsa-  
 libus impressis. Margo exterior itidem  
 punctatus.

**Nigricornis.** C. ( le nigricorne ) niger , thorace cupreo ;  
 elytris striatis viridibus , pedibus piceis.  
*Mantiff. Carab.* 82.

*Hab.* in Dania. *D. Schestedt.*

*Desc.* Statura omnino car. 6-punctati ,  
 at paullo major. *Caput* viridi-æneum ,  
 ore antennisque nigris. *Thorax* cupreus ,  
 nitidus , linea dorsali punctoque utrin-  
 que impressis. *Elytra* striata , viridia.  
*Corpus* nigrum , cæruleo nitidum. *Pedes*  
 picei , apice nigri.

**Nitidulus.** C. ( le brillant ) niger , elytrorum margine  
 æneo nitido. *Mantiff. Carab.* 88.

*Hab.* in Kamshatka. *D. Banks.*

*Desc.* Statura & magnitudo car. cuprei.  
*Caput & thorax* cordatus , nigra , cu-  
 preo colore nitentia. *Elytra* striata ,  
 striis alternis punctatis , ad futuram  
 nigra , in medio longitudinaliter cu-  
 prea & a medio ad marginem ænea ,  
 nitida. *Pedes* nigri.

**Hæmorrhoi-** C. ( l'hémorrhoidal ) thorace suborbiculato ;  
**dalis.** elytris nigris apice rufis. *Mant. Car.* 97.

*Hab.* Dresdæ. *Mus. D. Romani.*

*Desc.* *Antennæ* rufæ , apice nigricantes.  
*Caput & thorax* rufa , immaculata.  
*Elytra* vix striata , atra , nitida , apice  
 rufa. *Corpus* rufum.



**Picipes. C.** ( le picipede ) thorace rotundato ater nitidus, elytris fuscis, pedibus ferrugineis. *Mantiss. Carab.* 98.

*Hab.* in Suecia. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Parvus, oblongus, agilis. *Corpus* atrum. *Thorax* rotundatus, lævis, nitidus. *Elytra* striata, fusca. *Pedes* ferruginei.

**Agilis. C.** ( l'agile ) thorace rotundato rufus; elytris abdomineque nigris. *Mantiss. Carab.* 99.

*Hab.* Upsaliæ. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Corpus* rufum, *elytris abdomineque* nigris.

**Viridanus. C.** ( le verdâtre ) viridi-æneus, elytris ferrugineis, macula communi nigro-ænea. *Mantiss. Carab.* 105.

*Hab.* in Germaniæ quisquiliis.

*Desc.* Statura car. *vaporariorum*. *Caput & thorax* viridi-ænea, lævia, nitida. *Elytra* striata, ferruginea, macula magna postica communi, nigro-ænea. *Pedes* ferruginei.

**Prasinus. C.** ( le vert ) niger, capite thoraceque viridi-æneis, elytris macula magna communi postica nigra. *Mant. Carab.* 109.

*Thunb. nov. sp.* 4. 74. fig. 87. carabus prasinus, thorace capiteque cyaneis, elytris rubris postice macula communi fusca.

*Hab.* Hafniæ. *D. Pflug.*

*Desc.* Statura omnino car. *vaporariorum* & paullo major. *Antennæ* nigræ, articulo primo ferrugineo. *Caput & thorax* viridi-ænea, glabra, nitida. *Elytra* striata, rufa, macula magna communi nigra a medio futuræ ad apicem. *Corpus* nigrum. *Pedes* rufi.

**Dorsalis. C.** ( le dorsal ) thorace rotundato nigro , coleoptris pallidis , macula magna dorsali nigra. *Maniff. Carab.* 116.

*Hab.* Kilicæ. *D. Deldorf.*

*Desc.* Parvus. *Caput & thorax atra , nitida , margine tamen tenuissime pallescente. Elytra subtilissime striata , nitida , pallida. Corpus nigrum. Antennæ & pedes ferruginei.*

**Angustatus. C.** ( l'étoit ) thorace cylindrico cyaneo , elytris testaceis apice nigris. *Mantiff. Carab.* 122.

*Hab.* in Germania. *D. Schneider.*

*Desc.* Parvus , vix hujus generis. *Antennæ testaceæ , nigrae , basi flavæ. Caput magnum , ovatum , atrum , nitidum. Thorax elongatus , cylindricus , cyaneus , immaculatus. Elytra vix striata , testacea , apice nigra. Corpus nigrum. Pedes testacei , geniculis nigris.*

### *Tenebrio.*

**Culinaris. 3.** *T. Fab.* 15. alatus ferrugineus , elytris striatis , cyaneo emarginato.

**Rostratus. 16.** *T. Fab.* carabus rostratus , apterus , elytris lævibus nigris , thorace angustiore , capite angustissimo.

*Vincent. Petagn. specim. n.* 121.

*Obs.* Singulare hoc insectum rostro attelabum , thorace carabum , elytrorum figura tenebrionem repræsentat.

*Fab.* in Ulteriore Calabria. Prope Massiliam lectus. V.

**Reflexus. 27.** *T. Desc.* Statura & summa affinitas tenebrionis. *Totus ater. Thorax antice lunatus , lateribus valde marginatus.*

*Elytra* connata, striis duabus puncto-  
rum elevatorum & linea laterali valde  
carinata.

Ater. 28. T. Desc. *Thorax* antice rotundatus ;  
postice truncatus. *Elytra* striata.

Glaber. 29. T. Desc. Minor ten. *quisquilio*. *Totus*  
ater, glaber, lævissimus.

Lignarius. 30. T. Desc. *Corpus thoraxque* depressa.  
*Caput* latum, planum. Foveæ duæ in  
thorace. *Elytrorum* color variat : in  
aliis obscure violaceus, in aliis rufus.  
In omnibus *caput*, *thorax*, *pectus*  
*femoraque nigra* nitida.

Lardarius. 31. T. Desc. Vix pulice major. *Totus* luteo-  
fulvus. *Oculi* nigri. *Antennæ* articulis  
undecim. *Thorax* fere quadratus. *Elytræ*  
striis longitudinaliter concavo-punctatis.

Gemellatus. 32. T. *Totus* niger nitidus. *Thorax* lævis.  
*Elytra* striis octo per paria dispositis.

Cupreus. 33. T. Desc. Niger, supra æneus. *Thorax*  
punctulatus, convexus, valde margi-  
natus. *Elytra* striis octo punctatis,  
punctulis elongatis.

Villofus. 34. T. Desc. *Totus* castaneus. *Caput* &  
*thorax*, *elytraque* pilis raris adpersæ.

Ferrugineus. 35. T. Desc. Affinis præcedenti, sed  
minime villosus. *Antennæ* fere clavi-  
formes.

Ventricofus. 39. T. Desc. *Antennæ* villosulæ. *Caput*  
vertice depresso & complanato. *Thorax*,  
cum capite, punctatus, basi subrotunde.

truncatus, latere rotundatus, antice leniter excavatus. *Elytra* punctulata, opaca, latere inflexa, coalita, apice deflexa. *Abdomen* subtus atro-cæruleum, apice nudo s. ab elytris minime tecto. *Femora* nitida, cæruleo-violacea, subclavata. *Manus* subtus fuscescentes.

**Carinatus. T.** ( le carené ) niger, thorace orbiculato, elytris lineis elevatis tribus lævibus.

*Forst. desc. anim.* 78. 6. apterus.

*Vincent. Petagn. specim. n.* 125. t. f. 19.

*Hab.* in Egypto, & in Ulteriore Calabria.

In Gallia Aust. V.

*Desc.* Statura omnino ten. *spinosi.* Totus ater. *Thorax* rotundatus, lateribus gibbis. *Elytra* connata, striis tribus carenatis.

**Dermestoides. T.** ( le dermestoiide ) ater, thorace ovali marginato, elytris striatis. *Mantiss. Teneb.* 14.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura & magnitudo ten. *buprestoides*, at elytra striata. *Pedes* breves, compressi.

**Villosus. T.** ( le velu ) fuscus cinereo-villosus, elytris lævibus ferrugineis. *Mantiss. Teneb.* 18.

*Hab.* in Europæ quisquiliis.

*Desc.* Parvus. *Antennæ* moniliformes, nigrae. *Caput* & *thorax* fusca, cinereo villosa. *Elytra* lævia, villosa, ferruginea.

**Brunipes. T.** ( le brunipede ) ater, glaber nitidus, elytris striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Mantiss. Teneb.* 20.

*Hab. Dresdæ. D. Heisse.*

*Desc.* Parvus. *Caput* & *thorax* atra, lævia, nitida. *Antennæ* moniliformes, ferrugineæ. *Elytra* striata, nitida, ferruginea, immaculata. *Pedes* ferruginei.

**Tubercula-** T. ( le tuberculé ) niger, thorace scabro, elytris tuberculato-muricatis. *Mantiss.*  
*Pimelia* 1.

*Hab. in Europa Australiori. D. de Slanbusch.*

*Desc.* Statura omnino præcedentis, at duplo minor. *Thorax* punctis elevatis scaber. *Elytra* punctis elevatis subspinosis muricata.

**Acuminatus.** T. ( le pointu ) thorace marginato, marginibus antice posticeque spinosis, elytris lævibus carinatis. *Mantiss.*  
*Pimelia* 20.

*Hab. in Europa Australiori. D. Boeber.*

*Desc.* Statura & summa affinitas ten. spinosi. Totus ater, & elytra omnino lævia, glabra, linea unica laterali carinata.

**Barbatus.** T. ( le barbu ) niger, palpis porrectis pedibusque flavescens. *Mantiss.*  
*Helops.* 5.

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc.* Statura omnino ten. *ferrati*, at duplo minor. *Caput*, *thorax*, *elytra* striata, nigra immaculata. *Antennæ* fuscae, basi apiceque ferrugineæ. *Palpi* uti in ten. *ferrato*, porrecti, secundi formes, flavi. *Pedes* flavi.

**Canaliculatus.** T. ( le canaliculé ) niger, thorace analiculato utrinque impresso, elytris striatis, palpis porrectis. *Mantiss.* *Helops.* 6.



*Hall.* I. 326. tenebrio dubius, alatus niger, thorace fulcato, elytris striatis. *Schall. ad.*

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Schaller.*

*Desc.* Statura omnino ten. *ferrati*, totus niger. *Palpi* porrecti haud *ferrati*. *Thorax* inæqualis in medio canaliculatus, punctis utrinque impressis. *Elytra* elevato-striata. *Pedes* nigri, tarsus piceis.

*Lævis.* T. ( le lisse ) niger, thorace canaliculato postice attenuato, elytris lævibus. *Mantiss. Helops.* 7.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura omnino præcedentis. *Corpus* nigrum, minime nitidum. *Elytra* haud striata.

*Morio.* T. ( le Morio ) ater, thorace quadrato lævi, elytris punctato-striatis. *Pimelia* 17.

*Vincent. Petagn. specim. n.* 124.

*Hab.* in America Boreali & in Ulteriori Calabria.

*Desc.* Affinis ten. *nigritæ*, at paullo major. *Antennæ* apice moniliformes, articulo ultimo longiori ovato. *Thorax* lævis, quadratus, marginibus haud rotundatis, obscurus. *Elytra* punctato-striata, obscura. *Corpus* subtus & *pedes* atra, nitida.

*Ruficollis.* T. ( l'esclave ) ferrugineus, elytris striatis nigris. *Mantiss. Helops.* 19.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D. Hybner.*

*Desc.* Statura omnino ten. *quisquillii*. *Caput* obscurum, *antennis* nigris. *Corpus* & *thorax* lævis, glabra, ferruginea, nitida. *Elytra* striata, nigra.

Cyaneus. T. (l'azuré) cæruleus, thorace punctato, elytris striatis. *Mantiss. Helopsf.* 21.

*Hab.* Hafniæ. *D. Schesledt.*

*Desc.* Parvus, totus cæruleus, immaculatus. *Thorax* punctatus. *Elytra* striatopunctata. *Pedes* obscuriores.

*Meloe.*

Cichorei. 4. *M. Variat* antennis apice flavis & totis nigris. *D. Vincent. Petagn.*

Monoceros. 10. *M. Fab. notoxus* 2.

Marginatus 13. *M. Desc.* Duplo minor mel. *proscarabæo*. *Caput* nigrum, antennis moniliformibus. *Thorax* niger, margine ferrugineo. *Elytra* abbreviata, lævia, concava, nigra, margine exteriori ferrugineo. *Abdomen* & *pedes* nigra, obscure nitida, immaculata. *Alæ* nullæ.

Nitidulus. 14. *M. Desc.* Minor mel. *vesicatorio*. *Antennæ* moniliformes nigræ. *Caput*, *thorax* viridi-ænea, nitida. *Elytra* testacea, immaculata.

Festivus. 15. *M. Desc.* *Corpus* totum viridi-æneum, immaculatum. *Elytra* testacea, maculis viridi-æneis. *Maculæ* elytrorum variant.

Erythrocephalus. 16. *M. Desc.* *Caput* testaceum, linea media nigra. *Thorax* canaliculatus, linea dorsali lateribusque cinereis. *Elytra* margine, futura lineaque media cinereis.

Dubius. 17. *M. Desc.* Nimis præcedenti affinis, a quo tamen differt vertice capitis

rufus , immaculatus , thorace elytrisque atris , immaculatis.

Pedicularius. 19. *M. Desc.* Alatus niger. *Antennæ* rufofuscae , moniliformes , articulis decem. *Thorax* non marginatus , cordatus , fuscus , ad elytra ruber. *Pedes* testaceo-rufi. *Elytra* nitentia fusca , basi rubentia , glaberrima , absque striis aut punctis.

Syriacus. *M.* ( le Syrien ) alatus viridi-cæruleus , thorace luteo. *Mus. Lud. Ulr.* 102. *Gron. Zooph.* 620.

*Fab. lytta* 3. viridi-cærulea , thorace ferrugineo.

*Hab. in Europa Australiori frequens.*

4-Punctatus. *M.* ( le quadripunctué ) ater , elytris testaceis , punctis duobus nigris.

*Hab. in Russia. Mus. D. Banks.*

*Desc. Elytra* testacea , maculis duabus dorsalibus nigris.

Collaris. *M.* ( le collier ) ater , vertice , thorace pedibusque ferrugineis , elytris cyaneis.

*Mylab. Mantiss.* 3.

*Hab. in Russia Meridionali. D. Boeber.*

*Desc. Magnus. Antennæ* obscure ferrugineæ. *Caput* nigrum , fronte margineque obscure ferrugineis. *Thorax* obscure ferrugineus , margine omni parum nigro. *Elytra* cyanea , obscure nitida. *Corpus* atrum , pedibus ferrugineis.

*Obs.* Variat magnitudine. *Mas* foemina duplo minor.

Melanurus. *M.* ( le mélanure ) niger , elytris flavis , maculis quatuor apiceque nigris , antennis clavatis.

*Hab. in Europa. In Ulteriore Calabria.*

*D. Vincent. Petagn. n. 136. t. f. XIII.*

*Desc.* Simillimus, sed major mel. *cichorei*, a quo differt maculis elytrorum; duæ enim majores ad basin elytri: duæ fere in medio, quarum futuræ proxima conjuncta cum alia alterius elytri apparet, ut unicam latam maculam constituat. Apices elytrorum, fascia nigra undulata. *Alæ* fuscae, apicibus nigris.

*Obs.* Affinis videtur mel. 8. *Maculato*. V.

**Austriacus. M.** ( l'Autrichien ) niger, thorace rubro, elytris viridibus.

*Hab.* Viennæ.

*Desc.* Habitus mel. *vesicatorii*, quem magnitudine haud multum superat. *Thorax* ruber, in medio sulco longitudinali exaratus. *Elytra* mollia, flexilia, saturate viridia, prati umbrosi instar. *Alæ* fuliginosæ. *Abdomen* nigrum, violascens; sub elytris utrinque supra lineam fulva longitudinalis, ad anum non pertingens. Cæterum insectum totum lana tenui molli brevi tectum, fere ut mel. *cichorei*.

### *Mordella.*

**Abdominalis. 7. M.** *Desc.* Caput, pectus, elytra, spina analis, pedes, atra. Thorax & abdomen fulva, immaculata, nitida.

*Sulz. hist. inf. t. 7. f. 15.*

**Fusca. 9. M.** *Desc.* Fusca. Caput, thorax, elytra, flavicant, elytra tamen multo obscuriora & fere fusca. Pedes & antennarum bases flavi coloris. Oculi nigri. An varietas mord. *thoracica*?

2-Maculata. M. ( la bimaculée ) ferruginea , pectore atro , elytris testaceis , macula nigra. *Hab. in Hungaria. D. Saldoner.*

*Desc.* Magna. Caput magnum , transversum , ferrugineum , ore atro. *Antennæ* pectinatae , maris imprimis , radiis complicatis clavam simulant. *Thorax* gibbus ferrugineus. *Elytra* testacea , macula magna ante apicem nigra. *Pedus* atrum. *Abdomen* brevissimum , gibbum , ferrugineum , ano obtuso fere truncato , margine prominulo. *Pedes* ferruginei , geniculis nigris. Color maris obscurior.

*Staphylinus.*

Hirtus. 1. S. *Sulz. hist. inf. t. 7. f. 16.*

Maxillofus. 3. S. *Obs. synonymia D. F. 3. deleatur ; nostram enim observationem confirmavit D. Fab. in nova Mantiss. n. 4. V.*

Brunnipes. 27. S. ( le brunipede ) *Desc.* Statura & magnitudo staph. *politi*. *Antennæ* nigrae , articulo primo & ultimis duobus ferrugineis. *Caput* & *thorax* atra , nitida , oculis albis. *Elytra* & *abdomen* atra , at obscuriora. *Pedes* rufi.

Marginatus. 28. S. *Desc.* Statura & magnitudo staph. *politi* , at paullo minor. *Totus* ater , glaber , nitens , at *thoracis* latera & *pedes omnes* flavescunt.

Clavicornis. 29. S. *Fab. 14. Desc.* Statura & magnitudo omnino staph. 2-*guttati*. *Antennæ* moniliformes crassiores. *Thorax* rotundatus , ater , nitens lævis. *Elytra* vix punctata , atra , immaculata. *Abdomen* & *pedes* atra.



- Hypnorum.** 30. *S. Desc.* Statura staph. *fuscipedis*, at paullo minor, ater, glaber, lævis, nitens. *Thoracis* latera, imprimis basi, testacea. *Elytra* testacea, immaculata, *scutello* tamen nigro.
- Nitidulus.** 31. *S. Desc.* Duplo minor præcedenti. *Antennæ* nigrae, basi flavescentes. *Caput* & *thorax* glabra, atra, margine flavescente. *Elytra* testacea, margine nigro. *Pedes* flavescentes.
- Merdarius.** 32. *S. Desc.* Parvus. *Antennæ* ferrugineae, apice fuscæ. *Caput* atrum. *Thorax* rufus. *Scutellum* nigrum. *Elytra* rufa. *Abdomen* nigrum.
- Atricapillus.** 33. *S. Desc.* Parvus. *Antennæ* extrorsum crassiores apice fuscæ, ultimo articulo ferrugineo. *Caput* atrum nitidum. *Thorax* rufus, glaber, immaculatus. *Elytra* fusca, puncto baseos margineque postico albis. *Abdomen* ferrugineum, apice fuscum.
- Marginellus.** 34. *S. Desc.* Medius. *Caput*, *thorax*, *abdomen*, *pedes*, atra, immaculata, obscura, vix punctata. *Elytra* atra, at margine laterali & postico obscure ferrugineo.
- Rugosus.** 35. *S. Desc.* valde affinis staph. *piceo*, at paullo major. *Totus* niger. *Caput* planum. *Thorax* depressus, longitudinaliter rugosus. *Elytra* rugosa, nigra. *Pedes* nigri.  
*Obs.* Variat elytris testaceis.
- Thoracicus.** 36. *S. Desc.* minor. *Antennæ* moniliformes, extrorsum crassiores, basi pallidæ, apice

nigræ. *Caput* atrum nitidum. *Thorax* rufus nitidus. *Elytra* fusca, basi albida, margine tamen crassiori fusco. *Abdominis* segmenta picea vel potius basi nigra, apice rufescentia. *Pedes* flavescents.

[Pygmæus. 37. S. Desc. Affinis præcedenti, at minor. *Caput* atrum, nitidum. *Thorax* obscure pallidus. *Elytra* pallida, margine crassiori fusco. *Abdomen* magis nigrum.

Major. 38. S. Desc. *Totus* niger. *Thorax* convexiusculus. *Maxillæ* magnæ, duræ. *Abdomen* lateraliter villosulum.

*Fab.* staph. olens niger opacus immaculatus, capite thorace latiore.

*Raj. inf.* 109. 1.

Cærulef- 39. S. Desc. *Caput*, *thorax*, *elytra* punctulata, cærulescentia. *Antennæ*, *pedes* & *abdomen* nigra.

Macroly- 40. S. Desc. Fuscescenti-niger. *Antennæ* trones. *Caput* depressum. *Thorax* rotundatus. *Elytra* longa, subtilissime punctulata.

Chrysoce- 41. S. Desc. *Caput* luteum, oculis nigris. phalus. *Antennæ* *maxillæ*que nigricantes. *Thorax* *elytra*que obscure nigra, punctis latis impressis. *Scutellum* macula nigra cordiformi. *Abdomen* pilis rufis supra argenteo-griseis vestitum.

Flavopte- 42. S. Desc. *Palpi* *antennæ*que rufescentia. rus. *Caput* & *thorax* obscure nigra. *Elytra* rufescentia. *Abdomen* nigrum, maculis duabus

duabus lateralibus e pilis auratis, singula ad singulum latus. *Scutellum* nigrum.

**Fulvopterus.** 43. *S. Desc.* Antennæ, pedes, elytra; *castanea*. Caput thoraxque *polito-nigra*. *Elytra* punctulata. *Abdomen* fulconigrum.

**Brachypterus.** 44. *S. Desc.* Antennæ crassæ breves. *Thorax* latus ad lentem, uti elytra, punctulatus. *Elytra* pedesque fusca. Cæterum nigrum.

**Punctatus.** 46. *S. Desc.* Totus niger, exceptis antennæ fulvis. Caput, thorax, elytra ad lentem punctulata fuscoque maculata.

**Æneus.** 47. *S. Desc.* Niger nitidus. *Thorax* punctis decem impressis, oculo nudo minime conspicuis. *Elytra* ænea ad lentem punctulata.

**Maculatus.** 48. *S. Desc.* Caput nigrum. *Thorax* lateraliter luteo marginatus. *Elytra* nigra, macula lutea elongata.

**Æneocephalus.** 58. *S. Desc.* staph. *polito* minor. Antennæ fuscæ, basi ruscæ. Caput thoraxque ænea, nitida villosula. *Elytra* & abdomen obscure nigra, itidem villosula. Femora nigra, tibiis tarsisque pilis rufescentibus rectis.

**Æneus.** 59. *S.* An varietas staph. *ænei*. *D. Geoff.*

**Nitens.** 60. *S. Desc.* *Thorax* mei speciminis gerit puncta excavata majora quinque, innumera minora.

**Domicella. 61.** *S. Desc.* Niger. *Antennæ* breviusculæ extrorsum crassiores, fuscæ, basi nigræ. *Thorax* obscure castaneus, obtrusus capuciformis, leviter depressus. *Elytra* brevia, obscure castanea. Hinc habitus insecti, qui domicellæ modestioris palliolum, tali forte colore præditum, gestantis. *Abdomen* prope elytra castaneum, dein nigrum; *subtus* nitens castaneum usque ad partem abdominis, quæ supra nigra, hæc enim & subtus nigra. *Pedes* nigri.

**Blattinus. 63.** *S. Desc.* Habitus blattæ *lucifugæ* & *thorax* ita latus, marginatus, margine tamen non reflexo. Ater nitens glaber. *Thorax* lateribus pallide testaceus, lævissimus. *Elytra* fusco-castanea, lævissima, nitidissima, uti *thorax*, margine exteriori ad basin nigro. *Abdomen* nigrum, pilosum. *Pedes* lucide testacei.

**Martialis. 64.** *S. Desc.* *Caput* nigrum. *Palpi antennæ* que ferrugineæ. *Thorax* niger, margine exteriori & ad marginem posticum testudineo-ruber. *Elytra* obscure ferruginea, margine externo nigro. *Abdomen* nigrum, pilosulum. *Pedes* testaceo-rubri.

**Brassicæ. 68.** *S. Desc.* *Antennæ* extrorsum crassiores; villosæ. *Elytra* punctata.

**Arnica. 69.** *S. Desc.* *Palpi* pedibus testaceis concolores. *Antennæ* thorace duplo longiores, articulis decem apice truncatis, ultimo ovato. *Alæ* hyalinæ.

**Hellebori. 70.** *S. Desc.* Magnitudo pediculi. *Antennæ*



extrorsum crassiores. *Thorax & elytra punctata.*

**Dilatatus. S.** ( le dilaté ) thorace marginato atro nitidulo , elytris fuscis , antennis ferratis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *Prof. Leske.*

*Desc.* Major staph. erythroptero. *Antennæ* nigrae , valde ferratae & pilosae. *Caput* atrum , læve , immaculatum , maxillis forcipatis. *Thorax* lateribus posticeque valde marginatus . ater , margine præferrim variis coloribus nitidulo. *Elytra* fusca. *Abdomen* atrum. *Pedes* nigri , *tarsis anticis* brevibus dilatato-pilosis.

**Nitidus. S.** ( le luisant ) ater nitidus , elytris testaceis.

*Hab.* Kilicæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Statura & magnitudo staph. *politi* & forte ejus mera varietas. *Corpus* totum atrum , nitidum , solis *elytris* testaceis.

**Fulgidus. S.** ( le brillant ) ater nitidus , elytris planisque testaceis , capite punctulato.

*Hab.* Kilicæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Statura omnino præcedentis , at distinctus statura tenuiore , *capite* majore , punctis plurimis impressis *plantisque* testaceis.

**Analus. S.** ( le bicolor ) ater nitidus , antennis ; elytris , ano pedibusque testaceis.

*Hab.* Kilicæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Major staph. 2-pustulato. *Caput & thorax* atra , nitida immaculata. *Elytra* lævia , nitida , testacea , immaculata. *Abdomen* atrum , ano testaceo. *Antennæ & pedes* testacei.



**Canalicula-** S. ( le canaliculé ) flavus , capite abdominisque cingulo atris , thorace canaliculato.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Parvus. *Caput* atrum , *antennis* basi flavis. *Thorax* gibbus , canaliculatus , immaculatus. *Abdomen* planum , flavum , ante apicem cingulo atro. *Pedes* flavi.

**Tricolor.** S. ( le tricolor ) ater , *antennis* thoraceque rufis , *elytris* pedibusque testaceis.

*Hab.* in Daniæ boletis. *D. de Schestedt.*

*Desc.* Parvus. *Caput* atrum , nitidum , *antennis* obscure rufis. *Thorax* rufus , nitidus , immaculatus. *Elytra* testacea , immaculata. *Abdomen* nigrum. *Pedes* testacei.

**Melanocephalus.** S. ( le mélanocéphale ) ferrugineus , capite atro.

*Hab.* in Suecia. *D. Pay. Kull.*

*Desc.* Minutus. *Totus* ferrugineus , solo capite atro immaculato.

**Analus.** S. ( le tacheté ) flavus , *elytris* basi anoque atris. *Mantiss. Oxyporus.* 2.

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Parvus. *Antennæ* flavæ , apice fuscescentes. *Caput & thorax* flava , nitida , immaculata. *Elytra* flava , basi atra. *Pectus* atrum. *Abdomen* flavum , apice atrum. *Pedes* flavi.

**Abdominalis.** S. ( l'abdominal ) rufus , abdomine atro nitido.

*Sp. inf. app.*

*Hab.* in Norwagia. *D. Lund.*

*Desc.* Reliquis paullo mino. *Corpus* totum rufum. *Abdomine* solo atro , nitido.

## Forficula.

- 2-Punctata. 4. F. Desc. *Antennæ* articulis II nigris. *Caput* nigrum, postice rufum. *Thorax* marginatus niger, margine rufo. *Elytra* nigra, macula magna versus futuram albida margineque pallescente. *Abdomen* nigrum. *Forceps* acuta, recta.

Gigantea. F. ( le géant ), pallida, supra nigro variegata, ano bidentato, forcipe porrecta unidentata. *Mantiss.* 2.

*Hab.* in Europa Australiori.

*Obs.* Simillima nostræ forficulæ maximæ; ut patebit ex descriptione D. Fab. V.

*Desc.* Gigas in hoc genere. *Antennæ* multiarticulatæ, pallidæ. *Caput* pallidum, *oculis* nigris. *Thoracis clypeus* planus, quadratus, niger, margine lineaque dorsali nigra. *Pectus* pallidum. *Abdomen* nigrum, ultimo segmento pallido, dentibus duobus validis fuscis; subtus latera pallida. *Forceps* porrecta, pallida, dente pone medio apicibusque fuscis. *Pedes* pallidi.

## HEMIPTERA.

## Mantis.

- Pagana. 4. M. *Obs.* Delenda hæc species; in nova enim *Mantissa* synonymiam agnovit D. Fab. Dubium legitimum fuit; fasciculi enim D. Pallas tunc ignoti erant ipseque clariss. Fab. raphidiam *mantissam* & mantem *paganam* ad diversa genera retulerat. Errorem suspicatus fueram, ut patet ex his verbis, an hæc species propria? An *raphidia mantissa* Linæi? Sed hodiernorum Entomologorum prin-

cipis fide , nodum solvere non ausus fueram. E genere *raphidia* ad genus *mantis* transtulit *Illust. Fab.* An instrumentorum cibariorum inspectio hanc mutationem rite probat ? V.

**Sancta. M.** ( la sainte ) thoracè ferrato , viridi-flavescentia , elytris viridibus immaculatis , alis subhyalinis. *Mantiss.* 23.

*Hab. in Gallia Australiore. D. de Slanbüsch.*

*Desc.* Statura omnino mant. oratoria , at triplo minor. *Caput, thorax, abdomen* , viridi-flavescentia , immaculata. *Elytra* viridia , immaculata. *Alæ* subhyalinae , apice virescentes. *Pedes* flavescents , *tibiis anticis* subtus punctis duobus atris.

### Gryllus.

**Laxmanni. 27.** G. T. *Desc.* *Alæ* in fœmina omnino nullæ , in mare duæ parvulae reticulatae , fusca , margine crassiore versus basin pallida , sub scuto *thoracis* porrecto latentes.

**Ruso-margi-31.** G. L. *Desc.* Viridis. *Antennæ* setaceæ fusca . *Oculi* brunnei. *Thorax* lineis tribus longitudinalibus elevatis. *Elytra* viridia , postice fusco-pallida , margine exteriori pallido.

**Ruso-termi-natus. 32.** G. L. *Desc.* Præcedenti minor, obscure viridis. *Antennæ* fusca , setaceæ , corporis dimidium æquant. *Elytra* antice viridia , postice nigricante-fusca. *Thorax* lineis duabus nigris. *Abdominis* latera maculis nigris.

**Lineola. 33.** G. L. *Desc.* Magnitudo gryll. migræ

*torii. Caput fuscum, sulcatum. Thorax segmentis tribus carinatus, fuscus, carina rufa. Elytra grisea. Alæ albæ fusco reticulatæ. Femora postica lineæ interiori sanguinea, tibiis cæruleis adpersis spinis albis apice atris.*

**Germanicus. 34.** G. L. *Ræf. inf. 2. gryll. t. 21. f. 7.*  
*Desc. Corpus majus gryll. italico. Thorax subcarinatus, testaceus. Elytra testacea, fusco-maculata. Femora postica transversum striata, nigroque punctata, maculaque semilunari atra utrinque ad apicem. Tibiæ sanguineæ.*

**Thalassinus. 35.** G. L. *Desc. Caput viride, ore oculisque fuscis. Thorax lævis, viridis, antice utrinque macula magna fusca. Elytra grisea, costa baseos viridi. Femora postica viridia, fusco maculata. Tibiæ sanguineæ.*

**Cinerascens. 36.** G. L. *Desc. Affinis gryll. flavo, at duplo major. Frons virescens, ore ferrugineo. Thorax carinatus, fuscus. Elytra fuscescentia, albo punctata apice cinerea. Alæ basi flavescentes, apice late cinereæ. Tibiæ posticæ rufæ.*

**Lunatus. 37.** G. L. *Ræf. Loc. t. 20. f. 6. 7.*  
*Desc. Variat. 1°. Capite (excepta nucha), thoracis lateribus pedibusque subrubris, elytra marginæ interiore viridi, alibi fusco-nebuloso, alis fuscescentibus. 2°. corpore fusco, abdomine subtus viridi-flavo, elytris superne obscurioribus introrsum albidis, alis pallidioribus.*

**Pellucens. 38.** G. L. *Desc. Oculi nigri. Antennæ*  
 Aa iv.



corpore longiores, albidæ. *Palpi* albi, tribus articulis. *Thorax* longitudine capitis. *Alæ* corpore paullo longiores, albæ. *Pedes* albidi, subpellucidi. *Cornicula* caudæ alba.

Vesperī & tota nocte clamat, sub folio latet, adventantes observat, ad minimum strepitum tacet.

Ephippiger. G. T. ( le porte-selle ) thorace postice clavato, elytris brevissimis fornicatis. *Mantiss. Loc. 32.*

*Ad. Berol. 1784. tab. 3. fig. 6.-8. gryllus ephippiger.*

*Hab. in Europæ Australioris pratis.*

*Desc. Magnus. Antennæ* corpore triplo longiores. *Caput* viride, postice griseum. *Thorax* rotundatus, griseus, lateribus flavescens. Margo posticus dilatatus, elevatus, *elytra* abbreviata, fornicata, cinerea fere tegens. *Abdomen* cylindricum, nigrum, ense recurvo apice flavescens. *Pedes* fuscī, *femoribus* subtus flavis.

Pedestris. G. T. ( le piéton ) thorace lævi postice rotundato, elytris brevissimis apice capiteque albidis. *Mantiss. Loc. 34.*

*Hab. in Italia. Dr. Allioni.*

*Desc. Statura* præcedentis. *Antennæ* færaceæ vix corporis longitudine, fuscae, basi pallidæ. *Caput* albidum. *Thorax* fuscus, lateribus antice albidis, postice elongatus, rotundatus. *Elytra* brevissima, fusca, apicē albida. *Abdomen* fuscum, lineis duabus dorsalibus punctorum ferrugineorum. *Pedes* grisei, *genubus* posticis nigris.

An potius mera puppa, quum nostrā omnino absque ense?



Cisti. G. L. ( du ciste ) thorace scabro, crista bifida, alis rubris, fascia nigra, femoribus posticis canaliculatis. *Mantiss. Gryll.* 29.

*Hab. in cisto Halimifolio. D. Vahl.*

*Desc.* Paulo major gryll. stridulo. *Antennæ* flavescens. *Caput* nigrum, fusco varium, basi albidum. *Thorax* fusco cinereoque varius, punctis elevatis subspinosis scaber, linea dorsali antice cristata crista bifida, postice carinata. *Elytra* fusco cinereoque varia. *Alæ* basi rubræ. *Femora postica* incrassata, extus variegata, subtus canaliculata, intus flavescens, macula magna baseos atra lateribusque sanguineis. *Tibiæ* sanguineæ.

*Fulgora.*

Minuta. F. ( la petite ) fronte conica, capite thoraceque flavescens, linea dorsali, elytris albidis. *Mantiss.* 20.

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc.* Parva statura cicadæ, at omnino hujus generis. *Antennæ* breves, crassæ, extrorsum crassiores. *Corpus* totum flavescens, linea capitis thoracisque dorsali alba. *Elytra* pallida.

*Cicada.*

Gibbosa. 33. C. *Desc.* Fusca cum coloris viridis mixtura. *Caput* crassum. *Oculi* prominenti. *Alæ* reticulatæ, basi gibbosæ s. dilatatæ versus marginem exteriorem, dein in medio elevatæ, sed a lateribus versus apicem angustæ.

Pallida. 34. C. *Desc.* Pallide flava. *Thorax* antice punctis sex excavatis, per paria dispo-

fitis. *Alæ* membranaceæ, basi obscure fusca. *Pedes* nigri. *Tota* supra punctulata.

- Regalis. 35. *C. Desc.* Fusco-lutea. *Caput thoraxque* fascia lutea sinuata.
- Membrana- 36. *C. Desc.* *Caput* latum depressum, supra  
cea. pallidum. *Thorax* brevis, pallide fulvus, punctis duobus nigris antice. *Scutellum* maculis duabus triangularibus nigris. *Elytra* diaphana, postice venis fulvescentibus. *Corpus* subtus pedesque fulvescentia.
- Variegata. 37. *C. D. Desc.* *Thorax* immaculatus. *Scutellum* transverse sulcatum. *Elytra* maculis duabus albidis.
- Venosa. 38. *C. D. Desc.* Præcedente minor. *Tota* fusca. *Corpus* subtus pedesque fusca, luteo variegata. *Elytra* nervis albis.
- Fasciolata. 39. *C. D. Desc.* *Thorax* fascia lata fulvo-lutea. *Elytra* fascia pallidiore transversa in medio.
- Trifasciata. 40. *C. D. Desc.* *Caput* luteo-fuscum. *Thorax* capiti concolor, fascia transversa punctorum nigrorum in medio interrupta. *Scutellum* punctis duobus nigris maculisque duabus albis. *Elytra* alba, fasciis duabus transversis fuscis, tertia terminali.
- Transversa- 41. *C. D. Desc.* lutea. *Oculi* nigri. *Elytra*  
lis. viridescente et lutea, fasciis duabus transversis fuscis.
- Cæca. 42. *C. D. Desc.* Pallide lutea. *Oculi* nigri-  
cantes. *Abdomen* supra, oculis concolor.

**Flammigera.** 43. C. D. *Desc.* *Tota* sulphurea. *Caput* thoraxque linea longitudinali rubra. *Elytrum* singulum, fascia flexuosa rubra. *Alæ* albæ, opaleæ.

**Carpini.** 44. C. D. *Desc.* *Caput* viridi - lutescens, maculis duabus nigris. *Thorax*, qui capiti concolor, maculis duabus nigris lateralibus. *Scutellum* punctis duobus nigris quadratis. *Elytrum* singulum, maculis tribus nigris in triangulum positis, apice fuscum. *Abdomen* subtus nigrum. *Pedes* lutei.

*Obs.* Variat capite thoraceque nigris.

**Geographica.** 45. C. D. *Desc.* *Caput* luteum, punctis tribus nigris, tertio postico crassiore. *Thorax* antice maculis quatuor nigris coeuntibus cum macula magna nigra postica. *Scutellum* maculis duabus nigris. *Elytra* punctis duobus nigris in medio plurimisque maculis ovalibus. *Abdomen* fuscum. *Pedes* pallide virides.

**Spumaria-** 51. C. D. *Desc.* *Caput* thoraxque viridescente-grisea. *Oculi* nigri, *stematibus* roseis. *Corpus* subtus obscure fuscum. *Alæ superiores* viridescente - griseæ, *inferiores* diaphanæ. *Pedes* ochracei.

**Undata.** 52. C. D. *Desc.* *Corpus* citrinum. *Thorax* supra fuscus. *Alæ superiores* citrinæ, striga interiori fusca, sinuata, quæ, alis clausis, unicam fasciam format.

**Biguttata.** 53. C. D. *Desc.* *Statura* parva præcedentis. *Caput* nigrum, punctis aliquot flavis. *Thorax* niger, margine antico flavo. *Elytra* lævia fusca, puncto albo versus posteriora. *Abdomen* atrum, ano ruf.

- Turca. 54. C. D. Desc. Gigas in hoc genere.  
*Caput* atrum, *antennis* crassis, ferrugineis. *Thorax* ater, *scutello* carinato, acuto. *Abdomen* flavescens supra, basi atra. *Elytra* coriacea, nervosa, atra, apice fusca, punctis aliquot minutissimis albis. *Alæ* atræ, basi maculis tribus ferrugineis, apice fuscæ, lunula magna hyalina. *Pedes* nigri, *femoribus posticis* flavis.
- Serratulæ. 55. C. D. Desc. Parva. *Caput* flavum, puncto verticali nigro. *Scutellum* margine nigro. *Elytra* albida, puncto baseos fasciisque duabus apicis nigris.
- Fulgida. 56. C. D. Desc. Parva, flava. *Thorax* fuscus. *Elytra* fusco-aurata, margine flavescente. Macula communis dorsalis albida in medio.
- Quercus. 57. C. D. Desc. Minuta. *Caput & thorax* flavescencia, *oculis* nigris. *Elytra* itidem flavescencia, maculis quatuor oblongis sanguineis. Apex macula magna dentata fusca. *Alæ* albæ.
- Gibba. 59. C. D. Desc. *Thorax* postice emarginatus. *Scutellum* acutum.
- Unifasciata. 60. C. D. Desc. Major præcedenti. *Corpus* cinereum, fascia elytrorum obliqua fusca pone medium. *Abdomen* supra atrum.
- Muscaefor- 61. C. D. Desc. *Caput* brevissimum, elevatius, fronte quadrata; si supra inspiciatur, fere habitu capitis muscæ. *Os*, seu capitis pars inferior, angulatum, utrinque nempe ad angulos



rectos sectum, & carina in medio; lineæ laterales transversæ nullæ; ante rostri apophysin fascia flava, ipsa apophysi rufo-fusca rostro cinereo, apice nigro. *Thorax* brevissimus, albidus, in medio punctulis duobus majusculis excavatis. *Elytra* obscure cinerea, basi fasciæque alba; sed fascia, antequam in singulo elytro marginem interiorem attingat, nonnihil de candore amittit. Regio inter basin fasciamque dictam nigra, fasciæque post albam nigra angustior. *Alæ* valde fuliginosæ.

Quadrima- 64. C. D. *Desc.* Color totius flavescens; seu flavo-ferrugineus, præter maculas albas in elytris, oculos nigros, punctaque duo minuta nigra in fronte. Non est tamen cicada *populi* Linn. cum qua quidem multum convenit.

Hemorrhœa. 67. C. D. *Desc.* Sæpe macula unicâ fulva in medio thoracis, plerumque duæ, hinc una inde altera. Nonnunquam una in medio, sed *thoracis* lateribus rubescentibus. Sæpe *elytra* apicem versus testudineo-rufa, subinde apice elytris concolore, sæpius tantum testaceo maculato. Cætera *totum* animal aterrimum.

Lineata. C. (la rongée) pallida, capite thoraceque nigro punctatis, elytris lineatis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Statura omnino cic. *interruptæ*. *Caput* & *thorax* pallida, punctis plurimis sparsis nigris. *Elytra* pallida, lineis varie anastomosantibus nigris. *Pedes* pallidi, *femoribus* fascia nigra.



**Abbreviata.** C. ( la courbe ) flavescens , elytris cinereis , vitta abbreviata atra.

*Hab.* Hafniæ. *D.* Lund.

*Desc.* Statura præcedentis. *Caput* & *thorax* flavescencia , immaculata. *Elytra* cinerea , vitta fere marginali a basi ultra medium ducta margineque anguli ani atris. *Abdomen* pedusque disco atro. *Pedes* flavescences.

**Striata.** C. ( la striée ) nigra , capite fasciis duabus flavis , elytris albo striatis.

*Hab.* in Kiliæ plantis.

*Desc.* Statura cic. *viridis*. *Caput* subtus flavum , supra nigrum , fasciis duabus flavis , altera ante apicem , altera baseos. *Elytra* nigra , striis plurimis albis. *Corpus* nigrum. *Pedes* flavescences.

**Maculata.** C. ( la tachetée ) grisea , elytris punctis apiceque fuscis , alis albis apice fuscis.

*Hab.* in Europa.

*Desc.* Statura & magnitudo cic. *rosæ*. *Caput* & *thorax* grisea immaculata. *Elytra* grisea fusco maculata apiceque fusca , nervis albo nigroque punctatis. *Alæ* albæ immaculatæ , apice fuscescentes. *Abdomen* atrum , corniculo parvo inflexo caudaque bifida sub ano inserta. *Pedes* flavi.

**Nitidula.** C. ( la brillante ) elytris pallide auratis albo nigroque punctatis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Parva. *Rostrum* nigrum , lineola media flavescence. *Caput* flavum , punctis quatuor atris in medio. *Thorax* antice flavescens , postice fuscescens. *Scutellum* flavum. *Elytra* pallide aurea ,

punctis aliquot albis nigrisque, imprimis ad margines.

**Fasciata. C.** ( la fasciée ) flavescens, elytris obscuris, fascia maculisque duabus oppositis albidis. Cercopis 18 Mantiss.

*Hab.* Kiliæ. D. Daldorf.

*Desc.* Statura & magnitudo cic. *biguttatæ*. *Caput*, *thorax*, *scutellum*, *pedes* flavescencia. *Abdomen* atrum. *Elytra* obscura, fascia media maculisque duabus pone fasciam marginalibus oppositis flavis. *Alæ* hyalinæ.

*Cimex.*

**Semipunctatus. 7. C.** *Desc.* *Caput* acuminatum, flavum; lineis duabus marginalibus nigris, quæ tamen apicem haud attingunt. *Thorax* rotundatus, flavus, punctis decem nigris 4, 4, 2. Lineola parva nigra utrinque ad basin. *Scutellum* magnum flavum, lineis quatuor nigris lateralibus abbreviatis. *Subtus* flavus nigropunctatus. An species? An cic. *lineati* varietas?

*Stoll. cimic. t. II. f. 8.*

**Pedemontanus. 8. C.** *Desc.* Paullo minor cim. *grammico*. *Caput* obscure fuscum immaculatum. *Thorax* & *scutellum* fusca, atomis sive punctis parvis numerosissimis sparsis albis. *Pedes* nigri.

**Litura. 9. C.** *Desc.* Statura & summa affinitas cim. *fuliginosi*, at *scutellum* lineolis s. lituris tribus albis, quarum posterior solitaria brevior.

**Hottentotta. 10. C.** *Desc.* Major cim. *mauro* & latior;

distinguitur facillime colore toto obscure ferrugineo, minime nitido.

- Albo-linea- 11. *C. Desc. Minor. Caput* griseum, *stria* media albida. *Thorax* griseus, *striis* quinque fere obsoletis, imprimis intermediis duabus. *Scutellum* griseum, *striis* quinque marginibusque albis. *Abdomen* fuscum, *marginibus* griseo, *punctis* aliquot albis.
- Secalinus. 12. *C. Desc. Fuliginosus. Abdomen* *marginibus* nigrum.
- Cappatus. 13. *C. Desc. Niger*, *punctatus*.
- Serratulæ. 23. *C. Desc. Parvus. Antennæ* triarticulatæ; filiformes. *Caput & thorax* atra. *Elytra* pallida, *punctis* duobus nigris. *Alæ* albæ, *apice* fuscæ. *Pedes* rufescentes.
- Lævis. 24. *C. Desc. Statura cim. corticalis*, at duplo minor. *Caput & thorax* nigra, immaculata. *Abdomen* brunneum, *marginibus* integro. *Alæ* angustæ, pallidiores.
- Crassipes. 25. *C. (la crassipede) Desc. Affinis videtur cim. erosø Linnæi. Antennæ* flavæ, clavatæ. *Caput* fuscum, *apice* fissum. *Thorax* niger, scaber. *Elytra* fusca, *alis* pallidis. *Abdomen* postice dilatatum, marginatum, acutum, basi nigrum, *marginibus* albo, *apice* flavescens. *Pedes* flavi, *tibiis anticis* incrassatis.
- Umbracu- 26. *C. (l'ombragée) Desc. Magnitudo* præcedentis. *Caput* marginatum, ferrugineum, *ore* flavescente. *Thorax* marginatus, ferrugineus, *puncto* *marginali* albo. *Scutellum* ferrugineum, *apice*

apice album. *Elytra* immaculata. Margo *abdominis* albo nigroque varius. *Abdomen* subtus flavescens, maculis baseos utrinque duabus & anali solitaria.

Chelifer. 27. *C. Desc.* Fuscus. *Caput* parvum. *Antennarum* articulus ultimus fere clavatus. *Thorax* latus, marginibus reflexis, pollice latior, sulcis quinque. *Pedes* antici breves, apice cheliformes.

Appendiceus. 28. *C. Desc.* *Caput* parvum albidum, vel fuscum. *Thorax* alis tribus magnis, elevatis, albis, fusco-reticulatis, lateralibus compressis carinatis. acutis; intermedia globosa, brevior. *Scutellum* elevatum; foliaceum, acutum, album, macula fusca baseos. *Elytra* reticulata, alba, fusco maculata, basi gibba. *Pedes* albi.

Fimbriatus. 37. *C. Desc.* *Thorax* scaber, marginibus spinosis, fimbriatis. *Pedes*, imprimis femora, spinosa.

Sanguineus. 39. *C. Desc.* Statura omnino cim. *grisei*. *Antennæ* nigrae, articulo ultimo basi pallido. *Caput* & *thorax* obtuse spinosus, fusca, immaculata. *Scutellum* fuscum, macula fusca utrinque ad basin flava, apiceque album. *Abdomen* subtus flavum, fusco maculatum, margine albo nigroque vario. *Pedes* rufi.

Luridus. 40. *C. Desc.* Major cim. *baccarum*. *Antennæ* fusca, articulo penultimo apice albo. *Caput* virens, apice late emarginatum. *Thorax* obtuse spinosus, virescens, dorso griseo. *Scutellum* basi virens, apice griseum. *Elytra* grisea,



macula fusca posticeque terminantur puncto albo. *Abdominis* margo nigro rufoque varius. *Subtus* flavescens, nigro punctatus.

**Nigricornis 41.** C. ( la nigricorne ) *Desc.* *Antennæ* nigræ. *Corpus* mox ferrugineum, mox griseum, *spinis thoracis* semper nigris. *Pedes* pallidi.

**Albipes. 42.** C. ( l'albipede ) *Desc.* *Statura* præcedentis. *Corpus* supra nigricans, obscurum, *subtus* pallidum. *Antennæ* albo nigroque variæ. *Thoracis* margo albidus. *Scutellum* apice album. *Abdominis* margo albo nigroque varius. *Pedes* pallidi.

**Spiniger. 43.** C. *Desc.* *Statura* omnino cim. *marginati*, at duplo minor. *Antennæ* rufæ, primo articulo apice spinoso cinereo, ultimo nigro. *Caput* cinereum, antice spinis utrinque duabus erectis, acutis. *Thorax* griseo-fuscus, margine elevato in spinam obtusam postice emarginatam vel potius bidentatam. *Scutellum* griseum, apice puncto albo. *Elytra* grisea basi albida. *Alæ* fuscæ. *Abdomen* griseum, margine prominente acuto albo maculato.

**Quadratus. 44.** C. *Stoll. cim. 2. t. 5. f. 36.*  
*Desc.* *Antennæ* basi cineræ, medio rufæ, apice fuscæ. *Thorax* obtuse spinosus, scaber, fuscus, margine albicante. *Abdomen* depressum, planum, fuscum, utrinque angulatum, *subtus* flavescens.

**Dentatus. 45.** C. *Desc.* Supra fusco-cinereo-æneus. *Antennæ* nigræ, articulis quatuor,



tertio a medio ad apicem albo. *Caput* ad lentem viridi-æneum, manifeste bilobum. *Thorax* obtuse angulatus, lateribus anticis ferratis. *Elytra*, quæ parte coleoprata sunt, longitudine fere abdominis, at una cum appendiculis alæformibus abdomine longiora. Infra lividus, nigro punctatus.

**Bilobus. 46.** *C. Desc.* Priori simillimus, nisi quod supra e rubro fuscescens, nec æneus. *Antennæ* vero rufæ, non annulatæ, uti prioris.

*Obs.* Posset esse cimex *bidens* *Linnaei*.

**Pudicus. 48.** *C. Desc.* *Antennæ* nigræ, articulis quinque. *Caput* rubrum, lineis duabus longitudinalibus exaratum, margine utroque laterali nigrum. *Oculi* fusci; *stigmata* intra hos rufo fusca. *Thorax* ruber, utrinque angulis tumidiusculis exsertis. *Scutellum* rubrum, apice pallidius. *Elytra* rubra; appendices alæformes hyalinæ. *Abdomen* supra nigrum, marginibus citrino variegatis, ano emarginato. *Subtus* virelcentiflavus. *Pedes* rufi. Supra totus omnibus partibus punctatus.

**Laciniatus. 49.** *C. Obs. D. Sparrman* cimex *paradoxus* valde nostræ affinis & forsitan mera varietas. Conf.

*Desc. Añ. Suec.* 1777 optimâ. Nostra emendanda.

*Desc.* Forte hoc cimice insectum non singularius. *Alæ*, *thorax* *abdomenque* laciniata, laciniis in parte superiore fuscis, in inferiore albis, spinis numerosissimis dense adspersa. *Antennæ* spinosæ. *Elytra* pellucida, albida,

Bb ij

in cavitate profunda abdominis recepta.  
*Pedes* longi, imprimis *posteriores*.

- Diffimilis. 72. *C. Desc.* Nimis cim. *prasino*, affinis videtur, at subtus *totus* ferrugineus pedibus virescentibus. An cim. *prasini* mera varietas ætatis?
- Melanoccephalus. 74. *C. Desc.* Parvus, subtus obscure æneus, nitens, abdominis margine albo nigroque variegato. Supra griseus, æneotinctus, capite macula utrinque ad apicem thoracis scutellique basi nigro-æneis. *Pedes* pallidi, *femoribus* puncto nigro.
- Carbonarius. 76. *C. Desc.* Magnitudo cim. *ornati*. *Totus* ater. *Alæ* albæ vel pallidæ. *Tibiæ* spinosissimæ.
- Fumosus. 77. *C. Desc.* præcedenti simillimus, at multo minor, fuscus nitidus.
- Limbosus. 78. *C. Desc.* Niger nitidus. *Elytra* margine exteriorè albo marginata.
- Albo-marginatus. 79. *C. Desc.* Simillimus cim. *cæruleo*, a quo præcipue differt margine thoracis elytrorumque albo, immo & margine appendicum alæformium albido, tum abdominis lateribus flavo variegatis, ac denique pedibus spinosulis, cum prioris spinulæ potius pili dicendi sint.
- Subapterus. 90. *C. Desc.* *Caput* longum. *Rostrum* nigrum, crassum arcuatum. *Elytra* abbreviata. *Abdomen* supra marginibus elevatis, maculis lateralibus punctisque nigris longitudinaliter dispositis, *subtus* valde convexum fuscum.

Flavicollis. 91. *C. Desc.* Statura cim. atri. *Antennæ* nigrae, seta rufa. *Caput* rufum, ore oculisque nigris. *Thorax* rufus, immaculatus. *Pedes* rufi, *femoribus* annulo nigro.

Tyrannus. 92. *C. Desc.* Affinis nimis cim. atro, at rostrum omnino sanguineum. *Pedes* rufi, *femoribus*, imprimis *anticis*, annulatis. *Plantæ* nigrae.

Schach. 93. *C. Desc.* Statura præcedentis. *Caput* coccineum, *antennis* nigris. *Thorax* ater nitidus, immaculatus. *Scutellum* coccineum. *Elytra* atra, macula magna transversali coccinea in medio, alia minori ad apicem. *Pedes* nigri.

Olivaceus. 94. *C. Desc.* *Caput* glaucescens, *antennis* rufis, articulis apice nigris capillaribus. *Thorax* olivaceus, antice nigricans. *Scutellum* nigrum, margine rufo. *Elytra* obscura, ferruginea, apice coccinea, puncto atro. *Corpus* nigrum.

Capillaris. 95. *C. Desc.* Statura & magnitudo cim. campestris. *Corpus* flavescens, elytris apice macula læte coccinea, quæ terminatur puncto nigro. *Abdomen* carinatum, atrum, marginibus flavescens.

Seticornis. 96. *C. Desc.* Affinis videtur cim. gothico. *Caput*, *thorax* & *antennæ* atra, immaculata. *Elytra* basi pallida, apice puncto coccineo. *Subtus* ater.

Meriopte- 100. *C. Desc.* *Corpus* nigricans, nitidum. *Antennæ* breves & duplo certe crassiores quam femora antica, articulis 1, 2, fusco-rubris, margine pilosis, Bb iij

dum 3, 4, nigri sunt, sed basi & apice citrini, setacei, æquales. *Caput* & *thorax* fusca. *Elytrum* angustum, nitido & fusco-castaneo corio, membrana hyalina, margine exteriori fusca ibidemque prope basin albido puncto notata. *Alæ* rubelli vini colore. *Pedes* citrini & paleacei; *postici* longiores & crassiores.

Umbellata-101. C. Desc. Non sine aliqua difficultate a *pabulino* separavi, quocum habitu & magnitudine convenit, licet differat thorace punctato, scutello punctis binis fuscis. Variat *thorace* lineolis (3) scutelloque punctis totidem flavescens, & colore obscuriore.

Fulvipes. 102. C. (la fulvipede) Desc. *Antennæ* basi fulvæ. *Alæ* hyalinæ. *Femora postica* compressa. Larva nigra, *antennis* fulvis, apice nigris, elytro abbreviato, coriaceo, albo, fascia nigra; pedibus fulvis. Tales larvæ juxta ramulos arborum ambulantes, & manum hostis mire eludentes, sæpissime occurrunt, apteræ semper, & elytris dimidiatis, quæ ne pro veris speciebus adsumantur, probe cavendum. Species hæc, ab aliis omnibus distinctissima, proxime accedit *sylvestri* Linnæi, cum vero hujus *antennæ* minime attenuatæ, & *elytra* versus basin alba, versus apicem vero fusca dicantur, ita a nostro diversum esse volvinus.

Genistæ. 103. C. Desc. Huic nitor nullus. *Antennæ* articuli duo extremi tenuiores, ultimo flavescens.



~~Flavipes.~~ 104. C. ( la flavipede ) Desc. Lucidus. *Elytri* corium fusco-castaneum ; membrana basi fascia dimidiata , alba , acuminata , corio incumbente. *Alæ* violaceo-hyalinæ. *Antennæ* articulis tribus , non computata basi , corpori subæquales. *Abdomen* basi superne flavicans.

Croceus. 105. C. Desc. *Totus* croceus. *Antennæ* croceo nigroque variegatæ , articulo secundo longissimo. *Scutellum* margine nigricans. *Elytrorum* membrana nigra. Subtus *abdomen* croceum nigro variegatum.

Ternatus. 106. C. Desc. cim. striato simillimus. *Caput* nigrum , lineis duabus luteis prope oculos. *Thorax* niger , antice luteo marginatus , fasciis tribus longitudinalibus luteis , quarum una in medio , una utrinque laterali. *Scutellum* nigrum , macula rhombea dimidiato lutea croceaque. *Elytra* nigra , margine exteriori luteo , apice macula triangulari croceata. *Antennæ* , pedes , *alæ* , *abdomen* subtus , nigra.

Albinus. 107. C. Desc. *Oculi* brunnei. *Scutellum* fusco lineatum. *Elytra* viridia , apice alba. *Corpus* subtus , pedes *antennæ*que viridescencia.

Trilinea- 108. C. Desc. *Antennæ* articulis quatuor , quarto setaceo , nigræ. *Caput* nigrum , linea utrinque juxta oculos rubra. *Thorax* fuscus , lineis tribus longitudinalibus rubris. *Scutellum* fuscum apice rubrum. *Elytra* fusca sub apice rubra ; ipse apex niger , appendices fuscae. Subtus una cum pedibus ruber , seu colore pæoniæ officinalis diluto.



Nugax. 132. *C. Desc.* Caput medium, fuscum. *Antennæ* albo nigroque variæ. *Rostrum* basi fuscum. *Abdominis* basis albo fuscoque variegata. *Pedes* fusci. *Tibiæ anticæ* pallidæ, apice fuscæ. *Femora postica* pallida, apice fusca.

Lynceus. 134. *C. Desc.* Statura cim. pini. Caput & *antennæ* nigra. *Thorax* niger, margine exteriori pallido, postico griseo live pallido dentissime nigro punctato. *Scutellum* triangulo nigro, lineolis duabus apicis pallidis. *Elytra* grisea, macula magna apicis atra, puncto niveo. *Alæ* cinereæ, punctis aliquot obsoletis, albis. *Subtus* niger, punctis tribus pectoralibus fulvis.

Urticæ. 135. *C. Desc.* Statura & magnitudo cim. pini. *Antennæ* quadriarticulatæ, fuscæ. Caput & *thorax* nigro-ænea, obscura, immaculata. *Elytra* punctata, grisea, ad basin pallidiora. *Alæ* albæ, puncto parvo centrali nigro. *Abdomen* nigrum, margine albo-variegato & subtus macula media alba. *Femora* nigra, basi pallida. *Tibiæ* pallidæ, cingulis tribus nigris.

Roseus. 139. *C. Desc.* Parvus. Caput albidum. *Thorax* scutellum & *elytra* sanguinea. *Elytra* apice albida. *Alæ* fuscæ. *Femora* sanguinea. *Tibiæ* albidæ nigro punctatæ.

Boopis. 141. *C. Desc.* Oculi capite thoraceque latiores. *Antennæ* adeo tenues ut vix conspiciantur. *Thorax* qui antice angustissimus, caput & *elytra* luteo nigroque marmorata. *Pedes* pallidi, fusco maculati.

- Eryngii. 142. C. Desc. Corpus subtus', caput, scutellum, antennæ, nigra. Thorax ruber, fascia transversali nigra, antice dissecta. Elytra rubra, ante apicem macula triangulari nigra. Alæ nigrae.
- Stellifer. 143. C. Desc. Nigra sunt caput, scutellum, antennæ pedesque. Thorax niger, margine antico lateraliq̃ue rubro, striga rubra longitudinali in medio. Elytra rubra, in medio macula magna nigra, a margine versus interiorem usque extensa. Alæ nigrae; cruce macula triangulari alba. Subtus ruber. Abdominis incisuræ singulæ tribus maculis nigris.
- Nobili. 144. C. Desc. Caput nigrum, uti antennæ; pedes scutellumque. Thorax ruber, maculis duabus nigris magnis arcuatis, lineola rubra separatis. Elytra rubra, puncto parvo nigro in medio. Membrana maculis albis. Alæ albæ. Subtus niger, abdominis medio rubro.
- Variega- 146. C. Desc. Oculi prominuli. Caput nigrum. Thorax niger, margine laterali luteo. Elytra nigro luteoque variegata. Antennæ articulus secundus basi luteus, apice niger, ultimi duo nigri. Femora nigra. Tibiæ albo nigroque alternatim annulatæ.
- Monilis. 147. C. Desc. Totus fuscus. Scutellum puncto luteo. Antennæ, pedes, abdomen margine, nigro luteoque alternatim variegata.
- Cataria. 148. C. Desc. Caput nigrum. Thorax antice niger, postice viridescens. Scutellum

nigrum, apice griseum. *Antennæ pedesque* nigro & griseo variegati.

**Apicaris, 149.** *C. Desc. antennæ* fulvæ, apice nigræ. *Caput* nigrum. *Thorax* postice griseus, antice niger. *Scutellum* nigrum. *Elytra* fulvo-fusca, apice macula alba triangulari. *Alæ* fuscæ. *Pedes* flavescentes, *genubus* nigris.

**Femoralis, 150.** *C. Desc. Totus* pallide viridescens. *Alæ* diaphanæ. *Corpus* subtus fuscum. *Femora* nigro punctulata.

**Constellaris, 151.** *C. Desc. Parvus*, niger, nitidus. *Elytra* antice fulva, membrana fusca tribus maculis albidis.

**Fuligineus, 152.** *C. Desc. Parvus*, obscure fuscus, punctis dense sparsus. *Alæ* nervis albidis.

**Ternatus, 153.** *C. Desc. Simillimus cim. striato. Caput* nigrum, lineolis duabus flavis oculos prope. *Thorax* niger, antice flavus, lineis tribus longitudinalibus. *Scutellum* nigrum, macula rhombea bicolor, lutea croceaque. *Elytra* nigra, margine exteriori flava, apice macula ejusdem coloris triangulari. *Antennæ, alæ, corpus* subtus, *pedesque*, nigra.

**Nigro-punctatus, 154.** *C. Desc. Antennæ* nigræ. *Caput* luteum, macula nigra oblonga in medio. *Thorax* maculis duabus nigris, fere lunatis, quatuorque aliis postice in lineam dispositis. *Scutellum* luteum, punctis duobus minimis nigris antice, maculis duabus oblongis lateralibus. *Elytra* viridia, immaculata. *Corpus* subtus, *pedesque* viridi-lutea.

Virides- 155. *C. Desc.* Totus pallide viridis. *Oculi* fufci. *Elytra* apice fufco maculata.

Albinus, 156. *C. Desc.* Pallide viridis. *Oculi* fufci. *Scutellum* linea longitudinali fufca, e duabus parallelis lineis compofita. *Elytra* apice alba. *Antennæ*, *corpus* fubtus, *pedes* longi, viridefcentia.

Elongatus, 157. *C. Desc.* *Corpus* elongatum. *Caput* antice nigrum, poftice viride. *Thorax* viridis, lineis quatuor longitudinalibus nigris, lateralibus non computatis. *Scutellum* lineis quatuor nigris e lineis thoracis extenfis. *Elytra* viridia, prope futuram fufca. *Antennæ* virides, bafi tamen apiceque fufcæ. *Abdomen* fubtus *pedes*que longi, pallide viridia.

Sponfalıs, 158. *C. Desc.* Pallidus. *Antennæ* tenuiffimæ. *Oculi* brunnei. *Caput* fascia longitudinali nigra, ocellis duobus rubellis terminata. *Thorax* lineis tribus longitudinalibus nigris, media ufque ad *scutellum* producta. *Scutellum* fascia nigra. *Abdomen* fubtus, *elytra* *pedes*que pallida, immaculata.

Conicus, 159. *C. Desc.* *Antennæ* tenuiffimæ. *Oculi* prominuli. *Thorax* conicus. *Elytra* valde ftrıata. *Pedes* flavefcetes.

Flammeus, 160. *C. Desc.* *Caput* rubro-luteum, macula longa nigra inter oculos fufcos. *Antennæ* nigræ. *Thorax* niger lævis. *Scutellum* puncto rubello in apice. *Elytra* apice macula magna rubra. *Corpus* fubtus nigrum. *Pedes* nigri, articulis rubellis.



- Plæsseus. 161. *C. Desc.* Minor niger, nitidus. *Alæ* nigrae. *Pedes* nigro viridique variegati.
- Atramentarius. 162. *C. Desc.* Totus niger, alis etiam nigris. *Thorax* planus, latus, antice emarginatus.
- Carthusia-nus. 163. *C. Desc.* Totus supra lacteus, excepto capite nigro. *Thorax* fulcis tribus longitudinalibus elevatis. *Antennæ* nigrae crassae, articulo tertio longiore.
- Cordatus. 187. *C. Desc.* *Antennæ* longae, nigricantes, articulo primo fulvescente. *Thorax* luteo fasciatus, in medio niger, postice fulvus. *Scutellum* antice nigrum, macula cordata flava. *Elytra* rubello-flava, puncto minimo luteo vix conspicuo, apice macula lutea triangulari. *Corpus* subtus nigrum. *Pedes* fulvi, versus basin flavi.
- Cruentatus. 188. *C. Desc.* Viridis, oculis concoloribus. *Thorax* fasciis duabus longitudinalibus rubellis. *Scutellum* viride. *Elytrum* antice striga sanguinea, duabusque aliis longitudinalibus. *Pedes* virides.
- Ruficornis. 189. *C. Desc.* Elongatus, pallide virescens. *Oculi* virescentes. *Antennæ* tenues, corporis longitudine, fulvescentes.
- Recticornis. 190. *C. Desc.* Elongatus, totus viridis. *Antennæ* porrectae. *Pedes* longi.
- Tiliæ. 193. *C. Desc.* *Antennæ* setaceae nigrae, articulo secundo basi apiceque pallido. *Caput* & *thorax* viridia, linea laterali nigra. *Scutellum* viride, punctis duobus parvis versus apicem nigris.



*Elytra* viridia, fasciis tribus atris, anteriore abbreviata, media antrorsum angulata, postica latiore. *Pedes* albo nigroque annulati.

- Agilis. 194.** C. Desc. Statura & magnitudo præcedentis. *Caput* atrum nitidum, rostro pallido *antennarumque* articulo primo rufescente. *Thorax* ater nitidus, margine postico late flavo. *Scutellum* atrum, apice flavum. *Elytra* fusca vel potius picea, macula pone basin pallida. Apex pallidus terminatur puncto atro. *Abdomen* atrum. *Pedes* pallidi. Simillimum ex Italia misit Dr. Allioni, at absque thoracis margine pallido.
- 6-Gutta- 195.** C. Desc. *Caput* nigrum, orbita oculorum flavesciente. *Thorax* ater, linea dorsali punctoque utrinque marginali flavis. *Scutellum* flavum. *Elytra* lævia nigra, macula oblonga baseos flava, secunda in medio margine tenuioris & tertia apicis quæ terminatur puncto atro. *Corpus* atrum.
- Rivulo- 208.** C. Desc. Statura cim. lacustris, at paullo minor. *Caput* nigrum, antennis quadriarticulatis. *Thorax* niger, antice parvum rufescens, utrinque puncto parvo fere obsoleto albo. *Elytra* nigra, punctis albis, e quibus alis complicatis sex apparent, quatuor *scutellum* cingentibus, anterioribus duobus longioribus, reliquis duobus in medio dorsi uno post alterum. *Femora* nigra, postica incurva, bidentata.
- Pallipes. 209.** C. Desc. *Corpus* statura præcedentium totum nigrum, pedibus solis pallidis.

Spina valida prominens utrinque sub thorace. *Abdominis* margo parum pallescit.

Clavipes. 210. C. Desc. Similis cim. *tipulario*, at triplo minor & *pedes* haud elongati.

Ater. C. ( la noire ) ater nitidus, elytris apice pallescentibus. *Acanth.* 3. *Mantiff.*

*Hab.* Kiliæ.

*Desc.* Duplo minor cim. *rosteræ*. *Corpus* totum atrum nitidulum, *oculis* valde prominulis. *Elytra* coriacea, apice pallida.

Fasciata. C. ( la fasciée ) ater, elytris pallescentibus, fasciis duabus abbreviatis nigris. *Acanth.* 10. *Mantiff.*

*Hab.* Kiliæ. D. Daldorf.

*Desc.* Parvus. *Corpus* totum atrum, nitidum. *Antennarum* articuli duo priores ferruginei, apice nigri, ultimo nigro toto. *Thorax* sulco transverso impressus. *Elytra* pallescencia, fasciis duabus, altera in medio, altera ad apicem, nigris, futuram tamen haud attingentibus. *Pedes* flavescents, *femoribus* posticis annulo nigro.

Sylvestris. C. ( la sauvage ) ater, elytris albis, arcu apice nigro. *Acanth.* 23. *Mantiff.*

*Hab.* in Europæ fylvis.

*Desc.* Parvus. *Antennæ* ferruginæ, articulorum apicibus nigris. *Caput* & *thorax* atra, nitida, immaculata. *Elytra* alba, apice nigra, macula magna fiava. Margo interior flavescens macula nigra. *Alæ* albidæ, macula apicis nigra. *Pedes* ferruginei, *Corpus* atrum.

**Varius. C.** ( la variée ) thorace obtuse spinoso supra rufus subtus flavescens, scutello nigro basi apiceque albo. *Cim.* 49. *Mantiss.*

*Hab.* in Hispania. *D. Vahl.*

*Desc.* Statura & magnitudo cim. *albipedis*.  
*Antennæ* nigræ. *Caput* nigrum, lineis duabus rubris antice coeuntibus. *Thorax* rufus, margine lineolisque duabus abbreviatis anticis nigris. *Scutellum* nigrum, basi album, maculis duabus parvis baseos majorique apicis nigris. Apex albus. *Elytra* rufa, immaculata. *Abdominis* margo nigro rufoque maculatus. *Corpus* subtus flavescens, abdomine lineis tribus punctorum fuscorum. *Pedes* rufi.

**Ferrugatus. C.** ( la ferrugineuse ) thorace acute spinoso supra griseus, capite spinisque nigris, abdomine ferrugineo.

*Hab.* in Suecia. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Medius. *Caput* nigrum, *antennis* pallidis primo ultimoque articulo nigro. *Thorax* griseus, margine tenuissime flavo spinisque acutis elongatis nigris. *Scutellum* obscurum, apice flavescens. *Elytra* grisea sive pallida, punctis numerosis fuscis. *Alæ* albidæ, arcu apicis fusco. *Abdomen* ferrugineum. *Pedes* fusci. *Mantiss. app.*

**Tristriatus. C.** ( la tristriée ) ovatus flavescens, elytris apice puncto ocellari atro abdomine lineis tribus albis. *Cim.* 135. *Mantiss.*

*Hab.* in agro Pedemontano. *Dr. Allioni.*

*Desc.* Statura parva cim. *nubili*. *Caput* & *thorax* flavescencia, immaculata. *Elytra* basi flavescencia, apice rufes-

centia, puncto subocellari atro, & hic color rufescens in medio extenditur. *Subtus* flavescens, abdomine lineis tribus albis. *Pedes* flavescentes.

6-Punctatus. C. ( la 6-ponctuée ) oblongus, thorace elytris rufis, maculis duabus nigris. *Cim.* 213. *Mantiff.*

*Hab.* in Hispania. *D. Vahl.*

*Desc.* Magnitudo & statura plurimorum. *Caput* atrum. *Thorax* lævis, rufus, punctis duobus nigris. *Scutellum* nigrum. *Elytra* rufa, maculis duabus nigris, altera versus futuram, altera versus apicem. *Alæ* fuscæ. *Corpus* fuscum, linea laterali rubra. *Pedes* fusci, *femoribus* rubris.

Floralis. C. ( la Flore ) oblongus supra obscure griseus, elytris apice puncto rubro, femoribus posticis elongatis nigris. *Cim.* 248. *Mantiff.*

*Hab.* in Hafniæ floribus. *Dr. Pflug.*

*Desc.* Statura omnino *cim. pratensis*. *Caput* & *thorax* obscure grisea, antennis pallidis. *Elytra* concoloria, puncto apicis rufo. *Corpus* fuscum, ano rufescente. *Pedes* pallidi, *femoribus posticis* elongatis nigris.

Inquinatus. C. ( la souillée ) oblongus flavescens; elytris nigris albo variis. *Cim.* 250. *Mantiff.*

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Medius. *Caput* flavescens, antennis nigris. *Thorax* flavescens, lateribus margineque postico nigris. *Elytra* nigra, basi apiceque albo nigroque variis. *Corpus* flavescens, margine nigro. *Pedes* nigri.

Nassatus.



**Nassatus. C.** ( la flavipede ) oblongus viridis ,  
antennis pedibusque flavescens.  
*Cim.* 251. *Mantiss.*

*Hab.* Hafniæ in tilia. *D. Lund.*

*Desc.* Parvus. *Totus* viridis , immacu-  
latus , *antennis pedibusque* folis fla-  
vescentibus.

**Transversalis. C.** ( la transversale ) oblongus viridis ,  
thorace lineola interrupta , elytris ma-  
cula fuscis. *Cim.* 256. *Mantiss.*

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Statura *cim. populi* , at duplo minor.  
*Corpus* viride. *Antennarum* ultimus ar-  
ticulus fuscus. *Thorax* viridis , lineola  
transversa in medio interrupta fusca.  
*Abdomen* viride , dorso atro. *Elytra*  
viridia , macula magna versus apicem  
futuraque fuscis. *Pedes* virides.

**Umbratilis. C.** ( la délicate ) oblongus niger , elytris  
flavo lineatis apice fascia alba , an-  
tennis apice capillaribus. *Syst. nat.* 90.

*Hab.* in Suecia. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Medius. *Antennæ* nigrae , apice  
setaceæ. *Caput* , *thorax* , *scutellum* ,  
*corpus* , nigra immaculata. *Elytra*  
nigra , lineolis aliquot flavis abbre-  
viatis exarata , apice fascia nivea.  
*Pedes* picei.

**Tricolor. C.** ( la tricolor ) oblongus ater , elytris  
apice macula coccinea , antennis apice  
capillaribus. *Cim.* 272. *Mantiss.*

*Hab.* in Hispaniæ urtica. *D. de Schestedt.*

*Desc.* Statura & summa affinitas *cim.*  
*gothici* , at *totus* ater , elytrorum folis  
apicibus macula magna coccinea. *A.æ*  
nigrae , macula marginali transversa  
pallida. *Pedes* nigri.



Varius. C. ( la coquette ) oblongus flavescens , capite , scutelli margine , atris. *Cim.* 275. *Mantiff.*

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Parvus. *Caput* atrum , *antennis* basi pallidis. *Thorax* flavescens , margine postico nigro punctoque laterali apicis rufo. *Scutellum* flavum , margine nigro. *Elytra* flavo fuscoque varia , puncto obsoleto rufo apicis. *Corpus* , uti & *pedes* , flavescencia.

Holfatus. C. ( la pâlie ) oblongus exalbidus , thorace lineis duabus elytris interne fuscis. *Cim.* 278. *Mantiff.*

*Hab.* Kiliæ. *D. Daldorf.*

*Desc.* Statura omnino *cim. lævigati*. *Antennæ* setaceæ exalbidæ. *Thorax* lineis duabus dorsalibus fuscis. *Elytra* interne fusca , externe albida. *Corpus* exalbidum.

Pallens. C. ( la pâle ) oblongus pallidus , capite corporeque atris. *Cim.* 281. *Mantiff.*

*Hab.* in Suecia. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Parvus. *Caput* atrum , *antennis* pallidis. *Thorax* , *scutellum* , *elytra* , *pedes* , pallida , immaculata. *Corpus* atrum.

Vagans. C. ( l'errante ) oblongus griseus , capite thoraceque linea nigra , pedibus testaceis. *Cim.* 286. *Mantiff.*

*Hab.* in Suecia.

*Desc.* Statura omnino *cim. feri*. *Caput* & *thorax* grisea , linea longitudinali nigra. *Scutellum* nigrum , punctis duobus parvis rufis. *Elytra* grisea , interdum punctis aliquot obsoletis nigris. *Alæ* exalbidæ. *Pedes* testacei.

**Stridulus. C.** ( l'importune ) glaber niger , elytris fuscis nigro maculatis , margine rufo. Reduv. 5. Mantiss.

Hab. Monspeliæ. D. Broussonet. Mus. D. Banks.

Primo vere agilis antennis continuo motitans , thoracis attritu stridens.

Desc. Parvus. Antennæ nigræ , triarticulatae. Thorax niger , nitidus , striga transversa valde impressa. Scutelli triangulum fuscum. Elytra intus fusco-cinerea , punctis tribus atris , extus rufa. Alæ fuscae , macula atra. Corpus nigrum , abdominis segmento 2 , 3 , 4 , rufis. Pedes nigri , anterioribus incrassatis.

**Cruentus. C.** ( la méchante ) rufus , capite , pectore abdominisque striis macularibus rufis. Reduv. 14. Mantiss.

Schæff. icon. 1. tab. 5. fig. 9. 10.

Hab. Monspeliæ. D. Broussonet.

Desc. Statura & magnitudo cim. annulati. Caput nigrum , gula rostrique basi rubris. Antennæ nigræ. Thorax rufus , lobo antico nigro , punctis duobus magnis rubris. Elytra rufa , immaculata. Alæ obscuræ. Pectus nigrum. Abdomen rufum , lineis tribus punctorum nigrorum margineque nigro vario. Pedes rufi , puncto femorum , genibus tarsisque rufis.

**Tessellatus. C.** ( la marquetée ) thorace elytrisque obscure ferrugineis , abdomine atro , margine albo vario. Reduv. 38. Mantiss.

Hab. Monspeliæ. D. Broussonet. Mus. D. Banks.

Desc. Statura præcedentium. Caput nigrum rubro punctatum. Antennæ nigræ.

*Thorax* lobo antico nigro testaceo maculato, postico obscure ferrugineo, margine postico acuto albido. *Scutellum* nigrum, linea dorsali alba. *Elytra* obscure ferruginea, immaculata. *Alæ* obscuræ. *Corpus* subtus fuscum, abdomine atro nitido, margine albo vario. *Pedes* rufi, *femoribus* intus nigris.

**Guttula. C.** ( l'étoilée ) ater nitidus, elytris pedibusque sanguineis, alis puncto albo.

*Hab.* in Germania. *Dr. Heisse.*

*Desc.* Medius. *Caput & thorax* atra, nitida, immaculata. *Scutellum* atrum. *Elytra* rubra, puncto parvo atro ad futuram. *Alæ* nigrae puncto magno marginali albo. *Abdomen* atrum, immaculatum. *Pedes* rufi, *femoribus* anticis incrassatis, unidentatis.

**Ferrugatus. C.** ( la rouillée ) thorace acute spinoso, supra griseus, capite spinisque nigris, abdomine ferrugineo. *Cim. Mant. app.*

*Hab.* in Suecia. *D. Pay Kull.*

*Desc.* Medius. *Caput* nigrum, *antennis* pallidis, primo ultimoque articulo nigris. *Thorax* griseus, margine tenuissimo flavo spinisque acutis elongatis, nigris. *Scutellum* obscurum, apice flavescens. *Elytra* grisea s. pallida, punctis numerosis fuscis. *Alæ* albidæ, arcu apicis fusco. *Abdomen* ferrugineum. *Pedes* fusci.

*Obs.* 1. Cimicum numerosa gens a variis in varias familias distributa fuit; mihi sequentes non incongruæ videntur *D. Schrank.*

*Nudi*, alis elytrisque per omnem ætatem carentes.

*Apteri*, alis, non elytris carentes.

*Scutellati*, scutello lato, longitudine abdominis.

*Coleoprati*, elytris totis coriaceis.

*Membranacei*, valde depressi ut foliolum.

*Angulati*, thoracis lateribus plus minusve mucronatis.

*Ovati*, ovati, fere rotundi, mutici.

*Ovato-oblongi*, ex ovata figura magis oblongi.

*Oblongi*, oblongi cum aliqua inclinatione in ovalem.

*Angustati*, lineares, proportionnaliter angustissimi.

*Obs.* 2. *Linnæi* ordines cimicum, septimo forsan excepto, hoc genus feliciter ordinant. V.

*Aphis.*

**Alni.** 35. *A. Desc.* Oculi nigri. Abdomen conicum, non bicornè. Corpus inflatum, villosulum.

**Pruni.** 36. *A. Desc.* Albido-viridis, albo pulverulenta. Oculi nigri. Abdominis appendices breves.

**Pomi.** 37. *A. Desc.* Magnitudo media lutescente-viridis. *Antennæ*, oculi, pedes, abdominis appendices, obscure fusca. Corpus tumidum ovatum. *Appendices* truncatæ, in medio incrassatæ. Abdomen subtus postice maculis duabus nigris.

**Juniperi.** 38. *A. Desc.* Obscure fusca. Caput parvum. Oculi nigri. *Antennæ* læyes. *Appendices* conicæ breves. Corpus rotum pilosum. *Pedes* villosi.

**Millefolii.** 39. *A. Desc.* Viridis. Oculi fusco-rubri.



*Antennæ* longæ. *Corpus* squamis nigris elevatis, subtus viride, annulo ultimo nigro. *Thorax pedusque* maculis nigris. *Stylus corniculaque* nigra.

Salicis- 40. A. Desc. Nigro-viridis. *Corpus* supra duplici macularum albidarum serie. *Antennæ* mediocres. *Appendices* longæ.

Gallarum- 41. A. Desc. Tota viridescens - grisea. ulmi. *Abdomen* fusco - cinereum, villo margaritato testum.

Solidaginis. 43. A. Desc. *Corpus* majusculum, fuscum, antice angustatum, fronte emarginata. *Cornicula* elongata setacea. *Stylus* corniculis duplo brevior. *Pedes* pallidi, geniculis nigris.  
Obs. Juniores omnino testaceæ.

Achilleæ. 47. A. Desc. *Antennæ* filiformes, albidæ. *Alæ* albidæ. *Anus*, *stylus* & *cornicula* albida.

Fraxini. 48. A. Desc. *Caput* & *thorax* nigra. *Abdomen* viride, segmentorum marginibus nigris. *Antennæ pedesque* variegati.

Ægopodii. 55. A. Desc. *Corpus* nigrum, abdomine, rostro pedibusque pallidis.

Papaveris. 57. A. *Corpus* nigrum, antennis pallidis. *Corpus* nigrum, stylo corniculisque pallidis. *Pedes* nigri, interdum pallidi, geniculis nigris. *Alæ* pallidæ, costa fusca.

Obs. Juniores obscure virentes.

Longirostris. A. (le cortical) cinerea, rostro corpore triplo longiore.



*Hab.* Dresdæ sub arborum corticibus, formicarum larvis victitans.

*Desc.* Media. *Rostrum* longissimum, cylindricum, quo larvarum succum haurit.

*Obs.* Plurimæ in speciebus non memoratæ, in nova *Mantiss.* reperiuntur ex *G. pastinacæ*, *nymphææ*, *absinthii*, &c.

*Coccus.*

Betulæ. 5. *C. Desc.* *Corpus* minimum albidum.

Zosteræ. 26. *C. Desc.* *Corpus* parvum, orbiculatum; album depresso-planum.

Visci. 21. *C. Desc.* Fœminam vidit tantum *D. Schrank.* in foliis visci albi, plura in singulis, hæc, agitato folio decidunt, vestigio tamen sui relicto, cavitate nempe quadam in folio, cui adhæserunt, causata. Ad lentem puncta hæc sunt scutellæ orbiculares, centro-flavo, margine albo. Magnitudo hujus insecti vix  $\frac{1}{2}$  lin. in diametro æquat.

Mali. 23. *C. Desc.* *Cocco hesperidum* similis habitu. Cingitur margine foliaceo, summe diaphano, plicato s. rugoso, & dorso ex iisdem rugis cingitur ellipsi alba.

Color adulti albido-fuscescens, junioris lucide castanei, demto margine & ellipsi dorsali.

Costatus. 24. *C. Desc.* Mense aprili ann. 1775 in ramulis amygdali persicæ elegantissimum hunc coccum vidit *D. Schrank.*

*Fœmina* ovalis, ano profunde emarginato, eleganter castanei coloris; medio dorso linea flava pinnata lon-

gitudinali, maculis quatuor flavis, duabus anticis, duabus in lobis per antemarginaturam causa.

**Farinosus-** 25. *C. Desc.* Corpus ovatum, incisuris 24, alni. capite computato. *Totus* rubro-fuscus, sed pulvere albido rectus. *Antennæ* apice incrassatæ. *Pedes* brevissimi.

*Obs.* Aphides, chermestes, & cocci fere tantum a loco natali denominanda, nec synonyma congerenda, ne in generibus adhuc, quod specierum ad accuratam attinet distinctionem, obscuriusculis synonyma temere confundantur. Multa in his minutulis detecta sunt, plura restant detegenda. *Enum.*

### *Lepidoptera.*

**Europome.** 19. *P. C.* An species? An *P. palano-* varietas? *V.*

**Aurora.** 22. *P. C.* Alis integerrimis fulvis, anticis subtus puncto ocellari, posticis sesquialtero argenteis.

*Hab. in* Sibiria. *D. Boeber.*

*Desc.* Mera *P. hyale* varietas videtur, differt tantum colore supra fulvo. Vix distingui meretur.

**Raphani.** 23. *P. C.* Alis rotundatis integerrimis albis, apice nigris albo maculatis, posticis subtus nigro venosis, flavo pulverulentis. *Mantiss.* 187.

*Desc.* Statura & magnitudo omnino *P. sinapis*. *Antennæ* nigrae, albo annulatæ. *Caput* & *thorax* fusca. *Abdomen* album, dorso fusco. *Alæ anticæ* concolores, albæ, macula pone medium margineque nigris. Margo maculis tribus albis.

*Alæ posticæ* supra albæ, punctis marginalibus fere obsoletis fuscis; *subtus* nigro venosæ, pulvere flavicante adpersæ.

Allionia. 48. P. G. *Desc.* Magnitudo & statura P. *jurtinæ*. *Corpus* fuscum immaculatum. *Alæ* dentatæ, fusæ, ocellis paginæ inferioris obscure perspicuis absque pupilla *Subtus* basi fusæ, strigis duabus obscurioribus, apice pallidiores, anticis ocellis duobus magnis, anteriori pupilla alba, posteriori cæco. Inter ocellos macula alba. *Posticæ* loco ocellorum punctis tribus albis majorique atro.

Fauna. 50. P. G. *Fab.* 971. alis dentatis supra fuscis, anticis ocellis duobus punctisque duobus albis, posticis *subtus* griseis.

*Hab.* in Germaniæ pinetis. M. D. Romani.

*Desc.* Nimis affinis P. *fidia*, at duplo minor. *Alæ* supra omnes fusæ, anticis ocellis duobus minoribus iride flavescents, sæpe cæcis & inter ocellos puncta duo alba, posticis puncto uno alterove obsoleto albo punctoque distinctiori atro *subtus*; ocelli anteriorum majores. *Posticæ* griseæ. *Mantiss.* 371.

Eudora. 51. P. G. *Fab.* 435. alis dentatis fuscis, anticis utrinque disco ferrugineo, ocello maris unico, foeminæ duobus. M. 435.

*Hab.* in Germaniæ sylvis. D. Boeber.

*Desc.* Nimis affinis P. *janira*, at paullo minor. Differt disco *alæ anticæ* utrinque ferrugineo. *Posticæ* *subtus* obscure griseæ, immaculatæ.

Philoxenus. 52. P. G. *Fab.* P. F. Dauus. Alis integerrimis fulvis, anticis ocello *subtus*

albo fasciatis, posticis ocellis sex.  
*Mantiss.* 347.

*Wien. Verz.* 321. 25. papilio iphis.

*Naturf.* 10. tab. fig. papilio typhon.

*Myll. Faun. Fridrichsd* papilio tullia.

*Maf.* alis supra ocellis obsoletis.

**Adia.** 54. P. G. Alis repandis supra fuscis, anticis ocellis duobus punctisque duobus albis posticis subtus marmoratis. *Mant.* 369.

*Desc.* Nimis affinis P. *fidia* & *Fauna*, at *alæ* vix dentatæ & *alæ posticæ* subtus marmoratæ, puncto uno alterove atro ad angulum ani.

**Alexis.** 55. P. G. *Ligea* Syst. teste D. Fab. & optimo jure.

*Naturf.* 8. t. 3. f. 6.

*Desc.* Distinctus maculis albis in pagina inferiore *alæ posticæ*. Variat rarius fascia cinera loco flavæ.

*Larva* villosa viridis, linea dorsali nigra, capite flavo, cauda bifida.

**Æthiops-** 56. P. G. *Blandina*. Alis dentatis fuscis, fascia rufa ocellata, posticis subtus fuscis, fascia cinerea. *Mantiss.* 412.

major.

*Wien. Verz.* 167. 7. papilio media.

*Desc.* Nimis affinis P. *ligea*. Differt tamen alis posticis vix ocellatis, fuscis, fascia cinerea absque maculis albis.

**Arge.** 59. P. G. Alis dentatis albis nigro strigosis, anticis ocello unico, posticis quinque. *Mantiss.* 422.

*Papilio arge.* Esp. pap. tab. 84. fig. 1. 2.

*Hab.* in Russiæ Australioris desertis. D. Boeber.

*Desc.* Statura & summa affinitas P. *gala-*



*thea*. *Alæ omnes* albæ, strigis plurimis undatis nigris. *Alæ anticæ* utrinque ocello parvo superiori cæco. *Posticæ* utrinque quinque pupillatis.

**Arethusa. 61.** P. G. Alis dentatis supra fuscis, fascia maculari rufa, anticis utrinque ocello unico. *Mantiss.* 401.

*Wien. Verz.* 169. 16.

*Hab.* in Germania. *Mus. D. Romani.*

*Desc.* Simillimus P. *semele*. *Alæ omnes* supra fuscæ, fascia communi e maculis quatuor fulvis. Dentes albo nigroque varii. Oculus parvus cæcus *alæ anticæ*. Subtus *anticæ* fuscæ, disco ferrugineo ocello majori pupillato. *Posticæ* griseæ.

**Manto. 62.** P. G. *Fab. erina* alis dentatis fuscis, fascia maculari fulva, punctis ocellaribus nigris. *Mantiss.* 414.

*Wien. Verz.* 161. 15. papilio erina.

*Desc.* Affinis P. *ligea*, at distinctus corpore minore ocellisque cæcis vel potius punctis ocellaribus.

**Tarpeia. 64.** P. G. *Fab.* Alis integris fulvis, omnibus ocellis quatuor cæcis. *Mantiss.* 338. *Cram. pap.* 32. tab. 375. fig. E. F. papilio celamine.

*Desc.* *Alæ omnes* supra fulvæ, margine fusco ocellisque quatuor, rarius quinque nigris cæcis. Subtus *anticæ* fulvæ, *posticæ* fuscæ, strigis fasciaque albis.

**Afer. 65.** P. G. Alis integris fuscis, ocellis sex, posticis cinereo venosis. *Mantiss.* 413.

*Hab.* in Russiæ Australioris desertis. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino P. *blandinæ*. *Antennarum* clava subtus



excavata. *Alæ omnes* nigræ, ocellis circiter sex. Subtus *antica* nigræ, basi litura ferruginea ocellisque 5, 6, duobus majoribus. *Postica* fuscæ, cinereo-venosæ, ocellis sex vel septem.

**Clymene. 67.** P. G. Alis dentatis fuscis, litura ferruginea, posticis ocellis supra subtribus, subtus subseptem. *Mantiss.* 434.

*Desc.* Statura & magnitudo omnino *P. jurtina*. *Alæ antica* fuscæ, disco rufo, utrinque ocello subtus pupillato. *Postica* fuscæ, maculis quatuor fulvis & in his ocelli duo aut tres cæci, subtus fuscescentes, ocellis septem cæcis, e quibus 2, 3 sæpe minutissimi vix apparent, ultimi duo connati.

**Autonæ. 68.** P. G. Alis dentatis fuscis flavo subfasciatis ocellisque duobus pupillatis, anticis subtus basi fuscis. *Mantiss.* 398.

*Hab.* in Russia Australiori. *D. Boeber.*

*Desc.* Nimis affinis *P. semele*. *Alæ* supra fuscæ, anticis fascia maculari flavefcente, posticis striga albida. *Ocelli* duo distincti nigri, pupilla alba. *Alæ antica* subtus fuscæ, fascia lata flava, ocellis duobus, anteriore majore pupillato.

**Ida. 70.** P. G. Alis subdentatis fuscis, disco fulvo, anticis utrinque ocello nigro bipupillato, posticis subtus griseo variis. *Mantiss.* 429.

*Hab.* in Gibraltar. *D. Boeber.*

*Desc.* Nimis affinis *P. pilosellæ*, at minor, alis subintegris at omnino absque punctis albis in pagina inferiori alæ posticæ.

**Cynthia. 93.** P. P. Alis dentatis nigris fulvo flavo-

que fasciatis, posticis subtus fulvis  
flavo fasciatis. *Mantiss.* 574.

*Wien. Verz.* 179. 3. papilio cynthia.

*Naturforsch.* 12. tab. 2. fig. 1. 4.

*Desc.* Major *P. cinxia*. *Alæ anticæ* supra  
fuscae, fasciis plurimis nigris; subtus  
pallide fulvæ, undis aliquot nigris.  
*Posticæ* nigræ, rarius fulvo maculatæ,  
pone medium facia e maculis sex fulvis,  
quarum quatuor aut quinque puncto  
nigro notatæ. *Subtus* fulvæ, fascia  
baseos interrupta media nervis divisa,  
apicis maculari. Inter has ultimas  
fascia striga e punctis quinque distinctis.  
*Mas* supra obscurior maculisque albis  
notatus.

*Larva* spinosa atra, lineis duabus dorso-  
libus flavis, capite cærulescente.

*Puppa* pallida, nigro flavoque maculata.

**Didyma. 94.** *P. P.* Alis dentatis fulvis (cinereis)  
nigro maculatis, posticis subtus flavis  
nigro punctatis, fasciis duabus fulvis  
continuis. *Mantiss.* 569.

*Desc.* Magnitudo *P. phæbe*. *Abdominis*  
latera nigro punctata. Fascia antica,  
*alæ posticæ* subdidyma.

**Athalia. 96.** *P. P.* Alis repandis fulvis nigro punc-  
tatis, posticis subtus albis punctatis  
fasciisque duabus fulvis. *Mantiss.* 571.

*Esp. pap. tab.* 88. fig. 5. 6.

*Hab.* in Russia Boreali. *D. Boeber.*

*Desc.* Minutus in hac familia. *Alæ* supra  
*omnes* fulvæ, punctis numerosissimis  
nigris. *Subtus anticæ* fulvæ, nigro  
maculatæ, apice albæ nigro punctatæ;  
*posticæ* albæ, strigis plurimis punctorum  
nigrorum fasciisque duabus fulvis, an-  
teriore abbreviata e maculis tribus.

Pilosellæ. 97. P. P. *Obs.* nec est pap. *pilosellæ*.  
D. *Fab.* V.

[ Dictynna. 98. P. P. Alis dentatis nigris fulvo maculatis, posticis subtus fulvis, maculis baseos fascia media maculari lunulisque apicis flavis. *Mantiss* 573.

*Esp. pap. tab.* 89. *fig.* 1. 2. papilio athalia minor.

*Desc.* Reliquis obscurior maculis minoribus fulvis. *Posticæ* subtus maculis minoribus fulvis. *Posticæ* subtus maculis quinque baseos flavis, fascia in medio maculari flava nigro marginata & lunulis flavis versus apicem.

Arfilache. 99. P. P. *Fab. Pales.* Alis subintegris fulvis basi maculisque nigris, posticis subtus brunneis flavo argenteoque variis. *Mantiss.* 598.

*Wien. Verz.* 177. 8. papilio pales.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magnitudo & affinitas P. *dia. Alæ* supra omnes, fulvæ & basi maculisque plurimis nigris. Subtus *anticæ* fulvæ, lunulis punctisque aliquot nigris maculisque duabus flavis apicis. *Posticæ* basi maculis argenteis, tunc brunneæ puncto parvo argenteo, tunc fascia magnâ, sinuata, obsolete flava, & in hac maculæ duæ argenteæ, altera in medio, altera ad marginem exterio-rem, demum brunneæ, maculis aliquot fere obsolete argenteis & denique margo flavo variis punctis sex vel septem argenteis.

Niphe. 100. P. P. An Europæus?

Corythallia. 102. P. P. *Fab. Phæbe.* Alis dentatis

nigro flavoque variis, posticis subtus flavescens nigris undatis, basi quadripunctatis, fasciis duabus fulvis, posteriori maculari. *Mantiss.* 568.

*Wien. Verz.* 179. 1. papilio phœbe.

*Esp. pap. tab.* 25. *fig.* 2. papilio cinxia.

— *tab.* 61. *fig.* 4. 5. papilio corythallia. *Mal.*

*Hab. in Europæ centaurea scabiosa. Mus.*

*D. Schieffermyller.*

*Desc. Antennæ* albo nigroque annulatæ, clava ferruginea annulo fusco: *Alæ* supra nigricantes, maculis numerosis, mox pluribus, mox paucioribus nigris. Margo albo maculatus. Subtus *antica* flavæ nigro maculatæ, apice flavæ, nigro undulatæ; *postica* basi flavæ, punctis quatuor nigris, tunc fascia fulva in medio bifida, nigro marginata; tunc flavæ nigro undatæ, demum fascia fulva e punctis septem distinctis & denique flavæ nigro undatæ.

V-Album. 103. P. P. Alis angulatis fulvis nigro maculatis omnibus supra macula alba, posticis subtus lunula alba. *Mantiss.* 489.

*Wien. Verz.* 176. 7. papilio V-album.

*Desc.* Nimis affinis P. *polychloros* & forte mera ejus varietas. Differt tamen alis magis angulatis, macula alba & absque maculis cæruleis marginalibus. *Alæ* subtus variegatæ, lunula centrali alba.

F-Album. 108. P. P. *Desc.* Statura & magnitudo P. *celtis*. *Alæ antica* fulvæ, maculis in medio tribus magnis nigris. Margo fuscus. *Postica* fulvæ, macula magna media lituraque apicis nigris. Subtus fuscæ, lineola media nivea, quæ ad



basin incrassata puncto fusco, apice  
flavescentes. *Mantiss.* 557.

- Arduinna. 109.** P. P. Alis dentatis fulvis nigro maculatis, posticis subtus albis, fasciis duabus fulvis, posteriore nigro punctata. *M.* 577.  
*Desc.* Affinis *P. delia*, at *alæ* supra fulvæ, maculis rarioribus nigris; punctaque *alæ* posticæ simplicia. Margo *alæ* niger, ciliis albis.

- Amathusia. 110.** P. P. (Amathuse) alis dentatis fulvis, maculis strigaeque punctata nigris, posticis subtus variegatis, basi puncto apice striga punctorum. *Mantiss.* 580.

*Hab in* Russia. *D. Boeber.*

*Desc.* Distinctus striga punctorum distinctorum in omni ala. Subtus *posticæ* flavo fulvo fuscoque variegatæ. Punctum distinctum nigrum, subocellatum ad basin & striga punctis sex subtus ocellaribus versus apicem.

- Fascelis. 111.** P. P. Alis dentatis fusco fulvoque variis, posticis subtus albis nigro punctatis, fasciis duabus fulvis, posteriore lunulata. *Mantiss.* 570.

*Desc.* Nimis *D. didymæ* affinis. Differt tamen alis supra obscurioribus, magis fuscis fasciaque posteriore *alæ* posticæ e lunulis fulvis conflata, quæ tamen in fœmina distinctiores.

- Phœbe. 112.** P. P. *Fab.* 571. *M.* Alis repandis fulvis nigro punctatis, posticis subtus albis nigro punctatis fasciisque duabus fulvis.

*Desc.* Minutus in hac familia. *Alæ* supra omnes fulvæ, punctis numerosissimis nigris. Subtus *antica* fulvæ, nigro maculatæ, apice albæ, nigro punctatæ.

*Posticæ*



*posticæ* albæ, strigis plurimis puncto-  
rum nigrorum fasciisque duabus flavis,  
antere abbreviata e maculis tribus.

**Celtis. 113.** P. P. Alis angulato-dentatis fuscis,  
maculis fulvis unicaque alba, posticis  
subtus griseis. *Mantiss.* 556.

*Syst. arch.* 2. tab. 2. fig. 1. 2. 3.

— 3. tab. 2. fig. 1.

*Desc.* Affinis P. *Carinenta* & paullo minor.

*Alæ anticæ* valde angulatæ, conco-  
lores, maculis quatuor fulvis unica-  
que pallidiore. *Posticæ* supra fuscæ,  
macula unica fulva, subtus griseæ,  
lineola parva centrali alba.

*Larva* viridis, nigro maculata lineolis-  
que albis.

*Puppa* viridis albo lineata.

**Bellargus. 132.** P. R. (Adonis) alis integris cæruleis,  
striga marginali atra, subtus cinereis,  
punctis ocellaribus numerosis, posticis  
macula centrali alba. *Mantiss.* 694.

*Wien. Verz.* 184. 11. papilio Adonis.

— 184. 12. papilio Alexis vix differt.

*Desc.* Nimis præcedenti affinis. Differt  
tamen alis supra nunquam argentatis,  
sola striga marginali atra. *Subtus* puncta  
magis ocellata.

*Fœmina* magis cærulescens quam fœmina  
*corydon* & fascia rufa in omni ala  
distinctior solo oculo adsueto distin-  
guenda.

*Larva* viridis, lineis dorsalibus macula-  
rum fulvarum.

**Cyllarus. 135.** P. R. Alis integris cæruleis, margine  
nigro, subtus fusco-cinereis, striga  
punctorum ocellatorum, posticis basi  
cæruleis. *Mantiss.* 685.

*Wien. Verz.* 183. 7. papilio *Damoetas*.

*Pod. Mus. Græc.* papilio *Alexis*.

*Ræf. inf.* 3. tab. 37. fig. 4.

*Geoff. inf.* 2. 63. 31. papilio alis rotundatis cæruleis, subtus ocellorum fascia solitaria.

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ* cæruleæ nitidæ, margine postico fusco. *Fæmina* alis fuscis cæruleo micantibus. Subtus omnes cinereæ, friga incurva punctorum nigrorum ocellatorum, punctis *alæ anticæ* ad marginem anteriorem majoribus. Basis *alæ posticæ* cærulelescens, nitida.

*Larva* pallida, stria dorsali rufa, lineis lateralibus obliquis viridibus, capite nigro.

*Puppa* fusca nigro maculata.

*Corydon.* 136. P. R. Alis integris cæruleo-argenteis, margine nigro, subtus cinereis, punctis ocellaribus, posticis macula centrali alba. *Mantiss.* 693.

*Wien. Verz.* 184. 10. papilio *Corydon*.

*Desc.* Mas. *Antennæ* annulatæ, clava subtus ferruginea. *Alæ* supra argenteæ, nitidæ, margine fusco posticarum maculari. Subtus *anticæ* albidæ, punctis numerosis nigris fere simplicibus; *posticæ* obscuriores, annulo e punctis duodecim ocellatis nigris. In medio hujus annuli macula alba, & pone annulum lunulæ marginales fulvæ, nigro notatæ. *Fæmina*, antennarum clava subtus ferruginea. *Alæ* fuscæ cæruleo micantes, anticis lunula media atra, posticis lunulis marginalibus fulvis. Subtus puncta magis ocellata lunulæque fulvæ distinctiores.

**Biton. 137.** P. R. ( Damon ) alis integerrimis cæruleis subtus fulco cinereis, punctis numerosis, posticis vitra alba. *M.* 684.

*Wien. Verz.* 182. 6. papilio Damon.

*Hab.* in hedyfaro onobrychis Aulurizæ.

*D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcedentis. *Alæ* supra cæruleæ nitidæ; *antica* lunula media margineque fuscis; *postica* margine radiato fusco ( *fæmina* alis supra totis fuscis. ) Subtus *omnes* fusco-cinereæ, lunula media punctisque 5, 6 approximatis atris, annulo albo cinctis. *Postica* punctis septem ocellaribus minoribus & præterea vitra lata albida, quæ tamen marginem posticum haud attingit.

*Larva* obscure viridis, linea laterali obscuriore, capite nigro.

**Tirefias. 138.** P. R. ( Amyntas ) alis caudatis cyaneis, margine nigro, subtus cinereis, punctis nigris posticisque duobus ferrugineis anguli ani. *Mantiss.* 666.

*Wien. Verz.* 185. 18. papilio Amyntas.

*Desc.* Parvus. *Alæ omnes* cyaneæ, nitidæ, margine nigro ciliis albis. *Antica* lunula nigra; *postica* cauda parva alba; subtus *omnes* cinereæ, anticis lunula media strigaeque valde postica punctorum nigrorum. Margo punctis obsoletioribus. *Postica* punctis duobus baseos strigaeque valde undulata punctorum; præterea margo strigis duabus punctorum obsoletiorum, inter quas maculæ duæ fulvæ superne inferneque puncto atro.

**Minimus. 139.** P. R. ( Alfus ) alis integerrimis fuscis immaculatis, subtus cinereis, striga punctorum ocellatorum. *Mantiss.* 688.

Dd ij

Wien. Verz. 184. 9. papilio Alfus.

Schæff. icon. 2. tab. 162. fig. 12.

Desc. *Alæ omnes supra fuscæ nitidulæ, subtus cinereæ, anticis lunula media strigataque e punctis 7 nigris annulo albo cinctis, posticis punctis octo aut novem.*

Arcus. 140. P. R. (Alcon) alis integerrimis cæruleis, margine fusco, subtus fusco-cinereis, punctis numerosis ocellaribus. *Mantiss.* 683.

Wien. Verz. 182. 4. papilio Alcon.

Desc. Statura P. arion. *Mas* alis omnino cæruleis, margine tantum nigricante ciliisque albis. *Fæmina* obscurior, punctis obsoletis obscurioribus. Subtus *omnes* fusco-cinereæ, punctis atris numerosis annulo pallido cinctis.

Tiphon. 141. *Obs.* Hic est verus P. hero Linn. *Hero* autem D. Esp. *sabæus* D. Fab. *Mantiss.* P. F. 352.

Cleobis. 142. P. D. (Acis) alis integris cæruleis, subtus lacte canis, punctis oblongis nigris simplicibus. *Mantiss.* 687.

Wien. Verz. 182. 5. papilio Acis.

Desc. *Mas* alis cæruleis, striga tantum marginali atra. *Fæmina* disco tantum cæruleo, lunula nigra. Subtus argenteo-cinereæ, anticis striga punctorum oblongorum nigrorum absque annulo, posticis punctis sparsis rotundioribus, simplicibus.

Simillimum at caudatum in Russia Australiori invenit D. Boeber.

Telephii. 143. P. R. (Bathus) alis integris nigris cæruleo nitidis, subtus albidis, punctis

atris numerosis, posticis fascia fulva continua. *Mantiss.* 697.

*Wien. Verz.* 185. 17. papilio Bathus.

*Desc.* *Alæ* omnes cæruleo-nigræ. In medio *alæ anticæ* lunulæ cyanæ. Margo ipse albo maculatus. *Subtus* albidæ, *anticis* punctis tribus in medio, strigis quatuor pone medium punctorum atrorum simplicium, *posticis* punctis sparsis baseos strigisque quatuor apicis punctorum atrorum. Inter strigam 2, 3, fascia lata continua fulva.

Meleager. 144. P. R. (Méléager) alis dentatis cæruleis, limbo nigro, subtus canis, punctis ocellaribus nigris. *Mantiss.* 679.

*Wien. Verz.* 182. 1. ♀ papilio endymion.

— 182. 2. ♂ papilio daphnis.

*Desc.* Statura omnino P. arion. *Mas* alis minus dentatis cæruleis, margine tenuissime nigro, *fæmina* alis magis dentatis obscurioribus, limbo nigro, lunulis albis.

Amphion. 148. P. R. (Hylus) alis integris, lunula media punctis marginalibus nigris, subtus cinereis, punctis ocellaribus. *Mantiss.* 696.

*Wien. Verz.* 185. 16. papilio Hylus.

*Desc.* Præcedentibus minor. *Alæ* omnes cæruleæ, lunula media nigra. Margo terminatur striga atra & in posticis ante hanc strigam puncta aliquot atra. *Fæmina* obscurior. *Subtus* cinereæ, punctis numerosis ocellaribus nigris & in posticis fascia e lunulis ferrugineis.

Amphidamas. 149. P. R. (Hille) alis integris obscuris cæruleo micantibus, omnibus subtus punctis ocellaribus numerosis. *M.* 730.

Dd iij



*Wien. Verz.* 181. 4. papilio Hille.

*Naturf.* 6. tab. 5. fig. 2.

*Desc.* Parvus. *Alæ* supra omnes obscuræ, cæruleo micantes lunulisque aliquot apicis fulvis. Subtus *anticæ* punctis itidem numerosis nigris albo annulatis, & versus apicem fascia fulva.

Optilete. 153. P. R. ( Optilete ) alis integerrimis cærulescentibus, margine nigricante, posticis subtus cinereis, punctis ocellaribus atris lunulisque duabus fulvis. *Mantiss.* 691.

*Knoch. Beytr.* 1. tab. 5. fig. 5. 6.

*Desc.* Affinis P. *argo*. *Alæ* supra immaculatæ, margine tenuissime nigro. Subtus *anticæ* cinereæ, puncto medio strigæque postica punctorum ocellatorum; *posticæ* punctis duobus baseos, unico in medio strigæque postica punctorum ocellatorum. Strigæ præterea duæ marginales punctorum nigrorum & inter has lunulæ duæ fulvæ.

Phryne. 156. P. R. ( Phryneus ) alis integerrimis supra albis, subtus fuscis albo venosis, ocellis quinque. *Mantiss.* 354.

*Desc.* Parvus, tener. *Corpus* album. *Alæ* omnes supra albæ, immaculatæ, subtus fuscæ, venis albis. Versus marginem ocelli quinque papilla alba.

Leander. 157. P. R. Alis integerrimis fuscescentibus ( fulvis ) posticis subtus cinereis apice fulvis, ocellis sex. *Mantiss.* 350.

*Desc.* Statura omnino P. *arcanii*. *Mas*, alis fuscis; *famina*, *anticis* fulvis, *posticis* fuscis, ocello uno alterove aut nullo in alis *anticis* & quatuor aut quinque in *posticis*. Subtus *posticæ*

cinereæ', ocellis sex omnibus approximatis pupilla argentea.

Thersa- 158. P. R. Alis subcaudatis fulvis, subtus mon. punctis ocellaribus numerosis, anticis fulvis, posticis cinereis. *Mantiss.* 733.

*Desc.* Statura præcedentium. *Corpus* fulcum. *Maris alæ anticæ* fulvæ, fere immaculatæ, margine nigro. *Posticæ* obscuriores, fascia postica fulva. Subtus *anticæ* flavescentes, punctis tribus strigaeque pone medium e punctis ocellaribus atris. Pone hanc fascia fulva punctis atris. *Posticæ* cinereæ, punctis numerosis ocellaribus fasciaque postica fulva.

Sylvanus. 164. P. U. Alis divaricatis fuscis, maculis quadratis supra flavis, subtus albis. *Mantiss.* 763.

*Desc.* Statura omnino P. comma. *Alæ omnes* supra fuscæ, maculis plurimis quadratis, postice emarginatis flavis. *Subtus* pallidiores, maculis iisdem at albis.

Thaumas. 165. P. U. *Linea* ( la ligne ) alis integerimis divaricatis fulvis, margine nigro. *Mantiss.* 762.

*Wien. Verh.* 159. 5. papilio linea.

*Pod. Mus. Græc.* papilio sylvestris.

*Desc.* Affinis P. comma, at distinctus.

*Antennæ* supra nigrae, subtus flavescentes. *Alæ omnes* fulvæ, haud maculatæ, lineola parva in medio marginæque nigris; cilia marginis tamen albida. *Alæ subtus* immaculatæ. *Femina* absque linea alæ anticæ.

*Barva* solitaria, viridis, immaculata.

*Puppa* tenuissime folliculata, viridis.

Qd iv.

**Steropes. 167.** P. U. *Aracanthus*. Alis rotundatis integerrimis fuscis, posticis subtus griseis, maculis ocellaribus albis. *M.* 808.

*Wien. Verz.* 160. 7. papilio steropes.

*Pall. iter.* 1. 471. 64. papilio morpheus.

*Desc.* Papilio nigro fuscus nitens, alis subtus limbo dentato fulvo, secundariis maculis duodecim albis.

**Alceæ. 168.** P. U. Alis divaricatis fusco cinereoque variis, anticis punctis fenestratis, posticis subtus cinereis immaculatis. *M.* 822.

*Desc.* Nimis affinis P. *malvæ*. *Alæ anticæ* minus obscuriores, cinereo variæ punctisque aliquot fenestratis. *Posticæ* obscuriores, fasciis macularibus albidis. Subtus *omnes* cinereæ fere immaculatæ, punctis aliquot marginalibus nigris.

**Sylvius. 170.** P. U. (Paniscus) alis integerrimis divaricatis, posticis utrinque fuscis fulvo maculatis.

*Wien. Verz.* 160. 6. papilio brontes.

*Pall. iter. app. n.* 63. papilio palæmon.

*Knoch. Beytr.* papilio sylvius.

*Desc.* Variat alis anticis fuscis fulvo maculatis & fulvis atro maculatis.

**Lavateræ. 171.** P. U. (de la lavatere) alis integris fuscis, anticis albo maculatis, posticis punctatis, omnibus lunula media nivea. *Mantiss.* 825.

*Hab.* Kiliæ.

*Desc.* Statura omnino P. *fritilli*, at duplo minor. *Alæ anticæ* concolores, fuscae, in medio valde albo maculatæ & in centro lunula nivea distincta annulo nigro cincta. *Posticæ* fuscae, albo punctatæ, lunula mediâ distincta, subtus concolores.

Sidæ. 172. P. U. Alis integris divaricatis nigris albo punctatis, posticis subtus cinereis, fasciis duabus flavis. *Mant.* 823.

*Desc.* Statura omnino P. *fritilli*, at paulo major. *Alæ omnes* supra fuscæ, maculis quadratis albis posticarum obsoletioribus. Subtus *anticæ* obscuræ, maculis iisdem albis. *Posticæ* albidæ, fasciis duabus flavis nigro marginatis, anteriore abbreviata.

Edufa. P. C. (Éduse) Alis integerrimis fulvis, puncto margineque nigris, subtus virescentibus, anticis puncto nigro, posticis argenteo. *Mantiss.* 240.

*Esp. pap.* 1 tab. 4. fig. 1. papilio hyale. *Hab* in Hispania. D. Vahl.

*Desc.* Nimis affinis P. *hyale*, at *alæ* supra fulvæ, puncto anticarum medio apicibusque atris. *Antennæ* fulvæ. *Mas*, margine nigro immaculato; *femina*, flavo maculato.

Œdippus. P. F. (Œdippe) alis integerrimis supra nigris immaculatis, subtus fuscis, anticis ocellis subtribus, posticis quinque. *Mantiss.* 35.

*Hab.* in Russia Australiori. D. Boeber.

*Desc.* Statura omnino P. *hyperanthi*. *Antennæ* albo nigroque annulatæ, clava ferruginea. *Alæ omnes* supra nigræ immaculatæ, subtus fuscæ, ocellis subtribus, posticis quinque pupilla argentea, unico remoto. Striga marginalis argentea fere obsoleta.

Manto. P. G. (Manto) alis integris fuscis, punctis ocellaribus anticarum quatuor, posticarum tribus, posticis subtus cinereis fusco undatis. *Mantiss.* 397.

*Wien. Verz.* 169. 15. papilio Manto.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Medius. *Antennæ* supra fuscæ, *subtus* albidæ, clava ferruginea. *Alæ* supra fuscæ, cæruleo micantes, punctis ocellaribus atris iride ferruginea. *Subtus. anticæ* disco ferrugineo. *Posticæ* cinereæ, strigis duabus undatis punctisque duobus fuscis.

Alcyone. P. G. ( Alcyone ) alis dentatis fuscis flavo-fasciatis, anticis utrinque ocellis duobus, posticis *subtus* marmoratis. *Mant.* 399.

*Esp. pap. tab.* 84. *fig.* 4. papilio agave.

*Hab. in Russiæ Australioris montosis. D. Boeber.*

*Desc.* Simillimus P. *femele*, at fasciæ alarum distinctior, major striga nigra terminata. *Alæ* minus dentatæ, ciliis albidioribus, & *alæ anticæ* *subtus* haud disco rufo baseos uti in P. *femele*, sed totæ flavescentes strigis nigris.

Medusa. P. G. ( Méduse ) alis subdentatis concoloribus fuscis omnibus fascia maculari flava, ocellis subquatuor. *Mant.* 410.

*Wien. Verz.* 167. 10. papilio Medusa.

*Esp. pap. 1. tab.* 7. *fig.* 2. papilio ligea.

*Alb. inf. tab.* 5. *fig.* 1.

*Schæffer. icon. tab.* 183. *fig.* 2. 3.

*Naturf.* 8. 113. 1.

*Hab. in Austriæ punica. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino P. *ligea*. *Alæ omnes* fuscæ, immaculatæ, at ante marginem fascia macularis, & in hac ocelli iride atra pupilla alba. Numerus eorum variat. *Corpus* atrum immaculatum.

*Obs.* An pap. *ligea* distinctus? V.



**Epiphron.** P. G. (Épiphron.) alis integris nigris fascia rubra, anticis supra ocellis duobus subtus tribus, posticis supra tribus subtus quinque. *Mantiss.* 411.

*Knoch. Beytr.* 3. tab. 6. fig. 7. papilio Epiphron.

*Hab. in Germaniæ montosis. D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino & summa affinitas *P. medusæ*, at duplo fere minor. *Corpus* atrum, antennis subtus albis. *Alæ* supra nigricantes, fascia fulva, anticarum imprimis, valde abbreviata, ocellis duobus approximatis; *posticæ* ocellis tribus omnibus pupillatis. *Subtus* concolores, at anticis ocellis tribus, posticis ocellis quinque. Numerus ocellorum *alæ anticæ* variat.

**Arachne.** P. G. (Arachné) alis integris atris, anticis utrinque fascia rufa ocellis duobus, posticis subtus fascia dentata cinerea. *Mantiss.* 415.

*Wien. Verz.* 169. 18. papilio Arachne.

*Hab. in Austria D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino *P. erinæ*. *Alæ omnes* atræ, cæruleo micantes. *Anticæ* utrinque fascia abbreviata rufa & in hac ocelli duo approximati pupilla alba. *Posticæ* supra atræ, fascia parva maculari rubra, interdum puncto uno alterove ocellari. *Subtus* atræ, fascia dentata cinerea. *Antennæ* supra nigræ, subtus albæ.

**Pyrrha.** P. G. (Pyrrha) alis integris fuscis, fascia rubra anticarum nigro punctata, posticarum maculari. *Mantiss.* 416.

*Wien. Verz.* 167. 9. papilio Pyrrha.

*Hab. in Austria D. Schieffermyller.*

*Desc.* *P. ligea* paullo minor. *Antennæ*

supra nigræ, subtus albæ. *Alæ omnes* supra fuscæ, fascia rufa quæ tamen margines haud attingit. In hac fascia *alæ anticæ* puncta aliquot nigra, *posticæ* macularis, immaculata. *Corpus* immaculatum.

**Cassiope. P. G.** (Cassiopé) alis integris fuscis, fascia rufa, punctis tribus ocellaribus nigris, posticis subtus punctis solis. *Mantiss.* 417.  
*Hab.* in Austriæ gramine. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Præcedenti affinis, at paullo minor. *Corpus* nigrum. *Antennæ* supra nigræ, subtus pallidæ. *Alæ omnes* supra nigræ, fascia margines haud attingente, in posticis imprimis maculari rufa & in hac puncta tria nigra. Subtus *anticæ* concolores; *posticæ* punctis tribus at absque fascia rufa.

**Arete. P. G.** (Areté) alis integris fuscis, fascia rufa, posticis utrinque striga punctorum alborum. *Mantiss.* 418.

*Hab.* in Austriæ montosis. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino præcedentis. *Corpus* nigrum, abdomine subtus griseo. *Alæ* supra nigræ, anticis fascia lata rufa, quæ tamen margines haud attingit & in fascia puncta subtria ocellaria alba. *Posticæ* nigræ, fascia obsoleta rufa & in hac puncta quatuor distincta alba. Subtus *anticæ* disco ferrugineo, punctis tribus ocellaribus albis; *posticæ* griseo-virescentes, striga e punctis septem albis.

**Salome. P. G.** (Salomé) alis anticis fuscis, fascia rufa, anticis ocello, posticis tribus, subtus

striga dentata alba ocellisque quinque.

*Mantiss.* 419.

*Esp. pap. tab.* 67. *fig.* 4.

*Hab. in* Gibraltar. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura præcedentium at distinctus alis posticis subtrus nigris, striga undentata alba; & pone hanc ocelli quinque parvi pupilla alba. *Ocellus* alæ anticæ in nostris pupilla simplici.

**Ilia.** P. G. (*Ilia*) alis dentatis cœruleo micantibus, utrinque fascia alba interrupta, omnibus ocello unico. *Mantiss.* 461.

*Wien. Verz.* 172. 2. papilio *Ilia*.

*Esp. pap. tab.* 37. *fig.* 1. papilio *iris*.

— *tab.* 43. *fig.* 1.

*Hab. in* Germaniæ salice. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Differre a *P. iris* videtur. Differt ocello distincto in pagina inferiori alæ posticæ minus distincto fasciaque haud dentata, nec ocello compresso sed sesqui-altero.

Variat colore nigro albo fasciato & flavo fuscoque vario, semper tamen cœruleo micante. *Fæminæ* magis unicolores minus micant.

**Iole.** P. G. (*Iole*) alis dentatis fuscis cœruleo micantibus, posticis ocello unico, subtrus brunneis, margine rubente.

*Mantiss.* 462.

*Wien. Verz.* 172. 3. papilio *Iole*.

*Esp. pap. tab.* 46. *fig.* 1. papilio *Iole*, at pagina inferior alarum differt.

*Hab. in* Austria. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & summa affinitas præcedentis. Alæ omnes supra fuscæ, cœruleo micantes. Maculæ duæ distinctæ albæ versus apicem alæ anticæ & ocellus

parvus iride ferruginea versus angulum ani. Subtus omnes basi apiceque rubentes in medio brunneæ. Maculæ duæ magnæ nigræ, albæ innatæ versus marginem crassio rem alæ anticæ.

**Hypsipyle. P. P.** (Hypsipyle) alis dentatis flavis nigro variis apice radiatis, posticis punctis septem rubris. *Mantiss.* 504.

*Esp. pap. tab. 15. fig. 1. papilio rumina:*  
 — *tab. 53. fig. 2.*

*Raf. inf. 4. tab. 7. fig. 1. 2.*

*Schæff. icon. tab. 120. fig. 1. 2.*

*Larva* flava nigro punctata, spinis carnosis verticillatis rubris, apice nigris.  
*Puppa* pallida, capite obtuso.

**Aceris. P. P.** (de l'érable) alis dentatis albo fasciatis supra nigris, subtus fulvis.  
*Mantiss.* 514.

*Esp. pap. tab. 82. fig. 1. papilio Aceris:*  
*Mus ex India.*

— *tab. 81. fig. 34. minor ex Hungaria.*

*Hab. in Acere Europæ, Asiæ.*

*Desc. major a minore vix distinctus.*

**Lucilla. P. P.** (Lucile) alis dentatis supra fuscis subtus brunneis, utrinque fascia maculari alba.  
*Mantiss.* 549.

*Wien. Verz. 173. 4. papilio Lucilla.*

*Esp. pap. tab. 59. fig. 1. papilio camilla.*

*Pall. iter. 1. app. n. 62. papilio sapho.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & summa afinitas præcedentium. Differt tamen alis anticis supra linea alba interrupta a basi ad fasciam ducta, posticis, excepta fascia alba, immaculatis. Subtus brunneæ, posticis basi litura tantum alba & pone fasciam striga lunularum albarum.

**Delia. P. P.** (Délie) alis dentatis fulvo nigroque variis, posticis supra punctis quatuor ocellaribus, subtus albis fasciis duabus fulvis, posteriore nigro punctata.  
*Mant.* 176.

*Wien. Verz.* 179. 6. papilio Delia.

*Raf. inf.* 4. tab. 13. fig. 4. 5. larva puppa.

— tab. 18. fig. 4. imago.

*Hab.* in Germaniæ Australioris plantagine.

*Mus D. Schieffermyller.*

*Desc.* Alæ supra fulvo nigroque variæ, margine ciliis albidis. In posticis ante marginem puncta 3, 4 nigra annulo fulvo cincta. Subtus anticæ fulvæ, apice fulvæ, nigro punctatæ. Posticæ basi flavæ, punctis quatuor nigris, tunc fascia fulva interne bifida, nigro marginata, tunc fascia alba nigro punctata, demum fascia fulva nigro marginata punctataque. Margo flavus, nigro punctatus.

*Larva* spinosa atra, lateribus albo punctatis.

*Puppa* livida fulvo punctata.

**Hecate. P. P.** (Hécate) alis dentatis fulvis nigro maculatis, omnibus apice strigis duabus punctorum nigrorum. *Mant.* 578.

*Wien. Verz.* 179. 4. papilio Hecate.

*Hab.* in Austria. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcedentium. Alæ omnes supra fulvæ, nigro maculatæ & ante marginem strigæ duæ punctorum nigrorum. Margo ipse niger, lineolis fulvis ciliisque albis. Subtus anticæ fulvæ nigro undatæ, strigis iisdem. Posticæ basi flavæ, fascia fulva nigro marginata; tunc fulvo flavoque variegatæ, strigis duabus punctorum nigrorum distinctorum.



**Artemis. P. P.** ( *Artémis* ) alis dentatis fulvis nigro variis , posticis utrinque striga punctorum nigrorum. *Mant.* 579.

*Wien. Verz.* 322. 10. papilio *Artemis*.

*Hab.* in Austriæ montosis. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Alæ* supra fulvæ nigro undatæ. Ante marginem posticum *alæ posticæ* , striga e punctis septem nigris distinctis. *Subtus* pallidiores. *Posticæ* fulvæ , fasciis duabus flavis , anteriore extrorsum bifida. Ante marginem striga e punctis septem nigris. Margo flavus.

**Cynara. P. P.** ( *Cynara* ) alis dentatis viridibus nigro maculatis , posticis subtus viridibus maculis tribus fasciisque duabus argenteis. *Mantiss.* 586.

*Wien. Verz.* 176. 1. papilio *Pandora*.

*Esp. pap. tab.* 58. *fig.* 1. 2. 3.

*Desc.* Puncta interdum quinque argentea inter fascias.

**Laodice. P. P.** ( *Laodice* ) alis dentatis fulvis nigro maculatis , posticis subtus apice fuscis glauco nitentibus , fascia argentea interrupta terminante. *Mantiss.* 587.

*Pall. iter.* 1. *app. n.* 61. papilio *Laodice*.

*Schneid. pap. Europ. tab.* 1. *fig.* 1. 2. papilio *Laodice*.

*Hab.* in Borussia , Moscovia. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura & magnitudo fere *P. paphiæ*. Punctum album versus apicem *alæ anticæ*. Subtus *anticæ* flavescentes , nigro maculatæ strigaque e punctis argenteis obsoletis. *Posticæ* basi flavescentes , striga sesqui-altera brunnea , in medio striga interrupta , inæqualis argentea & pone hanc *alæ* fuscae argenteo nitidulæ,

nitidulæ, strigis duabus e punctis obscurioribus.

**Daphne. P. P.** (Daphné) alis dentatis fulvis nigro maculatis, posticis subtus flavis rufo venosis apice ferrugineo argentatis. *Mantiss.* 602.

*Wien. Verz.* 177. 10. papilio Daphne.

— 179. vix differt. conf. papilio

Dictynna.

*Hab.* in rubo idæo Austriæ. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Alæ omnes, uti & anticæ, subtus fulvæ nigro maculatæ. Posticæ subtus basi flavæ, ferrugineo fere reticulatæ, apice brunneæ, argenteo nitidæ, punctis aliquot ocellaribus fuscis.

*Larva* spinosa fusca albido lineata, spinis flavis.

*Puppa* virescens subtus multidentata.

**Spini. P. R.** (du prunier épineux) alis caudatis fuscis subtus cinereis, lunulis marginalibus fulvis maculaque ani cærulescente. *Mantiss.* 651.

*Wien. Verz.* 186. 5. papilio spini.

*Hab.* in Germaniæ pruno spinosa. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis *P. pruni*. Alæ supra omnes fuscæ, posticis apice maculis aliquot rufis. Cauda apice alba. Subtus cinereæ, striga alba ad angulum aniparum angulata. Versus marginem posticum lunulæ aliquot fulvæ nigro notatæ, & ad angulum ani macula magna cærulescens, puncto terminali atro.

*Larva* viridis, lineis dorsalibus macularibus flavis, capite nigro. Adultior rufescens evadit.

*Puppa* supra fusca, subtus cinereo villosa.

*Insect. Tomus IV.*

Ee

Linceus. P. R. (Lincée) alis caudatis fuscis immaculatis, posticis subtus striga lunulata alba rufaque. *Mantiss.* 653.

*Esp. pap.* papilio Linceus.

*Hab.* in Russiæ. Borealis sylvaticis.  
*D. Boeber.*

*Desc.* Statura & summa affinitas *P. spini*.  
*Alæ omnes* supra fuscæ, *maris* immaculatæ, *maris* macula disci fulva. Cauda *alæ posticæ* parva, obtusa. Subtus *alæ anticæ* fuscæ, striga abbreviata e lunulis quinque albidis. *Posticæ* fuscæ nitidulæ, striga e lunulis plurimis albis & pone has lunulæ aliquot rubræ.

Cerasi. P. R. (du cerisier) alis caudatis fuscis immaculatis, subtus striga alba, posticis lunulis fulvis, puncto nigro notatis.  
*Mantiss.* 654.

*Hab.* in Austriæ ceraso.

*Desc.* Statura omnino & summa affinitas *P. pruni*. *Alæ omnes* supra fuscæ, immaculatæ. Subtus *anticæ* fuscæ, striga unica alba. *Posticæ* fuscæ, striga alba & ad angulum ani lunulæ duæ vel tres fulvæ puncto atro. Cauda apice alba.

Acaciæ. P. R. (de l'acacia) alis caudatis fuscis subtus cinerascens, striga alba lunulisque analibus fulvis. *Mantiss.* 655.

*Hab.* in Russia Australiori. *D. Boeber.*

*Desc.* Præcedentibus paullo minor. *Alæ anticæ* supra fuscæ, immaculatæ, subtus cinerascens, striga alba. *Posticæ* supra fuscæ, maculis duabus marginalibus fulvis. Subtus cinerascens, striga alba lunulisque analibus fulvis, puncto uno alterove atro.

Erebus. P. R. ( Erebe ) alis integerrimis fuscis , omnibus subtus striga punctorum ocellatorum. *Mantiss.* 682.

*Knoch. Beytr.* 2. tab. 6. fig. 6. 7. papilio Erebus.

*Desc.* Magnus. *Antennæ* albo nigroque annulatæ , clava nigra. *Alæ* supra fuscae , immaculatæ , subtus fuscae , striga flexuosa e punctis septem atris subocellatis.

Triton. P. R. ( Triton ) alis integerrimis cæruleo-  
tibus , subtus striga ferruginea punctisque numerosis nigris. *Mantiss.* 692.

*Hab.* in Russia Meridionali. D. Boeber.

*Desc.* Medius. *Alæ omnes* supra cæruleo-  
lescentes , striga tenui marginali nigra. Subtus *omnes* cinereæ. *Anticæ* puncto medio plurimisque apicis vix ocellatis , nigris , ante apicem striga e lunulis ferrugineis. *Posticæ* punctis plurimis nigris strigaeque postica ferruginea.

Dorylas. F. R. ( Dorylas ) alis integris cæruleis ( fuscis ) subtus cinereis , anticis puncto medio strigaeque postica punctorum ocellatorum. *Mant.* 695.

*Wien. Verz.* 322. 19. papilio Dorylas.

*Hab.* in Austria. *Mus.* D. Schieffermyller.

*Desc.* Affinis nimis P. *Adonis* , at paullo minor. *Mas* alis supra cæruleis nitidis , striga marginali atra. *Fæmina* alis fuscis , lunulis marginalibus fulvis. Subtus cinereæ , anticæ macula magna centrali ocellari & pone hanc striga e punctis 6, 7 ocellaribus. Margo albicat : *posticæ* puncto baseos , striga incurva punctorum ocellatorum & in medio macula cuneata alba.



Argiades. P. R. (Argiade) alis integerrimis cæruleis ,  
 margine nigricante , subtus fusco-cine-  
 reis , lunula media strigisque duabus  
 punctorum ocellatorum. *Mantiss.* 698.

*Hab. in Saxonia. D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino præcedentium. *Alæ*  
*omnes* supra cæruleæ , margine nigro ,  
 ciliis albis. Subtus *omnes* fusco-cinereæ ,  
 lunula centrali strigisque duabus e punc-  
 tis ocellatis , posteriore obsoletiore.  
 In posticis præterea puncta duo ocellata  
 bascos.

Acreon. P. R. (Acréon) alis integerrimis fuscis subtus  
 nigro ocellatis , posticis fascia alba  
 rubra strigisque punctorum aureorum.  
*Mantiss.* 699.

*Hab. in Russia Meridionali. D. Boeber.*

*Desc.* *Alæ omnes* fuscae , maris basi cæ-  
 ruleo nitidæ lunulisque marginalibus  
 obsoletis fulvis. Subtus *omnes* fusces-  
 centes , anticis puncto medio strigisque  
 postica punctorum ocellatorum. Margo  
 lunulis albis , nigris , fulvis , nigris  
 albisque strigosus. *Posticæ* fuscae , punctis  
 nigris ocellatis. Margo albus fascia  
 fulva antice lunulis nigris , postice  
 punctis læte aureis notata.

Chryseis. P. R. (Chryseïs) alis aureis margine cæru-  
 lescente , posticis subdentatis , subtus  
 obscure griseis , punctis ocellaribus  
 numerosis. *Mantiss.* 725.

*Wien. Verz.* 181. 3. papilio Chryseis.

*Esp. pap. tab. fig.* papilio Eurydice.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis P. *Hippothoe*. *Mas*  
 alis aureis nitidis , lunula nigra margi-  
 neque cæruleo nitente tenuissimeque  
 albo. Subtus *anticæ* obscure cinereæ ,



disco fulvo, punctis ocellaribus numerosis. *Posticæ* in angulum excurrentes, cinereæ, itidem punctis numerosis posticeque fasciola rufa.

*Fæmina* alis supra fuscis fulvo micantibus, *anticis* punctis aliquot obscurioribus, *posticis* fasciola fulva nigro punctata. *Subtus* mari simillima.

Hiere. P. R. (Hiere) alis fuscis nigro punctatis, subtus cinereis, punctis ocellaribus numerosis. *Mant.* 726.

*Wien. Verz.* 322. 8. papilio Lampehe.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo præcedentium. *Mas* alis fuscescentibus, *anticis* cæruleo, *posticis* fulvo micantibus, *anticis* punctis sparsis nigris, *posticis* lunula media nigra fasciaque postica fulva fere obsoleta.

*Fæmina* fusca nigro punctata, *posticis* fasciola fusca distinctiore nigro punctata & ante hanc fasciam lunulæ aliquot cyanæ. *Subtus omnes* cinereæ, punctis numerosis. *Posticæ* fasciola postica fulva.

Xanthe. P. R. (Xanthe) alis subintegris fuscis nigro punctatis, fascia marginali fulva, subtus lutescentibus punctis numerosis. *Mantiss.* 731.

*Wien. Verz.* 181. 6. papilio Xanthe.

*Esp. pav. tab. fig.* papilio Phocas.

*Hab. in rumice acetosa. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Minor. *Alæ omnes* fuscae, nigro punctatæ margineque tenuissime albo & ante marginem fasciola fulva nigro punctata. *Subtus* virescentes, punctis numerosis ocellaribus nigris, *anticis* disco fulvo, *posticis* fasciola fulva, apice subemarginatis.

*Garbus*. P. R. ( *Garbus* ) alis fuscis nigro punctatis ,  
margine albo , subtus virescentibus ,  
punctis numerosis. *Mantiss.* 732.

*Wien. Verz.* 181. 7. papilio *Circe*.

*Hab.* in Austriæ acetosella. D. Schieffer-  
myller.

*Desc.* Nimis præcedenti affinis & forte  
*mas* in copula captus. *Alæ omnes*  
fuscae, obscuræ, nigro punctatæ mar-  
gineque postico albido. Puncta ali-  
quot fulva ante marginem alæ *posticæ*.  
*Subtus* nigro punctatæ, *antica* cine-  
rascentes; *posticæ* haud emarginatæ,  
sed in angulum excurrentes, vires-  
centes, postice fasciola fulva.

*Fritillum*, P. U. ( le ponctué ) alis integris divaricatis  
nigris albo punctatis. *Mantiss.* 824.

*Geoff. inf.* 2. 67. 38. papilio alis den-  
ticulatis divaricatis nigris albo punc-  
tatis.

*Esp. pap. tab.* 51. fig. 2. papilio *malvæ*.

*Schæff. elem. tab.* 94. fig. 9.

*Wien. Verz.* 159. 3.

*Hab.* in Germaniæ dipsaco fullonum.

*Desc.* Differt sane a P. *malvæ*. *Alæ*  
haud dentatæ, margine albo nigroque  
variegato.

*Color* alæ *posticæ* subtus variat.

*Variat* major maculis alarum pluribus,  
vix tamen distinctus in Russia Meri-  
dionali. Papilio *malvæ* major.

*Esp. pap. tab.* 23. fig. 2.

### *Sphinx.*

*Asiliformis*. 25. S. Alis anticis fuscis, posticis fenestratis,  
abdomine barbato atro, cingulis tribus  
flavis.

*Wien. Verz. app.* sphinx asiliformis.

*Desc.* Minor sph. *apiformi*. *Palpi* apice flavi. *Caput* atrum, linea oculorum argentea. *Thorax* ater, margine antico tenuissime flavo punctoque flavo ante alas. *Abdomen* atrum nitidum, cingulis tribus flavis. *Alæ anticae* fuscae, immaculatae; *posticae* hyalinae, margine postico nigro. *Tibiae posticae* flavae.

Tenthredi- 29. S. Alis fenestratis, margine omni-  
niformis. fasciaque nigris, capite thoracis lateribus abdominisque barbati cingulo fulvo.

*Wien. Verz.* 44. 6. sphinx tenthrediniformis.

*Desc.* Parva. *Antennae* nigrae. *Caput* thoracisque latera fulva. *Pedes* fulvi, geniculis nigris.

Ichneumono- 36. S. Alis fenestratis, margine fasciaque  
niformis. nigris puncto fulvo, abdomine cingulis albis nigrisque alternis.

*Wien. Verz.* 44. 7. sphinx ichneumoniformis.

*Desc.* *Antennae* nigrae, interdum basi luteae. *Caput* albidum, vertice nigro. *Thorax* niger, lateribus flavis. *Abdomen* cingulis albis nigrisque latioribus alternis. *Alæ anticae* nigrae, margine omni fusco, & in medio fascia nigra puncto fulvo. *Posticae* hyalinae, margine postico punctoque ad marginem anteriorem nigris. *Pedes* flavi.

Lonicerae. 45. S. (Fulvia) cyanea, alis anticis viridibus, punctis quinque rubris, posticis sanguineis, limbo cyaneo.

*Wien. Verz.* 45. 3. sphinx loti.

Ee. iv.

Scabiofellæ, { 46. S. ( Pythia ) atra , alis anticis  
 Pilosellæ. { viridibus , maculis tribus oblongis  
 approxmatis sanguineis , posticis rubris.  
*Larva* pilosa alba , capite lineis duobus  
 punctorum pedibusque anticis nigris ,  
 posticis flavis.

Peucedani. 49. S. ( filipendulæ ) alis anticis cyaneis ,  
 punctis sex rubris , posticis rubris mar-  
 gine cyaneo.

*Wien. Verz.* 45. 4.

*Rœs. inf.* 1. tab. 57. fig. 6.

*Desc.* Variat rarius abdominis cingulo  
 rufo.

Aeacus. 50. S. Cyanea , alis anticis punctis sex  
 flavis , posticis flavis , margine cyaneo.

*Wien. Verz.* 45. 8. sphinx Aeacus.

*Desc.* Statura & magnitudo S. *Ephiales*,  
*Corpus* cyaneum , nitidum , cingulo  
 abdominis flavo, *Alæ* cyaneæ , punctis  
 sex flavis 2 , 2 , 2 oblique positis.  
*Posticæ* flavæ , margine late cyaneo.

Pruni. 56. S. Viridi-cærulea , alis posticis nigris.

*Wien. Verz. app.* 308. 12. sphinx pruni.

*Desc.* Nimis affinis S. *staticis* , at duplo  
 fere minor & larva alia.

Lineata. S. ( le rayé ) alis virescentibus , fascia  
 strigisque albis , posticis nigris , fascia  
 rubra.

*Arch. inf. fvest. monog. C. fig.* sphinx  
 Kœchlini.

*Petiv. gazoph. tab.* 12. fig. 9.

*Hab.* in gallio vero.

*Larva* caudata , flavicans nigro maculata ,  
 capite linea dorsali stigmatibusque  
 rubris.

*Puppa* fusca.



Sphégiformis. S. ( le sphégiforme ) alis hyalinis margine fasciaque atris , abdomine barbato , cingulo flavo , antennis ante apicem albis. *Mantiss. fesia* 13.

*Wien. Verh. app.* 305. 10. sphinx sphégiformis.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Minor S. *apiformi.* *Antennæ* nigrae ante apicem albæ. *Caput* nigrum , palpis subtus flavis. *Thorax* ater , lateribus flavis. *Abdomen* barbatum , atrum , cingulo secundi segmenti flavo , prætereaque puncta utrinque duo laterali flava. *Pectoris* latera flava.

Sedi. S. ( du sédum ) cyanea , alis anticis maculis tribus connatis , posticis totis rubris. *Mantiss. zygaena* 4.

*Hab. in Russia Meridionali. D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino præcedentium. *Corpus* totum cyaneum , nitidum. *Alæ anticæ* cyaneæ , maculis tribus magnis una post alteram positis , annulo flavo cinctis rubris. *Posticæ* rubrae , margine tenuissime nigro.

## B O M B Y C E S.

### *Alis reversis.*

Populi- 27. B. Alis reversis testaceis dentatis , lunulis numerosis fuscis.

*Wien. Verh.* 310. 5. bombyx populifolia.

*Desc.* Major bomb. *quercifolia.* *Os* nigrum. *Thorax* testaceus , linea dorsali nigra. *Alæ omnes* testaceæ , lunulis numerosis distinctis fuscis. *Posticæ* semitectæ apice pallidiores.

Taraxaci. 29. B. Alis subreversis pallidis unicoloribus ,



anticis puncto medio fusco, corpore fulvo.

*Wien. Verz.* 57. 7. bombyx taraxaci.

*Desc. Major. Corpus* hirtum, fulvum, abdominis dorso nigricante. *Alæ omnes* pallidæ, *anticis* puncto parvo fusco. *Pedes* apice atrii.

*Larva* pilosa atra, fasciis abbreviatis flavescens.

Trifolii, 30. B. Alis reversis ferrugineis, anticis striga punctoque albis, posticis immaculatis.

*Wien. Verz.* 57. 4. papilio trifolii.

*Ræf. inf.* 1. *pap.* 2. *tab.* 35. *a. fig.* 4. 5. imago.

— *tab.* 35. *b. fig.* 1. larva.

*Desc.* Affinis bomb. *quercus*. Differt tamen alis utrinque sexus brunneis. *Posticæ* immaculatæ.

*Larva* solitaria pilosa dilute fusca, incisuris cærulescenti punctatis, collari rubro.

*Puppa* folliculata antice flava, postice brunnea.

Lentipes, 31. B. (Énéria) alis reversis luteis (brunneis *fæm.*) puncto albo, apice pallidioribus.

*Knock. inf.* 1. *tab.* 2. bombyx Éneria.

*Wien. Verz.* 57. 3. bombyx catax.

*Desc.* Species omnino distincta. *Mas* flavescens, *fæmina* brunnea, puncto medio niveo.

*Ova* aggregata hirsutæ matris testæ, disco impresso.

*Larva* gregaria, pilosa, brunnea, incisuris nigris maculisque lateralibus cæruleis sulphureo punctatis.

*Puppa* folliculata flavescens.

Franconica, 35. B. Alis reversis hyalino-albidis, striga pallida, limbo nigro.

*Wien Verz.* 57. 6. bombyx Franconica.  
*Desc.* Minor bomb. *Neustria*. *Antennæ*  
 fuscæ. *Caput & thorax* hirta flavesc-  
 centia. *Abdomen* fuscum. *Alæ omnes*  
 albo-hyalinæ, limbo nervisque fuscis.  
 Striga albida in medio.

*Fæmina* major, tota brunnea, imma-  
 culata, lunula sola media alæ anticæ  
 parum obscuriore.

Pudica. 54. B. Alis deflexis albis anticis fusco macu-  
 latis, posticis immaculatis.

*Desc.* Statura & magnitudo bomb. *macu-*  
*losæ*. *Caput & thorax* fusca, thorace  
 lunulis duabus antice connatis albis.  
*Alæ omnes* albæ, *anticæ* maculis fere  
 trigonis numerosis fuscis. *Posticæ* im-  
 maculatæ. *Subtus* subconcolores, pos-  
 tics maculis duabus fuscis.

Casta. 55. B. Alis deflexis atris, fasciis duabus den-  
 tatis albis, posticis rubris, maculis  
 marginalibus fuscis.

*Desc.* Statura & magnitudo bomb. *macu-*  
*losæ*. *Corpus* nigrum. *Thorax* fascia  
 antica pallida. *Abdomen* punctis baseos  
 rubris. *Alæ anticæ* nigræ, fasciis  
 duabus unidentatis albis. Punctum  
 parvum in medio castæ & litura versus  
 apicem.

Maculosa. 57. B. Alis deflexis nigro maculatis, anticis  
 fuscis, posticis rubris.

*Wien. Verz.* 59. 10. phalæna maculosa.  
*Knoch. Beytr.* 3. tab. 5. fig. 2. phalæna  
 maculosa.

*Hab.* in Germaniæ Australioris gallio  
 aparineo. *Mus. D. Zschuck.*

*Desc.* Magnitudo bomb. *plantaginis*.  
*Thorax* cinereus, lineis tribus atris.

*Alæ anticæ* fuscæ, punctis plurimis atris sparsis. *Posticæ* rubræ, striga lunula maculisque tribus marginalibus atris, interiore geminata. *Abdomen* atrum, linea laterali sanguinea, quæ tamen apicem haud attingit.

*Larva* solitaria pilosa nigra, verrucis cæruleis lineaque dorsali flava.

*Obs.* An varietas? An species?

**Auriflua. 59.** B. Alis deflexis albis, anticis subtus costa fusca, ano barbato luteo.

*Wien. Verz.* 52. 4. bombyx auriflua.

*Röf. inf.* 1. *phal.* 2. *tab.* 21.

*Desc.* Summa affinitas bomb. *chrysoorrhoeæ*, differt tantum costa alæ *anticæ* subtus nigra. Puncta interdum nigra sparsa in pagina superiori alarum.

*Larva* pilosa, nigra rubro lineata punctisque lateralibus albis, verruca collari caudalique.

**Lucifera. 66.** B. Alis deflexis atris, angulo ani flavo, abdomine supra flavo, linea dorsali punctata nigra.

*Wien. Verz.* 54. 4. bombyx lucifera.

*Desc.* Statura præcedentium. *Caput* & *thorax* atra. *Abdomen* subtus atrum, supra flavum, linea punctorum nigrorum. *Alæ omnes* atræ, angulo ani flavo.

**Plumige-72.** B. Alis deflexis subferrugineis, strigara. flavescente, antennis maris pectinatis.

*Wien. Verz.* 61. 2. bombyx plumigera.

*Desc.* Media. *Corpus* hirtum, ferrugineum. *Alæ anticæ* mox ferrugineæ, unicolores, mox flavo mixtæ, striga palidior; *posticæ* immaculatæ. *Ab-*

*domen flavescens. Antennæ maris radiis longissimis.*

*Larva solitaria glabra viridis, albo lineata.*

Cassinia. 74. B. Alis deflexis griseis, lineolis abbreviatis nigris sparsis.

*Wien. Verz. 61. 1. bombyx. Cassinia.*

*Desc. Magna. Thorax cinereus, linea dorsali lateralique atra. Alæ anticæ griseæ, lineis aliquot atris. Versus marginem posticum striga fere obsoleta, angulata, pallida. Alæ posticæ pallidæ. Subtus albidæ, macula centrali fusca.*

Anacho-77. B. Alis deflexis griseis, strigis albidis, macula apicis fusco ferruginea, striga undata alba.

*Wien. Verz. 56. 3. bombyx anachoreta.*

*Raf. inf. 3. tab. 43.*

*Desc. Affinis præcedentibus. Alæ griseæ, strigis quatuor albidis, quarum ultima maculam apicis undata transit. Ad angulum ani alæ anticæ puncta duo atra, uno altero majore.*

*Larva pilosa fusca, striga dorsali incarnata, verrucis duabus elevatis punctisque lateralibus rufis.*

*Puppa folliculata, brunnea.*

Reclusa. 78. B. Alis deflexis griseis, strigis albidis subanastomosantibus, macula apicis ferruginea, puncto marginali albo.

*Wien Verz. 56. 4. bombyx reclusa.*

*Raf. inf. 4. tab. fig. 1.-6.*

*Desc. Nimis affinis bomb. curtulæ, sed paullo minor. Strigæ alarum albæ magis interruptæ, magis anastomosantes. Macula ferruginea apicis minor, puncto tantum marginali albo & puncta atra anguli ani. Alæ anticæ omnino defunt.*

*Larva* fusca, linea dorsali cinerea, maculis duabus nigris.

*Puppa* folliculata, brunnea.

**Tritophus. 103.** B. (Tritophe) alis deflexis dorso dentatis, fusco nebulosis, lunula media ferruginea albo cincta.

*Wien. Verz.* 63. 6. bombyx Tritophus.

*Desc.* Statura omnino bomb. *χiczac.*

*Caput & thorax* hirta, fusca. *Abdomen* cinereum. *Alæ anticae* fusco nebulosæ, strigis aliquot obsoletis, undatis, obscurioribus. In medio lunula alba, pupilla lunata ferruginea. *Posticae* albæ, litura anali fusca.

*Larva* solitaria nuda viridis, gibberibus dorsalibus tribus caudalique obtusa, capite fusco.

**Oleagina. 104.** B. Alis deflexis viridibus fusco subundatis, maculis duabus albis, anteriore pupillata, posteriore majore.

*Wien. Verz.* 59. 2. bombyx oleagina.

*Desc.* *Antennæ* pectinatae, ferrugineae, rachi alba. *Maculae* duae distinctae *alæ anticae*, antica pupilla ferruginea, postica majore. *Posticae* albidæ, margine fusco.

*Larva* postice quadridentata, cinerea, nigro rubroque punctata, collari sanguineo, punctis nigris.

**Pithyocampa. B.** (Pithyocampa) alis reversis griseis, strigis tribus obscurioribus, posticis palalidis, puncto anali fusco. *Mant. B.* 66.

*Wien. Verz.* 58. 11. bombyx Pithyocampa.

*Hab. in* Austriæ pino. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo bomb. pro-



*cessionæ*. *Alæ anticæ* griseæ, strigis tribus undatis nigricantibus. *Posticæ* albæ, macula anguli ani fusca. *Corpus* hirtum griseum, *abdomine* flavescente. *Larva* pilosa cærulescens, maculis dorsalibus flavis, capite atro.

**Cinerea. B.** ( le cendré ) alis subreversis cinereis, anticis punctis quatuor atris subocellaribus.

*Hab. in Austria. Dr. Schulz.*

*Desc. Media. Antennæ* pectinatæ atræ. *Thorax* hirtus, cinereus. *Abdomen* fuscum. *Alæ* cinereæ, supra punctis quatuor nigris annulo albo cinctis. *Posticæ*, uti *omnes*, subtus immaculatæ.

**Mali. B.** ( du pommier ) alis reversis cinereis, fascia sinuata obscuriore, puncto atro.

*Hab. in malo & corylo Hafniæ. D. de Loewenskioldt.*

*Desc. Statura* omnino bomb. *castrensis*. *Antennæ* valde pectinatæ. *Caput & thorax* hirta, cinerea. *Alæ anticæ* cinereæ, fascia media lata obscuriore, quæ antice posticeque striga sinuata nigra terminatur. In medio fasciæ punctum atrum. Striga obsoleta fusca ad marginem posticum. *Posticæ*, uti *omnes*, subtus obscuriores, striga media fusca. *Larva* solitaria, pilosa, brunnea, linea dorsali pallidiore, stigmatibus cærulescentibus.

**Avellanæ. B.** ( du noisetier ) alis reversis obscure cinereis, fascia sinuata obscuriore immaculata.

*Reaum. inf. I. tab. 44. fig. 7.-10.*

*Hab. in malo & corylo Hafniæ. D. de Loewenskioldt.*

*Desc.* Statura omnino præcedentis. *Caput* & *thorax* pilosa, obscure cinerea, immaculata. *Alæ* obscure cinereæ, fascia lata media sinuata obscuriore. *Antennæ* parum pectinatæ.

*Terebra. B.* ( la tarriere ) alis deflexis dorso dentatis cinereis, atomis strigisque undatis fusco-ferrugineis, thorace postice striga albida,

*Wien. Verz.* 60. 2. bombyx terebra.

*Hab.* in Germaniæ ligno. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura bomb. *Coffus*, at paullo minor. *Antennæ* vix pectinatæ albidæ. *Thorax* hirtus fuscus, striga postica albida. *Alæ anticæ* in medio dorsi angulatæ, cinereæ, strigis undatis atomisque fuscis. *Alæ posticæ*, uti omnes subtus albidæ. *Abdomen* albidum, ano fusco.

*Flavomaculata. B.* ( le tacheté ) alis deflexis obscure cinereis, fascia media lata angulata nigra, macula marginali flava.

*Hab.* Hafniæ. *D. de Schestedt.*

*Desc.* Media. *Caput* & *thorax* hirta nigra. *Alæ* obscure cinereæ nitidulæ, fascia in medio lata atra, quæ postice ad marginem exteriorem angulum format & in hoc angulo macula magna flava. Margo posticus fuscus, punctis aliquot atris. *Posticæ* subtus cinereæ, puncto strigique postica fuscis. *Pedes* nigri flavo annulati. *Anus* flavus.

*Rubea. B.* ( le rougeâtre ) alis reflexis hyalino pallide rufescentibus, puncto medio pallido.

*Wien. Verz.* 51. 2. bombyx rubea.

*Hgb.*

*Hab. in quercu. D. Schieffermyller.*

*Desc. præcedente major. Alæ omnes pallide rufescentes, fere hyalinæ, puncto medio pallido. Antennæ pectinatæ.*

**Testudo. B.** ( la tortue ) alis deflexis flavis f. ferrugineis, strigis duabus obliquis obscurioribus.

*Sp. inf. 2. 189. 86.*

*Wien. Verz. 65. 1. bombyx testudo.*

*Desc. Strigæ ad marginem anteriorem coeunt.*

*Larva apoda, ovata, nuda, viridis, lineis duabus dorsalibus albidis.*

*Puppa folliculata, brunnea.*

**Asella. B.** ( le cloporte ) alis deflexis fuscescentibus immaculatis.

*Wien. Verz. 65. 2. bombyx asella.*

*Hab. in Austriæ populo. D. Schieffermyller.*

*Desc. Statura omnino præcedentis, at triplo minor, tota fusca, immaculata, nitidula.*

*Larva apoda<sup>1</sup>, ovata, rubra, linea dorsali flava nigro punctata, lateribus viridibus.*

*Puppa folliculata, brunnea.*

**Bufo. B.** ( le crapaud ) alis deflexis flavescenscentibus, fascia lata fusca, maculis flavis.

*Hab. in Germania. D. Hybner.*

*Desc. Statura omnino præcedentium. Antennæ flavescenscentes. Corpus flavescens. Alæ anticæ flavescenscentes, fascia lata fusca, quæ ad marginem posticum adhuc magis extenditur. In hac fascia maculæ duæ, altera in medio, altera ante angulum ani. Posticæ fuscæ, angulo*

ani flavescente. Subtus *anticae* fuscae, *posticae* flavescentes.

Trepida. B. ( le tremblant ) alis deflexis dorso unidentatis griseis, puncto medio ocellari strigaeque postica maculari fuscis.

Wien. Verz. 49. 4. bombyx tremula.

Hab. in Austriae quercu. D. Schieffermyller.

Desc. Magna. *Antennae* pectinatae, ferrugineae. *Thorax* fuscus. *Abdomen* cinereum. *Alae anticae* obscurae griseae, in medio puncto oblongo fusco annulo albo cincto & postice striga e punctis sex fuscis. Dens validus, erectus niger in medio marginis interioris. *Posticae* albae, margine interiori griseo.

*Larva* solitaria nuda, viridis, lineis duabus dorsalibus albis lateralibusque obliquis flavo rufis.

*Puppa* folliculata dimidia, sub terra.

Querna. B. ( du chêne ) alis deflexis griseis, strigis tribus atris albæ innatis.

Vien. Verz. 49. 5. bombyx querna.

Hab. in Austriae quercu. D. Schieffermyller.

Desc. Media. *Antennae* pectinatae, ferrugineae. *Corpus* hirtum, griseum. *Alae anticae* griseae, strigis tribus undatis albo marginatis nigris, quarum baseos minima. Ante strigam posticam litura albida. *Posticae* albidæ.

*Larva* postice gibba nuda viridis, lineis quatuor flavis spiraculisque atris.

Helvola. B. ( le paillet ) alis deflexis helvolis, maculis ordinariis strigaeque postica cinereis.

Hab. Kiliae. D. Daldorf.



*Desc. Media. Antennæ* pectinatæ. *Caput*, *thorax* helvola. *Abdomen* cinereum, ano barbato helvolo. *Alæ anticæ* helvolæ, maculis ordinariis strigæque postica fere obsoleta cinereis. Ante strigam puncta aliquot cinerea. *Posticæ* cinereæ.

Undata. B. ( l'ondé ) alis deflexis cinereis ; fasciis duabus fuscis cinereo undatis.

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc. Corpus* medium cinereum. *Alæ anticæ* cinereæ, fascia ante medium alteraque pone medium fuscis & in his fasciis strigæ aliquot cinereæ. Ad basin & ad marginem posticum puncta aliquot fusca. *Posticæ* cinereæ.

Advena. B. ( l'étranger ) alis deflexis fuscis, punctis dorsalibus albis, posticis nigris, macula media fulva, puncto nigro.

*Hab. in Hispania. D. Vahl.*

*Desc. Magnitudo & statura* præcedentis. *Antennæ* pectinatæ nigræ, rachi alba. *Thorax*, *abdomen* hirta, cinerea. *Alæ anticæ* fuscae, lineola baseos punctisque tribus costalibus subocellatis albis. *Posticæ* nigræ; macula magnâ oblonga fulva puncto nigro. Lineola interrupta marginis tenuioris fulva.

Communi- B. ( le dorsal ) alis deflexis pallide carneis, macula magna dorsali fusca.

*Wien. Verz. 85. 7. bombyx communi-macula.*

*Hab. in Europa Austrialiiori. D. Romanus.*

*Desc. Parva. Corpus* albidum. *Alæ* pallide carneæ, macula magna oblonga marginis tenuioris fusca. *Posticæ* omnino albidæ.



**Centrolinea. B.** ( le centré ) alis deflexis cinereo fuscoque nebulosis, lineola centrali alba atræ innata.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna statura *B. cassiniæ*. *Antennæ* ferrugineæ. *Corpus* hirtum. *Thorax* griseus. *Abdomen* fuscum. *Alæ* cinereo fuscoque nebulosæ atroque parum undatæ, in medio lineola abbreviata nivea, atro utrinque marginata; *subtus* griseæ, disco fusco. *Posticæ* supra obscuræ, subtus albidæ, macula centrali fusca.

**Paradoxa. B.** ( le paradoxe ) alis subincumbentibus fusco cinereoque variis, macula centrali albida, posticis atris, *fæmina* aptera.

*Hab. in tritico repente Russiæ. D. Boeber.*

*Desc.* *Mas* niger, antennis valde pectinatis, rachi albida. *Alæ* fuscæ cinereo variæ, imprimis ad marginem tenuiorem. Macula magna albida in medio alæ & margo posticus albo punctatus. *Posticæ* atræ, ciliis albis. *Fæmina* omnino aptera absque ullo allarum rudimento.

**Zona. B.** ( l'orné ) alis incumbentibus nigris fasciis albis, abdomine atro, segmentorum marginibus sanguineis. *Fæmina* aptera.

*Wien. Verz. 100. 5. phalæna zonaria.*

*Hab. in Germaniæ millefolio. D. Pflug.*

*Desc.* Magnitudo & statura omnino *B. antiquæ*. *Antennæ* pectinatæ nigrae, rachi alba. *Thorax* hirtus cinereus, lineis tribus nigris. *Alæ anticæ* nigrae, vitta lata abbreviata baseos, quæ in medio oblique strigaque postica albis. *Alæ posticæ* albidæ, striga media

margineque postico nigris. *Abdomen* villosulum atrum, segmentorum marginibus sanguineis. *Fœmina* aptera, crassa, villosa, abdominis segmentis margine sanguineis. Rudimenta alarum utrinque duo, brevia, cylindrica, hirta, nigra.

Viciella. B. ( de la vesse ) alis incumbentibus cinereo hyalinis, antennis fuscis.

*Wien. Verz.* 133. 2. tab. I. a. fig. 7. tinea viciella.

— tab. 1. b. fig. 7.

*Geoff. inf.* 203. 50. tinea involucro palearum unico tecto.

*Reaum. inf.* 3. tab. II. fig. 7. 8.

*Frish. inf.* 6. 16. tab. 7.

*Hab. in vicia sylvatica Europæ. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Corpus* cinereo lunatum. *Antennæ* pectinatæ fuscæ. *Alæ* cinereo hyalinæ, nervosæ, immaculatæ. *Fœmina* intra puppam ova excludit, nec declaratur.

Muscella. B. ( le diaphane ) alis incumbentibus obscure hyalinis, corpore atro.

*Wien. Verz.* 133. 3. bombyx muscella.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc. Parva. Corpus* totum hirtum; atrum, antennis fuscis. *Alæ* hyalinæ, immaculatæ.

Bombella. B. ( le pointillé ) alis incumbentibus cinereis, fusco irroratis.

*Wien. Verz.* 133. 4. tinea bombycella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Thorax* hirtum, griseum. *Alæ anticae* cineræ, atomis numerosis fuscis; *posticae* immaculatæ.

*Pectinella*. B. ( le pectiné ) alis incumbentibus cinereo-hyalinis, anticis strigis obsoletis obscurioribus.

*Hab.* in Austria. *Mus.* D. Schieffermyller.

*Desc.* Parva. *Corpus* hirtum nigrum. *Alæ antica* cinereo-hyalinæ, strigis undatis vix conspicuis obscurioribus. *Postica* immaculatæ.

*Popularis*. B. ( le populaire ) alis incumbentibus fuscis albo venosis, posticis albidis.

*Hab.* in Russia, Germania. D. Boeber.

*Desc.* Statura omnino B. graminis. *Antennæ* pectinatae, fuscae. *Alæ antica* fuscae, venis albis. In medio maculae ordinariae pupilla obscuriore. Versus apicem striga e maculis parvis sagittatis atris. *Postica* albidæ, margine obscuriore subtusque puncto centrali fusco.

### *Noctua.*

*Crux*. N. ( la croix ) alis rufo-luteis, lineis duabus obliquis albis, antennis ferratis.

*Hab.* Hafnia. D. de Schesfeldt.

*Desc.* Statura N. *hecla*, at paullo major. *Antennæ* valde ferratae, rufae. *Caput & thorax* hirta, grisea. *Alæ* luteae, rufo mixtae, lineis duabus obliquis albis ad marginem tenuiorem fere coeuntibus. *Postica*, uti omnes, subtus obscuriores.

*Tetra*. N. ( la quadriponctué ) laevis, alis incumbentibus fusco nitidulis, punctis quatuor costalibus albis, posticis cinereo ferrugineis.

*Hab.* in Austriae alpine. D. Schieffermyller.

*Desc.* Sequenti duplo minor. *Caput &*

*thorax* fusca, nitidula immaculata. *Alæ anticæ* itidem fuscæ, immaculatæ, punctis tribus costalibus parvis versus apicem. *Posticæ* cinereæ, ferrugineo nitidulæ. *Subtus* cinereæ. *Antennæ* pectinatæ.

*Larva* nuda viridis, lineis quinque albis, mediis tenuioribus, capite pallidiore.

**Livida. N.** ( la livide ) lævis, alis incumben-  
tibus atris nitidulis, posticis ferrugineis, margine fusco.

*Wien. Verz.* 85. 13. noctua livida.

*Hab. in* Austriæ taraxaco. *D. Schieffermyller.*

*Desc. Corpus* totum, uti *alæ*, atræ nitidulæ.

*Larva* utrinque attenuata, nuda, flavo virescens, rubro micans, linea dorsali obscuriore, laterali tenui pallida, variegata, capite pallidiore.

**Nervosa. N.** ( la nerveuse ) lævis, alis incumbentibus lanceolatis, cinereo-fuscis, pallido striatis.

*Wien. Verz.* 85. 12. noctua nervosa.

*Hab. in* Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Alæ* singulares, lanceolatæ, obscuratæ, pallido lineatæ. *Posticæ* albæ, immaculatæ, *subtus* fuscæ, margine albo.

**Capreæ. N.** ( du faule ) lævis, alis incumbentibus repandis fusco-cinereis nitidulis, strigis tribus obliquis stigmatibusque albidis.

*Hab. in* Hafniæ salice. *D. de Schestedt.*

*Desc. Media. Caput & thorax* hirta obscure cinerea. *Alæ anticæ* margine postico repando, obscure cinereæ

frigis tribus albidis, duabus ante, tertia pone medium. Stigmata sive maculae ordinariae alidae, anteriore rotundata, posteriori majori veniformi. *Posticae* fuscae, margine cinereo. *Subtus* cinereae, atomis puncto medio frigaeque posticae fuscis.

*Larva* solitaria, nuda, viridis.

Arundinis. N. (du roseau) laevis alis deflexis cinereis, punctis lunulisque marginalibus nigris, subtus macula centrali fusca.

*Scheve Naturforsh. tab. fig.*

*Hab.* in arundinis caulibus, equis lethalis.

*Desc.* Magna. *Corpus* cinereum, hirtum, immaculatum. *Alae anticae* obscurae cinereae, nitidulae, punctis parvis nigris. In margine crassiori puncta tria pallida. Margo posticus lunulis octo atris. *Posticae* pallidae. *Subtus anticae* obscurae; *posticae* pallidae, macula centrali fusca.

Silene. N. (silene) alis deflexis helvolis, macula postica nigro punctata.

*Wien. Verz.* 85. 1. noctua silene.

*Hab.* in brassica campestris. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Caput & thorax* helvola, immaculata. *Alae anticae* helvolae, striga media abbreviata paullo obscuriore. Maculae ordinariae griseae, posteriori veniformi nigro punctata. *Variat* macula anteriori lunula nigra.

*Larva* nuda, obscure fusca, collari nigro albo marginato, stigmatibus nigris.

Rubiginea. N. (la rouillée) laevis, deflexis flavis ferrugineo undatis, punctis nigris sparsis.

*Wien. Verz.* 86. 8. noctua rubiginea.



*Hab. in pyro malo. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Statura præcedentium. Antennæ fuscescentes. Caput & thorax flava, immaculata. Alæ anticæ flavæ, strigis plurimis undatis ferrugineis. Puncta nigra plurima, imprimis versus apicem. Posticæ fuscæ, margine fulvo.*

Strigosa. N. ( la rayée ) lævis, deflexis fusco cinereoque variis, lineolis tribus atris ante marginem interiorem.

*Wien. Verz. 88. 15. noctua strigosa.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Parva. Corpus cinereum. Alæ anticæ variegatæ, striga apicis undata. Margo interior fuscescens, lineolis tribus longitudinalibus atris. Posticæ cinereæ.*

Scutosa. N. ( la noble ) lævis, alis deflexis fusco alboque variis, posticis basi albis, macula fusca, apice fuscis albo maculatis.

*Wien. Verz. 89. I. noctua scutosa.*

*Hab. in artemisia campestri. D. Schieffermyller.*

*Desc. Statura & magnitudo N. glypticæ. Corpus griseo - fuscum. Alæ anticæ fuscæ, in medio albæ, maculis tribus fuscis cinctis, apice fuscæ, strigis punctisque marginalibus albis, subtus limbo albo punctis tribus magnis atris. Posticæ basi albidæ, macula magna fusca, apice fuscæ striga obsoleta maculisque duabus albidis. Subtus albæ, puncto medio, striga maculaque apicis fuscis.*

*Larva virescens nigro punctata lineisque tribus obscurioribus.*

Ononis. N. ( de l'arrête-bœuf ) lævis , alis deflexis cinereis , carneo nitentibus fusco fasciatis , posticis atris , maculis tribus albis.

*Wien. Verz.* 89. 4. noctua ononis.

*Hab.* in ononis spinosæ floribus. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino N. *dipsacæ*. *Alæ anticæ* basi cinereæ , in medio fascia fusca cinerea. Margo late fuscus , striga parva cinerea. *Posticæ* atræ , maculis tribus cinereis.

*Larva* solitaria nuda , striis roseis ac purpureis alternis , purpurea atomis nigris.

Triquetra. N. ( la triangulaire ) lævis , alis deflexis cinereis , maculis quatuor fuscis , anterioribus triquetris , posticis flavis fusco fasciatis.

*Wien. Verz.* 94. 6. noctua triquetra.

*Hab.* in Austria. *Mus. D. Romani.*

*Desc.* Statura omnino N. *mi.* *Corpus* cinereum. *Alæ anticæ* cinereo fuscoque variæ , macula magna media triquetra nigra , & pone hanc tres fere coadunatæ , aliæ fuscæ. *Alæ posticæ* flavescentes , fascia baseos margineque postico fuscis.

Palliata. N. ( le manteau ) lævis , alis anticis ferrugineis , puncto apicis atro , posticis atris , margine fulvo.

*Hab.* in Germania. *D. Hybner.*

*Desc.* Magnitudo N. *albicolis*. *Caput & thorax* obscure ferruginea. *Abdomen* supra fuscum , subtus cinereum. *Alæ anticæ* ferrugineæ , striga postica obsoleta cinerea punctoque postico distincto atro. *Posticæ* atræ , margine fulvo.

Subtus omnes nigræ , marginibus flavis.

**Miniosa. N.** ( la peinte ) lævis , alis deflexis , strigis tribus undatis maculisque ordinariis miniaceis.

*Wien. Verz.* 88. 14 noctua miniosa.

*Hab. in Austriæ quercu. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino *N. trapezina*. *Antennæ* pectinatæ , ferrugineæ , strigis tribus miniaceis. Versus marginem striga punctorum nigrorum. *Posticæ* albidæ , striga marginali fusca.

*Larva* nigra , linea laterali interrupta flava , collari trilineato.

**Instabilis. N.** ( la fragile ) lævis , alis deflexis griseis , fascia media ferruginea.

*Wien. Verz.* 76. 1. noctua instabilis.

*Hab. in Austriæ amygdalo communi. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Rustica media. *Corpus* hirtum , subferrugineum. *Alæ anticæ* griseæ , subundatæ , fascia media undata ferruginea. *Posticæ* supra fuscae , subtus cinereæ , puncto centrali fusco.

*Color alæ anticæ* variat ; fascia ferruginea tamen semper constans.

*Larva* nuda viridis , linea dorsali alba , laterali flava.

**Humilis. N.** ( l'humble ) lævis , alis deflexis griseis , strigis tribus flavescensibus mediaque fusca , margine punctato.

*Wien. Verz.* 76. 3. noctua humilis.

*Hab. in leontodonte taraxaco. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Antennæ* ferrugineæ. *Corpus* griseum. *Alæ* griseæ , maculis duabus

ordinariis annulo flavescente cinctis. Strigæ tres flavescences, unica ad basin, duabus versus apicem & præterea unica in medio, quæ maculam posteriorem transit. *Posticæ* fuscæ, *subtus* albidæ, puncto medio fusco.

*Larva* nuda, obesa, viridis, linea dorsali lateralique albis, priore nigro marginata.

**Lychnidis. N.** ( du lychnis ) lævis, alis deflexis ferrugineo-fuscis flavo striatis.

*Wien. Verz.* 76. 5. noctua lychnidis.

*Hab.* in lychnidis dioicæ capfulis. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Rustica. *Corpus* griseum, antennis ferrugineis. *Alæ anticæ* obscuræ, subferrugineæ, striis flavis 6, 7 a basi ultra maculas ordinarias ductis, strigam posticam tamen haud attingunt. Versus apicem strigæ duæ; altera strias fere terminat, altera posterior. Maculæ ordinariæ in medio. Margo subpunctatus. *Posticæ* fuscæ.

*Larva* viridis ferrugineo punctata lineaque laterali ferruginea.

**Fixa. N.** ( la fixe ) lævis, alis deflexis, anticeis basi pallidis apice virescentibus, striga pallida, posticis flavis, margine nigro.

— *Hab.* in Gibraltar. *D. Boeber.*

*Desc.* Parva. *Corpus* supra fuscescens, subtus flavum. *Alæ anticæ* basi cinerascens, in medio fascia fusca; apice virescentes striga cinerea. *Posticæ* flavæ, strigis ante marginem margineque nigris.

**Blanda. N.** ( l'agréable ) lævis, alis deflexis cinereo-fuscis, strigis albidioribus.

*Wien. Verz.* 77. 8. noctua blanda.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Rustica media. *Ala antica* cinereo-fuscæ, strigis albidioribus. In medio maculæ ordinariæ & pone has sæpe striga punctorum nigrorum. *Posticæ* albidæ.

Ambigua. N. ( l'ambigue ) lævis cinerea, atomis strigaeque pone medium nigris.

*Wien. Verz.* 77. 10. noctua ambigua.

*Hab. in leontedonte, soncho, chenopodio. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Rustica indistincta, cinerea, punctis aliquot baseos strigaeque pone medium nigris. Maculæ ordinariæ in medio. *Posticæ* albidæ, *subtus* puncto medio nigro.

*Larva* ferrugineo fuscoque variegata, capite fusco.

Gracilis. N. ( la mince ) lævis, alis deflexis fusco-cinereis, striga undata fusca baseos, flavescenque apicis, intermedia punctata.

*Wien. Verz.* 76. 4. noctua gracilis.

*Hab. in lysimachia vulgari. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Noctua fere indistincta. *Ala* obscuræ, basi striga nigricante; in medio maculæ ordinariæ fere obsoletæ; pone has striga e punctis nigris, aliaque flavescens. *Posticæ* *subtus* albidæ, striga punctorum nigrorum.

*Larva* nuda virens, lateribus flavescen-  
tibus, incisuris flavis, singulis seg-  
menti punctis quatuor obscuris macu-  
laque antica nigra.

Promissa. N. ( la promise ) cristata, alis dentatis



fulco cinereoque variis, strigis dentatis atris, posticis rubris; fasciis duabus nigris.

*Wien. Verz.* 90. 6. noctua promissa.

*Hab.* in Austriae quercu. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis præcedentibus affinis, at *N. padæ* duplo minor. *Alæ* cinereo fuscoque variae, strigis dentatis atris. *Thorax* griseus, fascia atomisque nigris.

*Orbona. N.* ( orbone ) cristata, alis incumben-  
tibus hepaticis, posticis flavis, lunula  
strigaeque postica fuscis.

*Hab.* in Germania. *D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino *N. pronubæ*. *Caput*  
& *thorax* hepatica. *Alæ anticae* hepa-  
ticae, strigis aliquot punctorum nigro-  
rum obsoletorum, *subtus* macula magna  
nigra. *Posticae* flavæ, lunula media strigaeque postica fuscis, *subtus* lunula  
margineque interiori hepaticis.

*Solani. N.* ( du solanum ) cristata, alis incum-  
bentibus virescenti griseoque variis,  
posticis rufis, fascia lata submarginali.

*Naturf.* 9. tab. 1. fig. 3.

*Hab.* in Europæ solano tuberoso, fabis,  
in alis larvis sæviens.

*Desc.* Nimis *N. pronubæ* affinis, differt  
tamen alis anticis magis virescentibus.  
Versus apicem puncta aliquot alba ad  
marginem crassiore & juxta hæc ma-  
cula parva atra. *Posticae* rufæ, fascia  
lata atra. *Subtus omnes* multo dilutiores.

*Larva* obesa, rugosa, cinerea.

*Puppa* nuda, brunnea.

*Linogrisea. N.* ( la gris-de-lin ) cristata, alis in-  
cumbentibus dentatis variegatis apice

ferrugineis , posticis flavis , margine fusco.

*Wien. Verz.* 79. 22. noctua linogrisea.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis *N. pronuba* , at distincta alis dentatis anticis valde variegatis apice ferrugineis.

*Larva* dorso rubicundo , lineolis obliquis punctisque nigris.

*Hymenaea. N.* ( l'hymenée ) cristata , alis deflexis griseis , strigis angulatis nigris , posticis flavis , fasciis duabus arcuatis atris.

*Wien. Verz.* 91. 8. noctua hymenea.

*Hab. in pruno spinosa. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis *N. paranymphe* , at alæ anticæ magis griseæ absque strigis albis.

*Larva* flavo-virescens , lineis duabus tuberculorum elevatorum denteque medio elevato porrecto.

*Janthina. N.* ( la violette ) cristata , alis incumben-  
tibus griseis , litura albida , posticis atris , macula media margineque ferrugineis.

*Wien. Verz.* 78. 19. noctua janthina.

*Knoch. inf. tab.* 4. fig. 5. phalæna domiduca.

*Fyest. arch.* 3. tab. 16. phalæna domiduca.

*Hab. in Germaniæ aro. D. Romanus.*

*Desc.* In medio alæ anticæ lunulæ aliquot albæ.

*Larva* albida fusco undata posticeque punctis nigris.

*Ambusta. N.* ( la foudroyée ) cristata , alis incumbentibus griseo-fuscis , strigis tribus annuloque medio flavescens , striga postica undata.

*Wien. Verz.* 88. 16. noctua ambusta.

*Hab.* in lichene parietino. *D. Schyeffermyller.*

*Desc.* Parva. *Antennæ* ferrugineæ basi albidæ. *Caput & thorax* rufo-grisea. *Alæ* griseo-fuscæ, strigis tribus annulique medio oblongo flavescens. *Posticæ* albidæ, apice fuscæ.

*Larva* nuda, fusca alba lineata. Quies 3 mensium.

Subtusa. N. ( la meurtrie ) cristata, alis incumbens fusco-cinereis, strigis quatuor annulisque tribus flavescens.

*Wien. Verz.* 88. 17. noctua subtusa.

*Hab.* in populo tremula. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcedentis. *Antennæ* pallidæ. *Corpus* cinereum immaculatum. *Alæ anticæ* obscure cinereæ, striga parva baseos, altera ante medium, tunc annuli tres, anteriori striga secunda connexa, posteriori majori veniformi; demum striga incurva & ultimo striga undata flavescens. *Posticæ* fuscæ.

*Larva* nuda, albida, albo lineata, capite nigro, fronte alba.

Lunaris. N. ( la lunaire ) cristata, alis incumbens dentatis fuscescentibus in medio griseis, puncto atro lunulaque fusca.

*Wien. Verz.* 94. 1. noctua lunaris.

*Hab.* in Quercu Austriæ. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Antennæ* fuscæ, basi albæ. *Caput & thorax* fusco-grisea. *Alæ anticæ* basi griseæ, tunc fuscæ, striga cinerea; in medio griseæ, puncto parvo atro lunulaque vel macula veniformi fusca, tunc striga cinerea; demum fuscescentes, fascia obsoleta dentata cinerea punctisque

punctisque ante marginem nigris. *Postica* basi cinereæ, apice fuscæ. *Corpus* magnum, abdomine cinereo.

*Larva* ferrugineo-fusca, pallido punctata, antice punctis duobus fulvis tuberculisque duobus caudalibus.

**Craccæ.** N. (de la vesse) cristata, alis striatis cinereis, puncto albido, lunula punctata thoraceque antice atris.

*Wien. Verz.* 94. 3. noctua craccæ.

*Hab. in vicia cracca. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura N. *lusoria*, at paullo minor. *Thorax* cinereus antice ater. *Alæ antica* venis striatæ, cinereæ, puncto parvo albo ante medium. In medio lunula e punctis aliquot atris. Postice fascia obsoleta obscurior. Costa punctis quatuor fuscis.

*Larva* fusco griseoque varia, cauda bifida.

**Signum.** N. (la marquée) cristata, alis maculis tribus fuscis, costa baseos cinerascens, thorace fusco antice brunneo.

*Wien. Verz.* 73. 8. noctua signum.

*Hab. in Austriæ atriplice hortensi. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura N. C. *nigrum*. *Alæ antica* fuscæ, costa usque ad medium cinerea fusco undata, apice albo punctata. In medio loco macularum lunulæ duæ cohærentes, atræ. Margō posticus striga punctorum alborum. *Posticæ* obscuræ.

**Nun-atrum.** N. (la centrale) cristata, alis incumbentibus fuscis cinereo strigosis, lineolis duabus centralibus atris, anteriore arcuata.

*Wien. Verz.* 78. 9. noctua nun-atrum.

*Insect. Tomus IV.*

G g



*Hab. in gallio aparine. D. Schieffermyller.*

*Desc. Nimis affinis N. Gothica. Antennæ ferrugineæ pectinatae. Alæ anticae fuscae, strigis aliquot albidis. In medio lineolæ duæ, quarum anterior major arcuata. Costa ultra medium punctis atris postice cinereis. Posticae fuscae, subtus puncto centrali albo.*

*Larva glabra, viridis, albo punctata, linea laterali nivea.*

**Cincta. N. ( l'entourée )** cristata, alis incumbentibus fuscis, macula media grisea, linea flexuosa atra cincta pupillaque atra.

*Wien. Verz. 78. 10. noctua i cinctum.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Antennæ pectinatae, fuscae. Caput & thorax cinerea. Alæ anticae ultra medium fuscae. In medio macula magna grisea, & in hac punctum transversum atrum. Maculam ipsam cingit linea flexuosa atra ante basin interrupta. Alæ apice griseae, margine punctato. Posticae fuscae.*

**Rectangulata. N. ( la rectangulaire )** cristata, alis subincumbentibus fuscis maculisque quatuor mediis atris, duabus costalibus, thorace antice atro.

*Wien. Verz. 78. 15. noctua rectangula.*

*Hab. in trifolio melilotus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Statura præcedentium. Caput & thorax ferrugineo-fusca, hic antice ater. Alæ anticae fuscae, punctis aliquot baseos maculisque quatuor mediis, quarum duæ costales, nigris. Costa albo punctata.*



**Flammatra. N.** ( la brûlée ) cristata , alis incumben-  
bus griseis , linea flexuosa baseos nigra ;  
thorace fascia atra.

*Wien. Verz.* 80. 1. noctua flammatra.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis N. *exclamationis*. *Corpus*  
cinereum , fascia lata abbreviata tho-  
racis atra. *Alæ anticæ* griseæ , linea  
magna baseos flexuosa atra. In medio  
maculæ ordinariæ macula fusca distinctæ.

**Cespitis. N.** ( du gazon ) cristata , alis incumben-  
tibus fuscis , strigis tribus undatis albidis  
nigræ innatis , posticis albis.

*Wien. Verz.* 82. 2. noctua cespitis.

*Hab. in aëre cespitosa. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Caput & thorax* fusca ,  
immaculata. *Alæ anticæ* fuscae , niti-  
dulæ , strigis tribus undatis pallidis ,  
unica ante medium , duabus pone me-  
dium , quæ interne terminantur striga  
atra. In medio maculæ ordinariæ annulo  
albo. *Posticæ* albæ , margine interdum  
fuscescente.

*Larva nuda* fuscescens , lineis tribus pal-  
lidioribus.

**Chenopodiata N.** ( de la patte d'oie ) cristata , alis planis  
cinereis nigro maculatis , striga postica  
bidentata alba , thoracis crista brevī  
bifida.

*Wien. Verz.* 82. 6. noctua chenopodii.

*Hab. in Austria chenopodio. D. Schieffer-  
myller.*

*Desc.* Media. *Antennæ* fuscae. *Caput &*  
*thorax* cinerea immaculata. *Alæ anticæ*  
cinereæ , atomis imprimis costæ mar-  
ginisque postici nigris. In medio maculæ  
ordinariæ. Ante marginem posticum  
striga cinerea bidentata.

*Larva* viridis, linea dorsali obscuriore, laterali rubra.

Contigua. N. ( du bon-Henri ) cristata, alis planis fusco cinereoque nebulosis, striga postica bidentata alba, thoracis crista bifida.

*Wien. Verz.* 82. 7. noctua contigua.

*Hab.* in chenopodio bono-Henrico Austriae. *Mus. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis præcedenti affinis, at magis obscura.

*Larva* viridis, capite maculisque duabus primi segmenti brunneis, stigmatibus nigris.

Dentina. N. ( l'ondée ) cristata, alis planis cinereo fuscoque variis, macula marginis interioris strigaeque postica flavis.

*Wien. Verz.* 82. 8. noctua dentina.

*Hab.* in Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Alæ anticae* cinereae, in medio imprimis fuscescentes, maculis ordinariis maculaque cinerea bifida. Distincta macula marginis interioris ad basin strigaeque postica undata flavis.

Distincta. N. ( la distinguée ) cristata, alis incumbentibus luteo cinereis, maculis duabus centralibus atris, apice obscuris.

*Hab.* Hafniæ. *D. Schestedt.*

*Desc.* Statura omnino N. *exclamationis*.

*Caput & thorax* hirta. *Palpi* subtus fuscii. *Alæ anticae* ultra medium luteo-cinereae, strigis aliquot obsoletis fuscis. In medio macula potius unica oblonga atra, stigmate rotundato in duas divisa. Margo posticus obscurus, striga grisea terminalique e punctis atris. *Posticae*

subtus cinereæ, puncto medio strigaque postica fuscis.

**Suffusa. N.** ( l'inégale ) cristata, alis incumben-  
tibus fuscis apice pallidioribus, lineola  
media duabusque apicis puncto albo  
notatis atris.

*Wien. Verz.* 80. 4. noctua suffusa.

*Hab.* in soncho arvensi. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Corpus fuscum, fascia antica atra.

*Alæ anticæ* fuscæ, interdum griseo  
variegatæ, apice pallidiores. Pone  
medium lineola crassa atra & versus  
apicem duæ minores, cuspidatæ, puncto  
albo notatæ. *Posticæ* albidæ.

**Signifera. N.** ( la porte - enseigne ) cristata, alis  
subincumbentibus cinereis fusco unda-  
tis, linea baseos atra, pupilla apicis  
oblonga albida.

*Wien. Verz.* 80. 8. noctua signifera.

*Hab.* in cochlearia draba. *D. Schieffer-  
myller.*

*Desc.* Caput & thorax grisea, immacu-  
lata. *Alæ anticæ* cinereæ, fusco paullo  
undatæ. Linea atra a basi usque ad  
medium ducta, quæ apice dilatatur  
pupilla oblonga, albida. Maculæ ordi-  
nariæ in medio, altera oblonga, altera  
veniformis. Margo nigro striatus. *Pos-  
ticæ* albidæ.

*Larva* nuda, cinereo fuscoque varia punctis  
lineisque nigris, collari flavescente,  
lineis tribus albis.

**Valligera. N.** ( la creusée ) cristata, alis incum-  
bentibus cinereo fuscoque variis, ma-  
cula oblonga baseos nigricante, puncto  
ocellari ferrugineo.

*Wien. Verz.* 80. 9. noctua valligera.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Antennæ pectinatæ. Corpus griseum.*

*Alæ* griseæ, maculis ordinariis punctisque variis fuscis. Macula magna, oblonga, nigricans ad basin & in hac punctum ferrugineum annulo albido cinctum. Costa fusca, punctis tribus albis. *Antennæ pectinatæ.*

**Cæcimacula.** N. ( du fium ) cristata, alis incumbentibus dentatis griseis, punctis duobus baseos nigris strigisque duabus cinereis.

*Wien. Verz. 81. 14. noctua cæcimacula.*

*Hab. in Austriæ sio falcaria. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Corpus griseum, antennis fuscis. Alæ anticæ* basi griseæ, punctis duobus nigris, altero ad basin, altero ante medium in striga ipsa undata cinerea. Medium parum obscurius maculis ordinariis. Pone has striga altera cinerea. Margo griseus, striga punctorum nigrorum.

*Larva* carnea, atomis nigris, lateribus capiteque flavescens.

**Croceago.** N. ( la safranée ) cristata, alis deflexis ferrugineis, strigis fuscis, costa albo punctata.

*Wien. Verz. 86. 2. noctua croceago.*

*Hab. in quercu Austriæ. D. Schieffermyller.*

*Desc. Caput & thorax* ferruginea, immaculata. Thoracis crista valde elevata, compressa. *Alæ anticæ* ferrugineæ, strigis tribus obscuris. Costa punctis duobus baseos quatuorque in medio niveis. *Posticæ* albidæ, puncto strigaeque undata sanguineis.

*Larva* flavescens, linea dorsali fusca lineolisque obliquis lateralibus aurantiis.

**Aurago. N.** ( la dorée ) cristata , alis deflexis fuscescentibus , litura baseos fasciaque media late flavis.

*Wien. Verz.* 86. 7. noctua aurago.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ anticæ* basi apiceque fuscæ , litura flavescente. In medio fascia lata dentata flava. *Posticæ* cineræ.

*Larva* nuda grisea , lineolis obliquis fuscis. Quies quatuor hebdomadarum.

**Sulphurago. N.** ( la sulphurée ) cristata , alis deflexis flavis , punctis numerosis strigisque fuscis.

*Wien. Verz.* 86. 8. noctua sulphurago.

*Hab. in Austriæ betula. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ anticæ* pallide flavæ , punctis baseos fuscis. In medio strigæ duæ , anteriore majore , posteriore valde undata. Pone strigam anteriorem annuli duo fusci. Margo fusco punctatus.

*Larva* nuda , albida , capite flavo. Quies 17 dierum.

**Cerago. N.** ( la cirée ) cristata , alis deflexis flavis fusco subfasciatis posticis albis.

*Wien. Verz.* 86. 9. noctua cerago.

*Hab. in Germaniæ Salice. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Præcedentibus affinis , at maculæ latiores fere fascias constituunt. *Thorax* flavus , crista in altero sexu elevata , acuminata.

**Rutilago. N.** ( l'éclatante ) cristata , alis deflexis flavis ferrugineo strigosis , fascia baseos apicisque fusca.



Wien. Verh. 86. 4. noctua rutilago.

Hab. in Europæ populo.

Desc. Media. Corpus fuscum, abdomine albido. *Alæ anticæ* flavæ, strigis numerosis atomisque ferrugineis, maculisque ordinariis distinctis. Fascia baseos lata ad marginem interiorem totam basin occupat.

Luteago. N. ( le fouci ) cristata, alis deflexis flavis, strigis duabus dentatis fuscis.

Hab. in Russia Meridionali. D. Boeber.

Desc. Statura præcedentium. *Antennæ* ferruginæ, rachi alba. *Alæ anticæ* flavescens, strigis duabus in medio ad marginem interiorem fere coeuntibus, valde dentatis, fuscis. *Posticæ* albidæ.

Ferrugo. N. ( la rouillée ) cristata, alis deflexis ferrugineis, macula media fusca, lunula alba.

Hab. Kiliæ. D. Daldorff.

Desc. Statura omnino præcedentium. *Alæ anticæ* ferruginæ, in medio macula fusca & in hac lunula alba. Pone fasciam striga e punctis vix conspicuis nigris. *Posticæ* fuscae. Subtus omnes argenteæ nitidæ.

Flavago. N. ( la blonde ) cristata, alis deflexis flavissimis, punctis fasciaque lata fuscis.

Hab. Kiliæ. D. Daldorff.

Desc. Statura & summa affinitas N. *cereago*. Caput fuscum. Thorax antice fuscus, postice cristatus, flavus. *Alæ anticæ* flavissimæ, punctis aliquot fuscis. Macula magna baseos ad marginem exteriorum fusca. Pone medium fascia lata, sinuata, fusca, in qua puncta tria costalia,

flava. Pone hanc striga e punctis parvis fuscis. *Alæ posticæ cinerææ.*

**Gilvago. N.** ( la clairette ) cristata , alis deflexis luteis , puncto medio fusco strigaeque postica punctorum nigrorum.

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ anticæ* flavæ , vix strigosæ , puncto magno medio fusco & pone hoc striga e punctis sex nigris. *Alæ posticæ* albæ.

**Concha. N.** ( la dorée ) cristata , alis deflexis purpurascens , maculis duabus punctisque apicis aureis.

*Knoch Beytr. 1. tab. 1. fig. 2. plañena*  
*C. aureum.*

*Hab. in Austriæ plantis.*

*Desc.* *Caput & thorax* antice ferruginea. *Antennæ* pallidæ. *Alæ anticæ* purpurascens , lineola baseos , maculis magnis duabus in medio punctisque quatuor versus apicem aureis. *Posticæ* pallidæ.

**Lumina. N.** ( la solaire ) cristata , alis deflexis cinereis , macula marginali atra utrinque auro marginata maculaque aurea.

*Wien. Verz. 314. 8. noctua lumina.*

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis N. *bractea* , at minor. *Caput & thorax* grisea. *Abdomen* basi fasci-  
culis pilorum. *Alæ anticæ* cinerææ , macula in medio marginis tenuioris magna atra , utrinque striga aurea terminata. Externe in apice macula magna aurea & in hac macula nigra.

**Bractea. N.** ( la feuille-d'or ) cristata , alis deflexis variegatis , macula magna media aurea nitida.

*Wien. Verz.* 314. 7. noctua bractea.

*Hab.* in Europa australi. *D. Zschuck.*

*Desc.* Statura omnino *N. festuca*. *Caput* & *thorax* obscure ferruginea. *Ala antica* cinereo, fusco ferrugineoque variæ. In medio macula magna, angulata, nitida aurea. *Postica* cinereæ.

*Moneta. N.* ( la riche ) cristata, alis deflexis aureis, strigis undatis annuloque geminato argenteo.

*Hab.* in Austriæ montosis. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magnitudo *N. festuca*. *Thorax* cristatus griseus, punctis nigris. *Ala antica* aureæ, strigis atomisque fuscis, apice obscuriores. In medio annulus duplicatus argenteus quadro fusco notatus. *Postica* cinereæ.

*Aemula. N.* ( la rivale ) cristata, alis deflexis dentatis, nigro cinereoque variegatis, lineola media duplicata argentea.

*Hab.* in Austria. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & summa affinitas *N. gamma*, at *ala omnes* nigro cinereoque variegatæ. Signum medio *alæ* inscriptum parvum, minus distinctum. *Postica* basi cinereæ, apice fuscæ.

*Divergens. N.* ( la divergente ) cristata, alis deflexis integris, anticis griseis medio fuscis, signo albo inscriptis, posticis fulvis margine fusco.

*Hab.* in Austriæ montosis. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis præcedentibus, at minor. *Ala antica* cinerascens, macula magna fusca ad medium marginis inte-

rioris & in hac signum album. *Posticæ* fulvæ, margine fusco.

Argentina. N. ( l'argentine ) cristata , alis deflexis griseis , vitta lata abbreviata argentea.

*Hab. in* Russia australiori. *D. Boeber.*

*Desc.* Parva. *Corpus* pilosum album. *Alæ anticæ* griseæ , vitta lata fere marginali argentea a basi ultra medium ducta , nitida. *Posticæ* nivæ.

Consona. N. ( la doublée ) cristata , alis deflexis integris virescentibus nitidulis , strigis duplicatis albis , anteriore inflexa , maculisque duabus apicis fulvis.

*Hab. in* Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis sequenti affinis , at minor & maculæ tantum duæ distinctæ apicis fulvæ.

Illustis. N. ( l'illustre ) cristata , alis deflexis integris viridi cinereoque nitidulis , maculis tribus ferrugineis distinctis.

*Hab. in* Germania Australiori. *D. Zschuck.*

*Desc.* Similis N. *meticulosæ* , at paullo minor. *Corpus* obscure cinereum. *Thorax* valde cristatus , antice , parum ferrugineus. *Alæ anticæ* cinereo , viridi carneoque variegatæ , nitidæ & ad marginem posticum maculæ tres distinctæ ferrugineæ , strigis duabus pallidis inclusis. *Posticæ* cineræ.

Flamma. N. ( l'ardente ) cristata , alis deflexis ferrugineo flavoque variis , maculis ordinariis confluentibus.

*Hab. in* Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Minor B. oo. *Alæ anticæ* ferrugineo flavoque variegatæ , apice albido

striatæ. In medio maculæ ordinariæ interne lineola albida cinctæ. *Posticæ* fuscæ, subtus rufescentes, puncto strigaeque fuscis.

**Serici. N.** ( la soyeuse ) cristata, alis deflexis albis, strigis tribus nigris, posticis luteis, punctis strigaeque nigris. *Thunb. aed. Holm.* 1781. 243. tab. 5. fig. 12. noctua serici.

*Hab.* in Laponia culta sericum præbens. *Desc.* Magnitudo *N. mori*. *Corpus* album, collari sanguineo. *Alæ anticæ* albæ, strigis tribus arcuatis nigris.

**Or. N.** ( la striée ) cristata, alis deflexis cinereis fusco undatis, macula media grisea.

*Wien. Verz.* 87. 5. noctua or.

*Hab.* in Austriæ populo. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Alæ anticæ* cinereæ, strigis numerosis undatis, imprimis baseos, fuscis. In medio macula magna transversa grisea. *Posticæ* obscuræ.

*Larva* virescens, capite brunneo, margine antico atro.

**Diluta. N.** ( la délayée ) cristata, alis deflexis cinereis, fasciis duabus ferrugineis obsoletis punctoque medio albo.

*Wien. Verz.* 87. 6. noctua diluta.

*Hab.* in Austria. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Alæ* cinereæ, basi fascia ferruginea, postice striga fusca terminata, pone medium fascia altera minus distincta striga fusca terminata. *Subtus* cinereæ, striga fusca. *Thorax* cinereus.

*Larva* pallida, linea dorsali fusca, capite atro.



**Ruficollis.** N. (le collier-roux) cristata, alis deflexis obscure cinereis, fasciis duabus obscurioribus, thorace antice brunneo.

*Wien. Verz.* 87. 7. noctua ruficollis.

*Hab. in quercu robore. D. Schieffermyller.*

*Desc. Antennæ thoraxque antice ferruginea. Abdomen cinereum. Alæ posticæ cinereæ.*

*Larva nuda, dorso plumbeo, lateribus albis nigro punctatis.*

**Abrotani.** D. (de l'auronne) cristata, alis deflexis fusco-cinereis, strigis undatis nigris, costa punctis quatuor albis.

*Wien. Verz.* 73. 3. noctua abrotani.

*Raf. inf.* 3. tab. 51. larva.

*Hab. in Artemisia abrotano. D. Schieffermyller.*

*Desc. Statura N. absinthii. Antennæ ferrugineæ. Thorax cinereus, margine antico albido, striga tenuissima nigra. Alæ anticæ cinereo fuscoque variæ, strigis undatis nigris. Maculæ ordinariæ in medio. Puncta quatuor alba in margine crassiori. Posticæ cinereæ nitidulæ. Larva viridis ferrugineo maculata, tuberculis dorsalibus conicis.*

**Purpurina.** N. (la purpurine) cristata, alis deflexis purpurascentibus basi flavis.

*Wien. Verz.* 88. 9. noctua purpurina.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Affinis N. delphinii, at distincta. Alæ anticæ basi flavescentes, apice purpureæ, striga una alterave. Posticæ fuscæ.*

**Geographica.** N. (la géographique) cristata, alis deflexis fusco variis, strigis duabus postice coeuntibus niveis, apice striatis.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc. Parva. Thorax cinereus, punctis duobus albis. Alæ anticæ fuscescentes, basi macula albida. In medio strigæ duæ dentatæ ad marginem tenuiorem coeunt, nivæ. Margo posticus albo striatus.*

**Hyperici. N.** ( du millepertuis ) cristata, alis deflexis nigro substriatis fusco cinereoque variis, macula baseos oblonga albida.

*Wien. Verz. 76. 10. noctua hyperici.*

*Hab. in Austria hyperico. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Antennæ nigræ. Thorax pallidus, strigis duabus abbreviatis nigris. Abdomen fuscum. Alæ anticæ variegatæ, macula magna oblonga alba interne linea nigra terminata. In medio maculæ ordinariæ, postica majori veniformi. Margo albo nigroque striatus. Posticæ fuscæ nitidulæ. Pedes albo annulati.*

*Larva violacea, dorso lineis tribus albis interruptis.*

**Linariæ. N.** ( de la linair ) cristata, alis deflexis fusco cinereis, apice albo nigroque striatis, maculis ordinariis niveis.

*Wien. Verz. 73. 6. noctua linariæ.*

*Hab. in antirrhino linaria. D. Schieffermyller.*

*Desc. Parva. Caput antice albidum. Thorax griseus, margine antico albo striga parva nigra. Alæ fusco cinereoque variæ, apice albo nigroque striatæ, striis albis terminantibus. In medio maculæ ordinariæ nivæ, annulo parvo atro cinctæ. Posticæ pallidæ, margine fusco.*

*Larva* linea dorsali flava lateralibusque striis albis nigrisque , capite cinereo nigro punctato.

An *N. linariae*. *D. de Geer* species distincta?

**Brunnea.** *N.* ( la brune ) cristata , alis deflexis fuscis , macula media transversa flava , margine brunneo.

*Wien. Verz.* 83. 15. noctua brunnea.

*Hab. in Piso arvensi. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Corpus* subtus brunneum. *Thorax* fuscus. *Abdomen* supra cinereum. *Alae anticae* fuscae , maculis aliquot , imprimis marginis exterioris , fuscis. In medio , loco maculae ordinariae posticae , macula transversa flava. Margo alae ipse brunneus. *Posticae* fuscae , margine brunneo.

*Larva* nuda brunnea albo maculata lineaque laterali caerulefcente , capite nigro , lineis duabus albis.

**Culta.** *N.* ( la parée ) cristata , alis deflexis undatis fuscescentibus , punctis duobus albis , anteriore duplicata , thoracis marginibus albis.

*Hab. in pyro sylvestri. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Palpi* subtus albi. *Antennae* ferrugineae. *Caput* niveum , striga punctisque atris. *Thorax* fuscus , margine antico lateribusque albis parum nigro maculatis. *Abdomen* cinereum. *Alae anticae* fuscae , albo nigroque parum albidae nigro punctatae. In medio maculae duae magnae ordinariae , anteriore duplicata. Margo posticus albo fuscoque varius. *Posticae* albae , litura ani nigricante. *Tibiae anticae* albae , nigro punctatae , tarsi nigri albo annulatis.

*Larva* obscure variegata, lineis utrinque duabus undatis nigris, ano quadridentato.

Compta. N. (l'ajustée) cristata, alis deflexis fuscis nigro undatis, fascia media lata alba.

Wien. Verz. 70. 5. noctua compta.

Hab. in Austria. D. Schieffermyller.

Desc. Præcedentibus minor. Caput & thorax fusco alboque varia. Abdomen cinereum. Alæ anticæ fuscae, nigro undatae, basi parum albicant, fascia lata in medio & striga postica fere obsoleta albis. Posticæ fuscae, basi pallidiores. Tarsi nigri, albo annulati.

Prasina. N. (la verte) cristata, alis deflexis fusco viridique variis, lituris duabus albis, thoracis crista duplici.

Wien. Verz. 82. 11. noctua prasina.

Hab. in cochlearia armoracia. D. Schieffermyller.

Desc. Magna. Alæ fuscae, nigro parum undatae viridique variae. Liturae duae magnae, altera ad basin, altera pone medium. Posticæ fuscae, ciliis albis, subtus puncto strigaque undata nigris. Larva subviolacea, dorso nigro maculato, stigmatibus albis, capite fusco.

Lucipeta. N. (la dame) cristata, alis deflexis obscure cinereis, strigis undatis maculisque ordinariis flavescentibus.

Wien. Verz. 71. 2. noctua lucipeta.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Magna. Caput & thorax hirta, obscure cinerea, immaculata. Alæ obscure cinereae, strigis punctisque undatis flavescentibus. In medio maculae ordinariae,



ordinariæ , altera orbiculata , altera veniformi.

**Pyrophila.** N. ( la pyrophile ) cristata , alis cinereis lunulis maculisque fuscis , posticis fuscis nitidulis.

*Wien. Verz.* 71. 4. noctua pyrophila.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Præcedente minor. *Corpus* cinereum ; *thorax* striga interrupta fusca. *Alæ* cineræ , strigis tribus lunularum fuscarum. Maculæ ordinariæ fere obsoletæ. Margo posticus nigro punctatus. *Alæ posticæ* fuscae nitidæ , supra immaculatæ ; *subtus* pallidiores , lunula strigaeque fuscis.

**Xantographa.** N. ( la xantographe ) cristata , alis deflexis testaceis , maculis ordinariis flavis.

*Wien. Verz.* 83. 26. noctua xantographa.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino N. oleraceæ , at paullo minor. *Caput*, *thorax*, *alæ anticæ* obscure testaceæ , maculis ordinariis flavescens , postice striga punctorum nigrorum. *Posticæ* , uti & *abdomen* , cineræ.

**Convergens.** N. ( la convergente ) cristata , alis deflexis subdentatis griseo-fuscis apice cinereis , angulo ani macula fulva.

*Wien. Verz.* 84. 8. noctua convergens.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Alæ anticæ* ultra medium fusco griseoque variæ , basi lineola atra. In medio maculæ ordinariæ , posteriori veniformi lunula obsoleta alba , apice cineræ , macula anuli ferruginea punctisque marginalibus nigris.



*Larva* cærulefcens , lineis punctisque  
albis , capite brunneo.

**Alchymista. N.** ( l'alchimifte ) cristata , alis deflexis  
dentatis nigris atro undatis apice ciner-  
ascentibus , posticis basi maculisque  
duabus marginalibus albis.

*Wien. Verz.* 89. 9. noctua alchymista.

*Hab. in Austria. D. Saldoner.*

*Desc.* Affinis N. *leucomelas* , at paullo  
major. *Corpus* atrum , dorso cristato.  
*Alæ* nigræ , strigis quatuor undatis  
atris apice striga cinerascens , quæ  
versus angulum ani maculam format.  
*Posticæ* nigræ , macula magna baseos  
duabusque minoribus marginalibus albis.  
Subtus omnes nigræ , posticis basi albis  
puncto nigro.

**Serena. N.** ( la claire ) cristata , alis deflexis  
albidis , fascia utrinque flavo maculata.

*Wien. Verz.* 84. 4. noctua perlata.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Corpus* albidum , atomis  
fuscis. *Alæ anticæ* basi albæ , punctis  
aliquot nigris ; in medio fuscæ , qui  
color utrinque striga undata flavescens  
terminatur maculis ordinariis albidis ;  
apice albæ , striga nigra fuscaque ,  
costa albo nigroque punctata.

**Ligustri. N.** ( du troene ) cristata , alis deflexis  
fusco virescentique variis nigro sub-  
undatis , macula magna postica albida.

*Wien. Verz.* 70. 1. noctua ligustri.

*Hab. in Austriae ligustro. D. Schieffer-  
myller.*

*Desc.* Paullo minor N. *aprilina*. *Thorax*  
albo nigroque varius. *Alæ anticæ*  
obscuræ , variegatæ. In medio macula

ordinaria annulo albo cincta. Versus apicem macula magna alba. Margo ipse albo variegatus, nigro punctatus.  
*Larva* pilosa, viridis, flavo lineata.

**Stichica.** N. ( la pupillée ) cristata, alis deflexis albo fuscoque variis, apice nigro striatis, stigmatibus subocellatis, posteriori veniformi.

*Hab.* Hamburgi. *Dr. Schulz.*

*Desc.* Media. *Antennæ* fuscae. *Thorax* cristatus, strigis fere indistinctis albis fuscisque alternis. *Alæ anticae* albo fuscoque variae, versus apicem striis septem abbreviatis atris & in medio stigmata ordinaria annulo atro cincta, anteriori orbiculato, posteriori veniformi. *Alæ posticae* nigricantes, margine albo.

**Perla.** N. ( la perlée ) cristata, alis deflexis cinereis nigro undatis, maculis duabus fuscis.

*Wien. Verz.* 70. 3. noctua perla.

*Hab.* in Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis videtur N. *algæ*. *Alæ anticae* supra obscure cinereae, strigis undatis nigris. In medio maculae duae magnae fuscae. *Posticae* albidæ, puncto centrali fusco.

**Tridens.** N. ( de l'abricotier ) cristata, alis deflexis cinereis, maculis atris trifidis, posticis albidis.

*Wien. Verz.* 67. 1. noctua tridens.

*Hab.* in Austriae pruno Armeniaco. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis N. *pfi*, at larva diversissima.

*Larva* nigra, lateribus rubro punctatis  
 Hh ij

lineaque dorsali sulphurea, tuberculo conico porrecto.

**Auricoma. N.** ( de la ronce bleuâtre ) cristata, alis deflexis, anticis cinereo fuscis, strigis characteribusque nigris, pedibus apice albo annulatis.

*Wien. Verz.* 67. 6. noctua auricoma.

*Hab. in Austriæ rubo cæsio. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis *N. psi*, at omnia obscuriora. *Alæ posticæ* albidiores.

*Pedes* albidii, apice fusci, albo annulati.

*Larva* pilosa atra, verrucis fulvis, pilis capitis caudæque albis, dorsi aureis.

**Euphorbiæ. N.** ( de l'euphorbe ) cristata, alis deflexis cinereis fusco undatis, maculis ordinariis, anteriore orbiculata, posteriori veniformi albidis.

*Wien. Verz.* 67. 4. noctua euphorbiæ.

*Hab. in Austriæ euphorbia. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Rustica media. *Caput & thorax* hirta cinerea. *Alæ* cinereæ, striga baseos brevissima, altera ante medium undata, tertia pone medium incurva. In medio pallidiores, maculis ordinariis distinctis annulo fusco cinctis. Margo fusco punctatus.

*Larva* pilosa virescens, maculis dorsilibus atris, collari lunula ferruginea.

**Megacepha- N.** ( la mégacéphale ) cristata, alis deflexis cinereis nigro undatis, macula unica orbiculata albida.

*Wien. Verz.* 67. 5. noctua megacephala.

*Hab. in salice. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Rustica media affinis *N. euphorbiæ*.

*Antennæ* nigrae. *Caput & thorax* hirta,

cinerea. *Abdomen* albidum. *Alæ anticae* obscure cinereae, strigis variis undatis nigris. In medio macula ordinaria unica. Margo fusco punctatus. *Posticae* albæ, subtus puncto centrali fusco.

*Larva* pilosa fusca ferrugineo maculata; capite corpore latiore segmentoque postico macula sulphurea.

**Pistacina. N.** ( de la centauree scabieuse ) cristata; alis deflexis cinereis apice obscurioribus undatis, posticis fuscis.

*Wien. Verz.* 77. 1. noctua pistacina.

*Hab. in* centaurea scabiosa. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Rustica media. *Corpus* griseum. *Alæ* cinereae strigatae, basi parum pallidiores, punctis nigris; apice obscuriores, striga undata pallida posteriorique e punctis nigris.

*Larva* nuda scabra viridis, punctis lineaque laterali albis.

**Baja. N.** ( de la belladone. ) cristata, alis deflexis ferrugineis, puncto parvo baseos geminatoque apicis nigris.

*Wien. Verz.* 77. 3. noctua baja.

*Hab. in* atropa belladonna. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Rustica media. *Palpi* ferruginei apice pallidi. *Thorax* ferrugineus. *Abdomen* cinereum. *Alæ anticae* ferrugineae, puncto baseos distincto atro; in medio paullo obscuriores, maculis ordinariis & apice versus marginem exteriorem puncta duo approximata atra. *Posticae* fuscae, ciliis ferrugineis.

*Larva* cinereo fuscoque varia, lineis tribus dorsalibus albis, laterali flavicante.



Rubricosa. N. ( de la patience sauvage ) cristata ;  
 alis deflexis fuscescentibus , costa alba  
 fusco maculata , apice fusca , punctis  
 albis.

Wien. Verz. 77. 4. noctua rubricosa.

Hab. in rumice acuta. D. Schieffermyller.

Desc. Media. Caput & thorax hirta , fla-  
 vescentia. Alæ anticæ fuscescentes ,  
 cinereo undatæ , margine tenuiori ba-  
 seos rufescente. Costa ultra medium  
 albida , maculis tribus nigris , apice  
 fusca , punctis parvis duobus albis.  
 Subtus obscuræ.

Larva grisea , linea dorsali pallida seg-  
 mentoque singulo punctis duobus albis.

Erythroce- N. ( l'érythrocéphale ) cristata , alis de-  
 phala. flexis ferrugineis cinereo fuscoque un-  
 datis , macula posteriori nigro punc-  
 tata , capite rufo.

Wien. Verz. 77. 5. noctua erythrocephala.

Hab. in plantagine. D. Schieffermyller.

Desc. Caput rufescens. Thorax subcrist-  
 tatus , fuscus. Alæ rufescentes , cinereo  
 fuscoque undatæ. Costa baseos cinerea.  
 In medio maculæ ordinariæ , quarum  
 posterior punctis aliquot marginalibus  
 atris. Posticæ fuscæ , margine ciliato.  
 Subtus anticæ limbo cinereo ; posticæ  
 cinereæ puncto strigaque undata fusca.

Polygona. N. ( du plantain ) cristata , alis deflexis  
 subundatis , extus fusco nigroque va-  
 riis , intus pallidis , thorace variegato.

Wien. Verz. 98. 16 noctua polygona.

Hab. in plantagine. D. Schieffermyller.

Desc. Magna. Thorax fusco ferrugineo-  
 que varius , postice linea utrinque obli-  
 qua , atra. Alæ anticæ subundatæ ,  
 ferrugineo fuscoque variæ , maculis



ordinariis; intus cinereæ, fusco undatæ.  
 Costa punctata. *Posticæ* albidæ.  
*Larva* nuda viridis, linea laterali albida  
 stigmatibusque fulvis.

**Simulans. N.** ( l'ardoisée ) cristata, alis deflexis  
 obscure cinereis nitidulis, strigis undatis  
 fuscis, posteriore punctata.

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc. Media. Caput & thorax* obscura;  
 abdomine pallidiore. *Alæ anticæ* cinereæ,  
 nitidæ, strigis undatis obscurioribus,  
 marginali punctata. *Posticæ*  
 fuscæ, nitidulæ.

**Acetosellæ. N.** ( de la petite-oseille ) cristata, alis  
 deflexis helvolis, strigis duabus obliquis  
 cinereis, posticis fuscescentibus,  
 margine brunneo.

*Wien. Verz. 84. 1. noctua acetosellæ.*

*Hab. in rumice acetosella. D. Schieffermyller.*

*Desc. Antennæ* rufescentes. *Caput & thorax*  
 helvola. *Alæ anticæ* helvolæ,  
 strigis duabus postice convergentibus  
 cinereis. Inter strigas has maculæ  
 ordinariæ. *Posticæ* fuscæ, margine  
 brunneo.

*Larva* nuda dorso fulvō, striis duabus  
 longitudinalibus fuscis, lateribus rufescentibus,  
 capite rufo, lineis duabus  
 purpureis atro punctatis.

**Conigera. N.** ( l'étoilée ) cristata, alis deflexis  
 flavescens, strigis duabus fuscis  
 punctoque medio albo trigono.

*Wien. Verz. 84. 3. noctua conigera.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Minor N. turca. Antennæ* flavescens,  
*Alæ anticæ* flavescens, striga

baseos recurva ; in medio punctum tri-  
gonum album , postice striga obliqua ,  
*posticæ* obscuræ.

*Larva* grisea albo nigroque lineata , capite  
fusco , segmento primo atro , lineis  
tribus albis.

**Albipuncta.** N. ( du grand plantain ) cristata , alis  
deflexis cinereis , lunula media alba  
strigisque duabus lunularum fuscis.

*Wien. Verz.* 64. 4. noctua albipuncta.

*Hab.* in plantagine majori. *D. Schieffer-*  
*myller.*

*Desc.* Corpus cinereum. *Alæ anticæ* cine-  
reæ , interdum parum rufescentes ,  
strigis duabus e lunulis interruptis fuscis.  
Inter has strigas lunula albida.

*Larva* grisea , albo lineata nigroque  
punctata , primo segmento fusco , lineis  
tribus albis.

**Flavicincta.** N. ( la mandarine ) cristata , alis dentatis  
deflexis fusco cinereoque variis fulvo  
punctatis.

*Wien. Verz.* 72. 2. noctua flavicincta.

*Raf. inf.* 1. pap. 2. tab. 54. 55.

*Hab.* in pruno ceraso. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Minor N. polyodon. Caput cine-  
reum , basi parum fulvum. Thorax  
cinereus , atomis fuscis fulvisque. *Alæ*  
*anticæ* fusco cinereoque variegatæ ,  
punctis sparsis fulvis. Costa albo punc-  
tata. *Posticæ* cinereæ , supra striga , sub-  
tus puncto strigaque fuscis.

*Larva* viridis , linea laterali pallida.

**Perflua.** N. ( la dentelée ) cristata , alis deflexis  
subdentatis cinereis , fascia lata , atra  
puncto ocellari.

*Hab.* in Austria. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Caput* & *thorax* fusca. *Alæ anticæ* subdentatæ cinerascens, fascia in medio lata utrinque dentata atra, & in hac punctum parvum nigrum annulo cinereo cinctum. *Margo posticus* obscurior, lunulis fuscis. *Posticæ* fuscæ.

**Fumosa.** N. ( l'enfumée ) cristata, alis deflexis nigricantibus, striga postica punctorum alborum.

*Wien. Verz.* 81. 18. noctua fumosa.

*Hab. in Austria.* D. Schieffermyller.

*Desc.* Nimis N. *nigricans* affinis. Differt tantum striga postica punctorum cuspidatorum alborum. *Corpus* totum nigricans.

**Aurita.** N. ( l'auriculée ) cristata, alis deflexis fusco nitidulis, fascia media repanda cinerea, capite bi-thorace quadridentato.

*Hab. in Hispania.* D. Vahl.

*Desc.* Statura & magnitudo omnino B. *strigulæ*, at omnino hujus generis. *Caput* cinereo hirtum, denticulis duobus erectis e fasciculis pilorum. *Thorax* item quatuor elevatis validis. *Alæ* fusco-nitidulæ, in medio fascia lata repanda cinerea, apice albo nigroque striatæ.

**Calvaria.** N. ( la garantie ) cristata, alis deflexis fuscis, strigis tribus undatis cinereis maculaque media testacea.

*Wien. Verz.* D. Schieffermyller noctua calvaria.

*Desc.* Media. *Corpus* griseum. *Palpi* magni reflexi fere pyralidum. *Alæ anticæ* obscuræ, fuscæ, strigis tribus undatis maculisque duabus marginalibus albidis.

In medio inter strigas punctum parvum  
maculaque posterior magna fulva , &  
in hac puncta duo parva nigra. *Postica*  
fusca , subtus albo undata.

**Ridens. N.** ( l'agréable ) cristata , alis deflexis  
viridi - fusco alboque variis , macula  
baseos strigisque duabus undatis albis ,  
antennis flavescentibus.

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc.* Statura & magnitudo *N. rumicis*.  
*Caput & thorax* virescentia albo irro-  
rata. *Antennæ* flavescentes. *Abdomen*  
pallidum. *Alæ* viridi - fusco alboque  
variæ , macula magna distincta alba  
baseos ad marginem exteriorem , quæ  
strigam undatam albam attingit. Pone  
maculas ordinarias striga altera undata  
alba. Versus apicem strigæ lineolis  
albis lunulisque atris.

**Asteris. N.** ( de l'aster de la Chine ) cristata , alis  
integris striatis cinereis , marginibus  
nigris , exteriore punctis tribus nigris.

*Wien. Verz.* 312. 10. noctua asteris.

*Hab. in astere Chinesi. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino *N.*  
*verbasci*, at *alæ* integræ. *Antennæ* supra  
albæ , subtus ferrugineæ. *Alæ* in medio  
pallidæ , lateribus fuscis. In costa puncta  
tria alba ; in margine tenuiori lunula  
alba. *Postica* fusca , disco ciliisque albis.

**Chamomillæ. N.** ( de la camomille ) cristata , alis anticis  
lanceolatis striatis canis , punctis duobus  
centralibus minutissimis nigris , subtus  
immaculatis.

*Wien. Verz.* 73. 3. noctua chamomillæ.

*Hab. in chamomilla , flores excedens. D.*  
*Schieffermyller.*



*Desc.* Nimis affinis *N. umbraticæ*, vix distinguenda, at larva diversissima. *Antennæ* ferruginæ. *Caput* fuscum, strigis cinereis. *Thorax* hirtus cinereus, striga antica marginali nigra. *Abdomen* griseum, basi fasciculis aliquot dorsalibus. *Alæ anticæ* supra striatæ canæ, in medio punctis duobus hirsutissimis costaque punctis tribus cinereis. *Subtus* cinereæ, punctis tribus costalibus albis. *Posticæ* striatæ, cinereæ, ciliis albis; *subtus* immaculatæ, lunula parva centrali fusca.

*Larva* nuda cinerea, utrinque lineolis duabus incurvis ferrugineis in singulo segmento. Junior flavo alboque maculata.

**Tanaceti. N.** ( de la tanaïsie ) cristata, alis lanceolatis striatis canis, lineolis duabus atris, posticis albis subtus immaculatis.

*Wien. Verz.* 73. 5. noctua tanaceti.

*Hab.* in tanaceti vulgaris floribus. *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis *N. chamomillæ*. *Antennæ* ferruginæ, basi albidæ. *Caput* cinereum. *Thorax* cinereus, striga antica fusca. *Abdomen*, basi albidum. *Alæ anticæ* striatæ canæ, lineola a basi fere ad medium ducta, & alia in medio brevior, apice parum flexa. Puncta tria costalia. *Subtus* obscuræ nitidæ. *Posticæ* albæ, supra margine nigricante, subtus immaculatæ.

*Larva* nuda cinerascens, nigro punctata flavoque lineata, similis larvæ *N. verbasci*.

**Lactuæ. N.** ( la laitue ) cristata, alis anticis striatis lanceolatis canis fusco obliore



undatis, subtus fuscis, posticis disco albo.

*Wien. Verz.* 76. 7. noctua lactucae.

*Hab. in lactuca sativa. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Summa affinitas *N. umbraticæ*.

Striga antica thoracis interrupta. *Alæ* striatæ, undis aliquot fuscis, at absque punctis centralibus costalibusque. *Subtus* fuscae basi margineque pallidæ, punctis tribus costalibus albidioribus. *Posticæ* fuscae, disco albicante.

*Larva* atra, annulis lateralibus albis lineaque dorsali maculari fulva, capite atro, linea antica bifida alba.

*Lactea. N.* ( la laiteuse ) cristata, alis deflexis niveis nitidis immaculatis.

*Hab. in Russia Australiori. D. Boeber.*

*Desc.* Statura omnino *N. umbraticæ*, at duplo minor. *Antennæ*, *caput*, *thorax* alba, immaculata. *Alæ omnes* nivæ, nitidæ, omnino immaculatæ.

*Lithoxylæa. N.* ( du poirier ) cristata, alis deflexis dentatis cinereis fusco maculatis, margine postico fusco.

*Wien. Verz.* 75. 2. noctua lithoxylæa.

*Hab. in Pyro. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Corpus* cinereum. *Thorax* linea dorsali brunnea. *Alæ anticae* dentatæ, cinereæ, maculis punctisque obsoletis fuscis. Margo posticus tenuissime fuscus. *Subtus* cinereæ, margine tenuiori nitido. *Posticæ* cinereæ, margine postico fusco, subtus immaculatæ.

*Petrificata. N.* ( du chêne ) cristata, alis dentatis griseo fuscoque nebulosis, posticis fuscis, capite antice quadrifido.

*Wien. Verz.* 75. 3. noctua petrificata.

*Hab. in Austriæ quercu. D. Schieffermyller.*

*Desc. Statura & magnitudo N. lithoxylææ. Antennæ fuscae. Caput antice dentibus quatuor distinctis. Thoracis crista itidem bifida. Alæ anticae dentatae, cinereo fuscoque variae, maculis ordinariis pallidis.*

*Larva nuda viridis, linea dorsali candida lineolisque albis sparsis, stigmatibus niveis annulo nigro cinctis, capite viridi.*

**Rhizolitha.** N. ( la rhizolite ) cristata, alis subdentatis cinereis, lineola baseos intermediaque atris, thoracis crista bifida.

*Wien. Verz. 75. 6. noctua rhizolitha.*

*Hab. in quercu. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magnitudo præcedentis. Caput cinereum, transverse bifidum. Thorax hirtus, cinereus, lunula marginali antica nigra. Crista erecta, bifida. Alæ griseae, lineola baseos distincta atra, in medio lunulae lineolaque nigræ, apice puncta nigra. Posticae supra fuscae, subtus cinereae, puncto medio strigaeque postica fuscis.*

*Larva subpilosa viridis, albo irrorata, linea dorsali cærulescente.*

**Conformis.** N. ( du bouleau blanc ) cristata, alis dentatis griseis, lineolis duabus atris, abdomine subtus brunneo.

*Wien. Verz. 76. 7. noctua conformis.*

*Hab. in betula alba. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Antennæ nigricantes. Caput & thorax hirta fusca. Abdomen hirtum, imprimis subtus brunneum. Alæ anticae griseo vix undatae. In medio*

alæ lineolæ duæ utrinque bifidæ, exteriori adnata macula rufescente. *Posticæ* obscuræ. Subtus omnes cinereæ, rufonitentes, puncto medio strigaque postica fuscis.

**Advena. N.** ( l'étrangere ) cristata, alis deflexis dentatis cinereo fuscoque variis, thoracis cristâ bifida.

*Wien. Verz.* 77. 11. noctua advena.

*Hab. in betula alba. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna, cinereo fuscoque varia, postice striga abbreviata nigra. In medio maculæ ordinariæ *Posticæ* fuscae. Thoracis cristâ elevata, bifida quasi canaliculata.

**Basilinea. N.** ( le trait noir ) cristata, alis deflexis fusco griseis undatis, lineola baseos atra, thoracis cristata bifida.

*Wien. Verz.* 78. 12. noctua. basilinea.

*Hab. in Austria. Schieffermyller.*

*Desc.* Color variat vel ferrugineus vel griseus, distincta lineola parva flexuosa atra baseos. *Antennæ* albidæ.

**Radicea. N.** ( des racines ) cristata, alis deflexis variegatis, striga postica dentata alba, thoracis cristata elevata bifida.

*Wien. Verz.* 81. 15. noctua radicea.

*Hab. in graminum radicibus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Antennæ* fuscae. *Caput & thorax* ferruginea, striga antica atra. *Alæ antica* dentatæ, variegatæ, lineola atra baseos. In medio marginis tenuioris litura alba lineola atra, apice striga valde dentata albida. *Posticæ* basi albidæ, apice fuscae. Subtus apice rufescentes.

*Larva* nuda cinerea, maculis elevatis, capite caudaque atris.

**Lamda. 257. N.** ( lamda ) cristata, alis deflexis fusco-cinereis, lineola baseos duabusque in medio atris.

*Hab. in Germania. D. Schneider.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino N.

*pfi.* Caput & thorax obscure cinerea, valde cristata. *Alæ anticæ* obscure cinereæ, nitidæ, fascia baseos mediisque obsoletis obscurioribus. Lineola atra ad basin duæque in medio, interiori longiori.

### Geometræ.

**Buplevraria. G.** ( du buplevre ) pectinicornis, alis dentatis viridibus, striga sesquialtera alba, margine fusco punctato.

*Wien. Verz.* 97. 4. phalæna buplevraria.

*Knoch. Beytr.* 1. tab. 1. fig. 1. phalæna sesquifstriata.

*Hab. in Austriæ buplevro. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino G. *vernariæ*. *Alæ* valde dentatæ, virides, anticis strigis duabus, posticis unica albis. Margo posticus fusco punctatus.

**Roboraria. G.** ( du roure ) pectinicornis alis dentatis griseis, atomis strigisque numerosis fuscis.

*Wien. Verz.* 101. 1. phalæna roboraria.

*Hab. in quercu. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna tota grisea, atomis strigisque undatis fuscis. *Subtus* alæ albidæ, lunulis fuscis.

*Larva* griseo-fusca, linea dorsali arcubusque singuli segmenti obscurioribus.



**Confortaria. G.** ( l'affermie ) *pectinicornis* alis dentatis griseis fusco strigosis, posticis puncto oblongo ocellari albido.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino præcedentis, paullo minor, grisea atomis strigisque fuscis distincta, puncto oblongo albo annulo fusco cincto in medio *alæ posticæ*. Subtus omnes griseæ, puncto medio strigaque fuscis.

**Consperfaria. G.** ( la criblée ) *pectinicornis*, alis rotundatis cinereis, atomis numerosis fuscis.

*Wien. Verz. 106. 8. phalæna consperfaria.*

*Hab. in Austriæ salvia pratensis. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo *G. piniaria*, tota cinerea, atomis numerosis fuscis. Interdum punctum medium suboccellatum, fuscum. *Mas*, antennis minus pectinatis, albidior.

*Larva* caudata albida, rufo striata, cauda bidentata.

**Adspersaria. G.** ( l'arrosée ) *pectinicornis*, alis omnibus luteis fusco irroratis.

*Hab. Halæ-Saxonum. D. Hybner.*

*Desc.* Statura omnino *G. limbaria*, at *alæ omnes* supra subtusque luteæ, atomis numerosissimis fuscis.

**Lichenaria. G.** ( du lichen ) *pectinicornis*, alis viridi cinereoque variis, strigis duabus nigris, anteriore incurva, posteriore undato flexuosa.

*Wien. Verz. 100. 8. phalæna lichenaria.*

*Hab. in Austriæ lichenibus. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.*



*Desc.* Parva tenera. *Alæ anticæ* cinereæ, viridi colore, imprimis in medio, mixto. Striga ante medium atra, recurva & altera valde flexuosa undata versus marginem. Margo ipse nigro punctatus. *Posticæ* griseæ, striga undata punctisque marginalibus fuscis.

*Larva* scabra viridis aut cinerea, luteo varia, lateribus atro maculatis, pedibus anticis macula atra, puncto viridi.

*Variet* color larvæ secundum colorem lichenum.

Cineraria. G. ( la cendrée ) pectinicornis, alis anticis griseis, strigis duabus nigris, posticis cinereis, striga unica.

*Wien. Verz.* 100. 10. phalæna cineraria.

*Hab.* in ryffo candelario. D. Schieffermyller.

*Desc.* Parva, tenera; grisea, margine nigro punctato.

*Larva* fusca, dorso cinereo, maculis transversis albis.

Capreolaria. G. ( du sapin ) pectinicornis, alis griseis, fascia saturatiore; puncto medio lineolaque apicis nigris.

*Wien. Verz.* 105. 2. phalæna capreolaria.

*Hab.* in pino picea. Mus. D. Schieffermyller.

*Desc.* Statura G. *defoliaria*, at minor. *Antennæ* pectinatae fuscae. *Alæ anticæ* griseæ sive cinereæ, atomis fuscis. In medio fascia lata postice sinuata, obscurior & in hac punctum nigrum. In apice lineola nigra. *Posticæ* cinereæ, strigis atomisque fuscis. Subtus omnes cinereæ, anticis puncto, posticis puncto strigaeque punctorum nigrorum.

Murinaria. G. ( la grise ) pectinicornis, alis griseis, strigis duabus punctoque medio fuscis.

Wien. Verz. 105. 4. phalæna murinaria.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Parva, tenera. Corpus griseum.

Alæ omnes griseæ; anticæ strigis duabus subundatis punctoque medio fuscis; posticæ puncto medio strigaeque postica fuscis. Subtus omnes griseæ, immaculatæ.

Pedaria. G. ( de l'aulne ) pectinicornis, alis griseo virescentibus fusco irroratis, pedibus albo annulatis, sæmina aptera.

Hab. in betula alno. D. Hybner.

Desc. Obscura. Alæ griseæ, viridi colore nitentes, maculis atomisque fuscis. Posticæ albidiores, strigis atomisque obscurioribus. Pedes omnes grisei, albo annulati.

Hispidaria. G. ( la hérissée ) pectinicornis, alis cinereo-fuscis, striga undata obscuriore, margine albo punctato, antennis flavis.

Wien. Verz. 99. 4. phalæna hispidaria.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Nimis affinis G. hirtaria, at paullo minor. Corpus hirtum, griseo-fuscum.

Antennæ flavæ. Alæ obscuræ, striga media undata obscuriore. Margo albo punctatus.

Nivearia. G. ( la neigeuse ) pectinicornis, alis niveis immaculatis; anticis subtus fuscescentibus.

Wien. Verz. 116. 4. phalæna nivearia.

Scop. carn. phalæna niveata.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

*Desc.* Media. *Antennæ* fuscæ. *Alæ omnes* albæ, supra immaculatæ, subtus *anticæ* fuscescentes.

Pluviaria. G. ( l'inégale ) *pectinicornis*, alis cinereis fulco irroratis, strigis anticarum duabus, posticarum unica fuscis.

*Hab.* Halæ-Saxonum. D. Hybner.

*Desc.* Media. *Antennæ* pectinatæ, rachis pallida. *Corpus* cinereum. *Alæ omnes* cineræ, parum lutescentes. *Anticæ* strigis duabus; *posticæ* unica fuscis. *Subtus* concolores, at anticis loco strigæ anticæ macula oblonga disci.

Smaragdaria. G. ( l'émeraudine ) *pectinicornis*, alis viridibus, anticis strigis duabus punctoque medio albis.

*Hab.* in Austria. D. Schieffermyller.

*Desc.* Statura G. *prasinaria*. *Antennæ* pectinatæ, fuscescentes. *Alæ omnes* virides, anticis striga baseos e lunulis duabus cohærentibus alba. In medio punctum album & postice striga undata alba. *Posticæ* immaculatæ. *Subtus omnes* virescentes, striga pallida.

Carbonaria. G. ( du bry des murs ) *pectinicornis*, alis rotundatis fuscis flavo subfasciatis, apice setaceis.

*Wien. Verz.* 108. 5. *phalæna carbonaria*.

*Hab.* in bryo murali. D. Schieffermyller.

*Desc.* Parva. *Antennæ* pectinatæ, apice setacæ. *Caput* & *thorax* nigra. *Alæ omnes* fuscæ, strigis undatis obscurioribus aliisque flavis, quæ ad marginem tenuiorem macula magna flava terminantur.

Nitidaria. G. ( la brillante ) pectinicornis , alis argenteis , anticis strigis duabus obliquis fuscis.

*Hab. in Russia Australiori. D. Boeber.*

*Desc. Minor G. betulariæ. Corpus album.*

*Antennæ parum pectinatae. Alæ anticæ argenteæ , nitidæ , strigis duabus obliquis fuscis. Posticæ immaculatæ , subtus atomis strigique postica fuscis.*

Prodromaria. G. ( la précoce ) pectinicornis , alis albis nigro punctatis , fasciis duabus latis fuscis.

*Wien Verz. 99. 1. phalæna prodromaria.*

*Hab. in Germaniæ quercu , tilia.*

*Desc. Statura omnino G. betulariæ. Caput album , antennis nigris albo annulatis.*

*Thorax hirtus albus , fasciis duabus abbreviatis nigris. Abdomen griseum.*

*Alæ albæ nigro punctatæ , fasciis duabus fuscis nigro marginatis. Mas minor , pallidior.*

*Larva geometra mox cinerea , mox fusca , mox ferruginea , capite carneo.*

*Puppa folliculata brunnea sub terra.*

Lignaria. G. ( des bois ) pectinicornis , alis nigricantibus griseo subfasciatis.

*Hab. in Saxoniz ligno putrido. Mus. D. Romani.*

*Desc. Alæ omnes nigricantes , strigis numerosis griseis.*

*Larva geometra nigra , lineis quatuor punctorum nigrorum.*

Artefiaria. G. ( l'acolée ) pectinicornis , alis griseis , striga obliqua alba maculaque ferruginea.

*Wien. Verz. 102. 2. phalæna artefiaria.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermüller.*

*Desc.* Minor. *Alæ anticae* griseæ, pone medium striga obliqua albida & pone hanc macula ferruginea strigæ contigua. *Posticæ* immaculatæ.

**Aureolaria.** G. ( des buissons ) pectinicornis, alis flavissimis, strigis tribus margineque fuscis.

*Wien. Verz.* 102. 8. phalæna aureolaria.

*Hab.* in Austriae vicia dumetorum. D. Schieffermyller.

*Desc.* Parva. *Alæ omnes* concolores flavæ, *anticis* strigis tribus, *posticis* duabus margineque fuscis.

*Larva* tenuis, glabra, albida, dorso obscuriore, linea fusca.

**Gilvaria.** G. ( du millefeuille ) pectinicornis, alis anticis flavescentibus, fascia obliqua atomisque fuscis.

*Wien. Verz.* 102. 10. phalæna gilvaria.

*Hab.* in achillæa millefolio. D. Schieffermyller.

*Desc.* Paullo præcedente major. *Alæ anticae* flavescentes, fascia a medio marginis tenuioris ad apicem ducta. *Posticæ* albidæ.

*Larva* obscure cinerea, ferrugineo lineata lineaque dorsali albida.

**Pygmaria.** G. ( la pygmée ) pectinicornis, alis cinereis, basi fusca striga atra terminata.

*Hab.* Kiljæ. D. Daldorf.

*Desc.* Parva. *Antennæ* pectinatæ. *Corpus* cinereum. *Alæ anticae* basi fuscae & hic color terminatur striga atra; tunc cinereæ, striga postica una alterave fusca; *subtus* cinereæ, lunula centrali fusca.



Horridaria. G. ( la négresse ) pectinicornis , alis nigris nitidulis , strigis obscurioribus.

Wien. Verz. 100. 7.

Hab. in Austria. D. Schieffermyller.

Desc. Parva. Corpus atrum , immaculatum. Alæ omnes nigræ , nitidulæ , strigis aliquot obscurioribus.

*Antennis setaceis.*

Flexula. G. ( la sinuée ) Sp. inf. 2. 254. 69. phalæna sinuata.

Wien. Verz. 64. 3. phalæna flexula.

Larva virescens , collo gibbo clavato , cauda acuminata , capite pedibusque rufescentibus.

Rhamnata. G. ( du nerprun ) feticornis , alis dentatis fuscescentibus , fascia media dentata obscuriore , lunula atra , puncto strigique fuscis.

Wien. Verz. 109. 2. phalæna rhamnata.

Hab. in Austriæ rhamno cathartico. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Magna. Alæ omnes obscuræ , cinereo valde undatæ , imprimis basi apiceque. In medio alæ anticæ lunula parva nigra. Subtus omnes cinereæ , puncto medio strigique postica undata fuscis.

Larva viridis , linea dorsali fusca , segmentorum marginibus flavis , capite fusco.

Dubitata. G. ( l'incertaine ) feticornis , alis obscuris fusco cinereoque undatis , nervis albo punctatis.

Wien. Verz. 109. 3. phalæna dubitata.

Hab. in Austriæ rhamno cathartico. Mus. D. Schieffermyller.

*Desc.* Nimis præcedenti affinis, differt tamen alis obscuris fusco pallidoque undatis, nervis albo punctatis. *Alæ posticæ* haud concolores uti in præcedente, sed cinereæ, nervis albo punctatis apice striga pallida nigraque. Subtus cinereæ, lunula media punctisque nervorum fuscis.

*Larva* viridis, fusco pallidoque sublineata, laterali flava.

**Furcata. G.** ( de la viorne cotonneuse ) feticornis, alis dentatis fusco - griseis, fascia lata dentata obscuriore.

*Wien. Verz.* 108. 1. phalæna furcata.

*Hab.* in viburno lantana. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Antennæ* intus ferrugineæ.

*Alæ omnes* dentatæ obscure griseæ.

Ante medium fascia lata utrinque dentata obscurior & pone hanc striga obsoleta pallida. Subtus *omnes* basi obscuræ, apice pallidiores.

*Larva* livida, carneo undata nigroque punctata, postice denticulorum tribus paribus, intermedio minori.

**Lividata. G.** ( la livide ) feticornis, alis dentatis griseis nigro undatis punctoque medio subocellari.

*Wien. Verz.* 103. 3. phalæna obscurata.

*Hab.* in rubo cæcio, Austriæ. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Alæ omnes* valde dentatæ, griseæ, strigis obsoletis interruptis nigris. In medio punctum subocellatum album. Subtus cinereæ, striga undata apicis nigra.

*Larva* fusca albo punctata, postice bidentata, capite cinereo.

*Pyraliata. G.* ( du caille-lait jaune ) *feticornis*, alis flavis, strigis quatuor undatis fuscis, posteriori maculari.

*Wien. Verz.* 117. 1. *phalæna pyraliata.*

*Hab. in Austria gallio vero. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino *G. populatæ. Alæ anticæ* flavæ, strigis quatuor, quarum tres undatæ, quarta vero macularis. *Subtus* puncto medio, striga postica maculaque apicis fuscis. *Posticæ* supra pallidiores, striga fusca. *Subtus* puncto medio strigisque duabus fuscis.

*Aurantiata. G.* ( l'orangée ) *feticornis*, alis ferrugineo-fuscis, cinereo substrigosis, posticis aurantiis, puncto centrali fusco.

*Frank. Beytr.* 2. 1. 457. *tab. phalæna diversata.*

*Wien. Verz.* 315. 14.

*Hab. in Germania. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magnitudo & statura *G. prunatæ. Alæ anticæ* fuscae, ferrugineo parum nitentes. Costa cinereo punctata, quæ in strigas obsoleta excurrit. *Posticæ* aurantiæ, fusco irroratæ, puncto medio magno distincto margineque fuscis. *Subtus anticæ* aurantiæ, atomis punctoque medio fuscis. *Posticæ* atomis numerosioribus strigaque postica fuscis. *Femina* pallidior, alis magis rotundatis.

*Rubidata. G.* ( la rougeâtre ) *feticornis*, alis antictis fuscis, fasciis duabus ferrugineis.

*Wien. Verz.* 113. 22. *phalæna rubidata.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Paullo minor *G. miata. Alæ anticæ* basi fuscae, tunc fascia lata ferruginea; demum fuscae ad marginem tenuiorem

cineraſcentes fuſco parum undatæ; denique fascia altera ruſa poſtice cinereo undata, apice fuſcæ.

**Spartata. G.** ( du genêt ) feticornis , alis oblongis fuſcis , vitta albida , poſtice cinereis.  
*Eyefl. arch. 2. tab. 5. phalæna ſpartata.*  
*Hab. in Germaniæ ſpartio. Muſ. D. Romani.*

*Deſc.* Diſtincta alis obliquis longioribus fuſcis , vitta pallida , poſtice præterea ſtriga albida.

*Larva* viridis aut flava , linea laterali alba.  
*Puppa* brunnea.

**Berberata. G.** ( de l'épine-vinette ) fetinicornis , alis anticis cinereis , faſciis tribus fuſcis , poſteriori nigro undata.

*Vien. Verz. 113. 23. phalæna berberata.*

*Hab. in Auftriæ berberis vulgari. D. Schieffermyller.*

*Deſc.* Media. *Alæ anticæ* cinereæ , faſciis duabus ante medium fuſcis. Pone medium tertia magis obſoleta nigro undata. Ala apice terminatur lineola nigra. *Poſticæ* cinereæ.

*Larva* ſcabra fuſco ruſo alboque variegata.

**Illibata. G.** ( la vierge ) feticornis , alis omnibus albis immaculatis.

*Wien. Verz. 116. 5. phalæna illibata.*

*Hab. in Auftria. Muſ. D. Schieffermyller.*

*Deſc.* Minor *G. albicillatæ. Alæ omnes* albæ immaculatæ.

**Diverſata. G.** ( la croiſſée ) feticornis , alis omnibus fuſco-cinereis , lineis ſtrigisque albis diverſatis.

*Wien. Verz. 107. 7. phalæna diverſata.*

*Hab. in Auftria. Muſ. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino *G. clathrata*; differt tamen manifeste alis omnibus concoloribus fusco - cinereis, lineis baseos strigisque apicis albis.

*Asinata. G.* ( la grisette ) feticornis, alis griseo-cinereis immaculatis.

*Wien. Verz.* 116. 2. phalæna griseata.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Alæ omnes* griseæ immaculatæ. Statura & magnitudo *G. chærophyllatæ*.

*Procellata. G.* ( la brouillée ) feticornis, alis anticis albis, fasciis tribus fuscis, media dimidiata, postica marginali, macula alba.

*Wien. Verz.* 114. 1. phalæna procellata.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Alæ anticæ* albæ, fasciis tribus, altera baseos, media dimidiata & tertia marginali fuscis. Costa fere tota fusca. Striga undata maculaque magna albæ in fascia marginali. *Posticæ* albæ, margine fusco. *Caput & thorax* fusca. *Abdomen* albidum.

*Reticulata. G.* ( la reticulée ) feticornis, alis anticis fuscis albo reticulatis.

*Wien. Verz.* 114. 3. phalæna reticulata.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magnitudo *G. fluctuatæ*. *Alæ anticæ* fuscae, strigis lineisque variis albis reticulatæ. *Posticæ* obscure cinereæ, apice strigis albidis.

*Centaureata. G.* ( de la centaurée ) feticornis, alis albidis, macula costali fusca, lunula atra.

*Wien. Verz.* 114. 7. phalæna centaureata.

*Hab. in centaureæ scabiosæ floribus. D. Schieffermyller.*



*Desc.* Parva. *Alæ anticæ* albæ, atomis aliquot fuscis. In medio costæ macula magna fusca & in hac lunula atra. *Posticæ* albæ, puncto medio.  
*Larva* viridis, rubro maculata.

**Aduſtata.** G. ( du fufain ) feticornis, alis anticis albidis, fasciis duabus fuscis, posteriore repanda cinereo undata.

*Wien. Verz.* 114. 9. phalæna aduſtata.

*Hab.* in Austriæ evonymo Europæo.

*D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. Fascia altera baseos, altera fere marginalis.

*Larva* viridis, macula, marginali alba rubro punctata.

**Propugnata.** G. ( la fortifiée ) feticornis, alis anticis cinereis, fasciis duabus ferrugineis, posteriore nigro marginata.

*Wien. Verz.* 112. 7. phalæna propugnata.

*Hab.* in Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo G. *quadrifasciata*. *Alæ anticæ* cinereæ, fascia parva baseos ferruginea. In medio fascia latior, quæ utrinque nigro marginata. *Posticæ* cinereæ, apice fusco undatæ.

**Fulvata.** G. ( la fauve ) feticornis, alis anticis griseis, fascia media sinuata rufescente.

*Hab.* in Suecia. *D. de Paykull.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ anticæ* obscure griseæ, litura baseos fasciaque media rufescentibus. *Posticæ* cinereæ.

**Rusticata.** G. ( la rustique ) feticornis, alis albidis, anticis fascia lata fusca, omnibusque puncto centrali nigro.

*Wien. Verz.* 113. 15. phalæna rusticata.

*Hab.* in Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis præcedentibus, at triplo minor. *Alæ anticae* albidæ, fascia media lata fusca & in hac punctum atrum. *Posticæ* albidæ, puncto medio atro.

**Mellinata.** G. ( du miel ) feticornis, alis flavo-testaceis, fascia media obsoleta obscuriore.

*Hab.* in Austria. *Mus.* D. Schieffermyller.

*Desc.* Media. *Alæ* fere unicolores testaceæ, parum flavescences. In medio fascia fere obsoleta, marginibus obscurioribus. *Posticæ* pallidiores.

**Linariata.** G. ( de la linair ) feticornis, alis anticis ferrugineo cinereoque fasciatis, medio fascia lata, apice maculis fuscis,

*Wien. Verz.* 113. 10. phalæna linariata.

*Hab.* in antirrhino linaria. *Mus.* D. Schieffermyller.

*Desc.* Minuta. *Alæ anticae* basi cinereæ, fascia lata ferruginea, in medio fascia lata fusca, puncto centrali atro; tunc fascia ferruginea cinereæ juncta & in hac maculæ duæ fuscae. *Posticæ* fusco cinereoque variæ.

*Larva* flava, maculis dorsalibus pedibusque rubris.

**Hexapterata.** G. ( du hêtre ) feticornis, alis fusco griseoque variis, posticis albis basi duplicatis.

*Wien. Verz.* 109. 10. phalæna hexapterata.

*Hab.* in fago sylvatica. *Mus.* D. Schieffermyller.

*Desc.* Media. *Alæ anticae* griseæ fusco undatæ, imprimis basi apiceque; in medio parum dilutiores lunula fusca.

*Posticæ* albæ , ad basin alæ nota rotundata , alba , immaculata. Subtus omnes cinereæ , puncto medio fusco.

**Psittacata.** G. ( du tilleul ) feticornis , alis anticis viridibus nigro undatis , fasciis duabus cinereo ferrugineoque variis.

*Wien. Verz.* 112. 8. phalæna psittacata.

*Hab. in Austriæ tilia. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino G. *alchemillatæ*.

*Alæ anticæ* virides , nigro undatæ. Ante medium fascia lata albo ferrugineoque varia , & pone medium altera itidem albo ferrugineoque varia. *Posticæ* fuscæ , subtus cinereæ , puncto strigisque fuscis.

**Moniliata.** G. ( la coquille ) feticornis , alis omnibus cinereis , strigis nigris fasciaque postica fusca , striga moniliformi cinerea.

*Wien. Verz.* 117. 10. phalæna moniliata.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Alæ omnes* cinereæ , strigis

*anticæ* quatuor ; *posticæ* tribus nigris.

Inter ultimas strigas fascia obsoleta

obscurior , striga moniliformi cinerea.

Margo ipse nigro punctatus.

**Euphorbiata.** G. ( de l'Euphorbe ) feticornis , alis fusco cinereis immaculatis.

*Wien. Verz.* 116. 9. phalæna Euphorbiata.

*Hab. in Austriæ euphorbiâ. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Alæ* immaculatæ , mox obscuriores , mox pallidiores.

**Lævigata.** G. ( la luisante ) feticornis , alis griseis , fascia striga punctisque marginalibus fuscis.

*Wien. Verz.* 117. 10. phalæna lævigata.  
*Scop. Ent. carn.* phalæna lævigata.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Minuta.

Sagittata. G. ( l'Archer ) feticornis , alis fuscescentibus , fasciis duabus atris albo marginatis , posteriori dentem exserente.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Statura & magnitudo G. sociatæ.  
*Alæ anticæ* fuscæ ferrugineo mixtæ.  
 Fascia baseos parva atra , albo marginata & in medio altera major itidem atro albo marginata , quæ retrorsum dentem validum exserit. *Posticæ* cineræ , striga pallidiore.

Luteata. G. ( la jaunie ) feticornis , alis pallide flavis ferrugineo fasciatis punctoque medio fulvo.

*Wien. Verz.* 110. 18. phalæna luteata.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Statura G. rubricatæ. *Alæ omnes* pallide flavæ , fasciis plurimis undatis ferrugineis. In medio *alæ anticæ* punctum fulvum.

Ornata. G. ( l'ornée ) feticornis , alis niveis , puncto medio margineque postico undato fuscis.

*Wien. Verz.* 117. 14. phalæna ornata.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Nimis G. cineratæ affinis , at alæ magis nivææ & margo posticus minus niger.

Rubricata. G. ( la rougie ) feticornis , alis purpurascentibus , strigis undatis fuscis.

*Wien. Verz.* 110. 19. phalæna rubricata.



*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Parva. Alæ omnes purpurascences, strigis quatuor fuscis, quarta pallidior. Subtus concolores, at striga baseos deest.*

**Ochreata. G.** ( de la fétuque durette ) feticornis, alis flavescens, strigis numerosis obscurioribus.

*Wien. Verz. 110. 20 phalæna ochreata.*

*Hab. in festuca duriuscula Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc. Parva. Alæ omnes flavescens, strigis undatis obscurioribus. Subtus concolores, at obscuriores.*

**Extremata. G.** ( la terminée ) feticornis, alis albidis, fascia baseos lunula media maculaque postica nigris.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Minuta. Alæ antiçæ albidæ, fascia baseos lata nigra albo undata. In medio lunula nigra & versus apicem macula magna fusca.*

**Scutata. G.** ( l'écussonnée ) feticornis, alis cinereis, puncto medio fasciaque postica punctorum ocellatorum fuscis.

*Wien. Verz. 117. 12. phalæna scutata.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Parva. Alæ omnes cinereæ, basi subimmaculatæ, in medio puncto fusco. Posticæ striga undata fusca, cui adhærent puncta subocellata. Margo nigro punctatus.*

**Osseata. G.** ( la salie ) feticornis, alis albis obscurius undatis, puncto medio nigro, anticis causta ferruginea.

*Wien. Verz. 110. 22. phalæna osseata.*



*Desc.* Parva. *Corpus* cinereum, *thorace* antice ferrugineo. *Alæ omnes* pallidæ, apice *strigis* undatis obscurioribus & in medio punctum nigrum. *Costa alæ antica* ferruginea.

**Albulata. G.** ( la blanchâtre ) *feticornis*, *alis anticis* niveis, *strigis* undatis obscurioribus.

*Wien. Verz.* 109. 12. *phalæna* albulata.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis *G. immutata*, sed distincta *alis posticis* anticis haud concoloribus, sed albis immaculatis. Subtus *antica* obscuræ; *postica* albæ puncto *strigis* que obscurioribus.

**Nassata. G.** ( la coupée ) *feticornis*, *alis anticis* fuscis, *fascia media* undata nivea, *striga* fusca.

*Wien. Verz.* 109. 13. *phalæna* nassata.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Alæ antica* fusca, in medio *fascia lata* alba, & in hac *striga* parva fusca. *Postica* cinereæ, *subtus* albidæ, *margin*e fusco.

**Pusillata. G.** ( le croissant-noir ) *feticornis*, *alis fuscis* cinereo subundatis, *lunula media* atra.

*Wien. Verz.* 110. 26. *phalæna* pusillata.

*Hab. in Austria junipero. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Alæ antica* fusca, *undis* numerosis cinereis. In medio *lunula magna* atra. Subtus *omnes* fusca.

*Larva* viridis, pallido lineata.

*Puppa* viridis.

**Repandata. G.** ( la sinueuse ) *feticornis*, *alis cinerascens* tribus undatis puncto medio fuscis.

*Wien.*

*Wien. Verz.* 120. 2. phalæna repandâlis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Statura præcedentium. Corpus cinereum, abdomine albidò. *Alæ anticæ* cinerascens, striga parva ante medium, tunc puncto in medio, deinde striga valde flexuosa & tandem striga incurva fuscis. *Posticæ* albo hyalinæ; striga flexuosa fusca.

**Verbascata. G.** ( de la molene ) feticornis, alis flavescens : anticis strigis tribus punctoque medio fuscis.

*Wien. Verz.* 121. 5. phalæna verbascalis.  
*Hab. in verbasco thapsus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura *G. urticatæ*, at paullo minor. *Alæ omnes* flavæ, anticis strigis tribus punctoque medio fuscis. Margo fuscescens, ciliis argenteis.

**Sambucata. G.** ( du fureau ) feticornis, alis fuscis; maculis hyalinis sparsis.

*Wien. Verz.* 124. 14. phalæna sambucalis.  
*Hab. in Austria sambuco. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ omnes* fuscae, maculis hyalinis. Postice striga flexuosa macularis flavescens.

**Candidata. G.** ( la blanche ) feticornis, alis niveis; strigis undatis fuscis punctisque duobus atris.

*Wien. Verz.* 316. 46. phalæna nivealis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Caput niveum. *Alæ* nivæ. Punctum parvum baseos atrum. Postice strigæ tres undatæ fuscae, in quarum anteriore punctum geminatum atrum; *Posticæ* albæ, strigis duabus fuscis.

Luclua. G. ) la singuliere ) seticornis, alis anticis fusco-virescentibus, fasciis duabus albis punctoque centrali nigro.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *De Hybner.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ* omnes fusco-virescentes; fascia ante medium fordide alba; in medio punctum nigrum fasciæque altera alba undata fusco strigosa. *Posticæ* cinereæ, puncto centrali strigisque fuscis.

## PYRALIDES.

*Alis forficatis.*

Marginalis. P. ( la bordée ) palpis recurvatis, alis atris, posticis margine luteo.

*Wien. Verz.* 69. 13. 317. 48. phalæna marginalis.

*Hab.* in Europa australiori. *Mus. D. Romani.*

*Desc.* Hujus generis videtur. Corpus totum atrum nitidum, solo margine alæ posticæ luteo.

Bombycalis. P. ( la pectinée ) palpis antennis pectinatis brevioribus, alis cinereo-rufis, strigis duabus albidis, posticis luteis, margine nigro.

*Wien. Verz.* 120. 6. phalæna bombycalis.

*Hab.* in Austria. *Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis bombycibus. *Antennæ* valde pectinatae nigrae. *Corpus* cinereum. *Alæ* anticæ cinereo-rufescentes, fascia obliqua pone medium albida. *Costa* albo punctata. *Posticæ* flavescens, macula magna apicis nigra.

Craissalis. P. ( l'épaisse ) alis anticis fuscescentibus apice cinereis, punctis ocellaribus nigris.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc. Major. Alæ anticæ* fuscæ, margine  
 tenuiore albo maculato. Margo posticus  
 imprimis interne cinerascens, punctis  
 aliquot obsoletis ocellaribus fuscis.  
*Posticæ* fuscæ.

Sophialis. P. ( du thalitron des boutiques ) alis  
 glabris fusco cinereoque variegatis, pos-  
 ticus cinereis margine postico fuscis.

*Hab. in Austriae lilymbrio sophia. D.*  
*Schieffermyller.*

*Desc. Media. Alæ anticæ* fusco cinereoque  
 variegatæ; *posticæ* cineræ, margine  
 postico fusco & in hoc margine puncta  
 aliquot alba.

Variegalis. P. ( la variée ) alis glabris fusco cinereo-  
 que variis, fascia postica fusca distincta.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Alæ anticæ* cinereo fuscoque  
 variegatæ indistincte. Apice fascia dis-  
 tincta fusca. *Posticæ* griseæ. Subtus  
*anticæ* fuscæ; *posticæ* albidæ.

Sericealis. P. ( la foyeuse ) alis glabris flavis,  
 macula media fusca.

*Wien. Verz. 122. 18. phalæna sericealis.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magnitudo & statura fere P. for-*  
*ficalis. Alæ anticæ* ochraceæ, macula  
 magna media fusca & in hac puncta  
 duo parva atra. Margo posticus albo  
 punctatus. *Posticæ* pallidæ.

Trinalis. P. ( la trinaire ) alis glabris flavis,  
 maculis tribus disci margineque postico  
 fuscis.

*Wien. Verz. 317. 47. phalæna trinalis.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

Kk. ij

*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ anticæ* flavæ , margine postico fusco. In medio disci maculæ tres fuscæ 2 , 1 , posteriori majori tranverso. *Posticæ* pallidiores , margine fusco.

Alpinalis. P. ( l' alpine ) alis anticis obscure cinereis , macula media alba.

*Wien. Verz.* 123. 24. phalæna alpinalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo præcedentium. *Alæ anticæ* cinereæ , macula media nivea. *Posticæ* fuscescentes , macula majori nivea. Subtus *anticæ* fuscæ , macula media alba ; *posticæ* niveæ , margine postico fusco.

Punctalis P. ( la ponctuée ) alis cinerascensibus , puncto medio niveo strigaque postica fusca.

*Wien. Verz.* 123. 25. phalæna punctalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Præcedente duplo fere minor. *Alæ anticæ* cinerascens , obscuræ , puncto parvo medio albo & pone hoc striga undata obscurior. *Posticæ* , uti omnes subtus , cinereæ.

Nitidalis. P. ( la brillante ) alis fuscis , strigis duabus flavescensibus.

*Wien. Verz.* 129. 36. phalæna nitidalis.  
*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. Corpus fuscum. *Alæ anticæ* fuscæ , nitidulæ , strigis duabus flavescensibus , quæ ad marginem exteriorem crassiores. Costa inter strigas purpurascens flavo punctatas. *Posticæ* fuscæ , strigis duabus pallidis. Subtus fuscæ , anticis macula marginali flava , posticis striga incurva pallida.



**Ramalis. P.** ( la dentelée ) palpis subrecurvatis ,  
 alis olivaceis , fascia postica dentata  
 pallida.

*Wien. Verz.* 120. 14. phalæna dentalis.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Alæ anticæ* olivaceæ , in  
 medio fascia obliqua ad marginem  
 exteriorem repanda dentes numerosos ,  
 acutos emittens , pallida. Margo pos-  
 ticus fusco striatus. *Posticæ* pallidæ ,  
 margine parum flavescens. Subtus  
*anticæ* fuscæ ; *posticæ* pallidæ.

**Ænealis. P.** ( la bronzée ) alis fuscis nitidulis im-  
 maculatis , capite ferrugineo.

*Wien. Verz.* 123. 26. phalæna ænealis.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media inter congeneres. Corpus  
 fuscum , capite ferrugineo. *Alæ anticæ*  
 fuscæ , cupro nitidulæ , immaculatæ ;  
*posticæ* fuscæ.

**Palealis. P.** ( la verdâtre ) alis anticis virescentibus  
 immaculatis.

*Wien. Verz.* 123. 27. phalæna palealis.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Præcedentibus major. *Alæ anticæ*  
 virides , immaculatæ ; *posticæ* exalbidæ.

**Ochrealis. P.** ( l'ochracée ) alis flavescens imma-  
 culatis.

*Wien. Verz.* 123. 28. phalæna ochrealis.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Minor præcedente. *Alæ anticæ*  
 ochraceæ ; *posticæ* fuscæ , immaculatæ.

**Elatalis. P.** ( l'élargie ) alis anticis albis , costa  
 interrupta submarginali fasciæque fuscis.

*Wien. Verz.* 121. 9. phalæna elatalis.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller*

*Desc.* Media. *Corpus* album. *Alæ anticae* albæ, costa usque ad medium fusca, in medio alba punctis duobus fuscis, apice fusca. Versus marginem posticum fascia lata fusca. Margo ipse nigro punctatus. *Posticae* fuscæ, costa pallida apice fusco punctata; *posticae* albidæ, lunula media strigaque postica fuscis.

Pudoralis. P. ( la vierge ) alis anticis albis, vitta rosea.

*Wien. Verz.* 124. 40. phalæna pudoralis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Parva at distincta. *Alæ anticae* albæ, vitta rosea quæ tamen basin haud attingit. *Posticae* obscure cinereæ.

Flavalis. P. ( la jaunâtre ) alis anticis sulphureis, strigis duabus maculaque media veniformis fuscis.

*Wien. Verz.* 121. 7. phalæna flavalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Media. *Caput & thorax* flava. *Abdomen* cinereum. *Alæ anticae* sulphuræ, striga antica obsoleta, flexuosa, fusca. In medio macula veniformis & pone hanc striga altera. *Posticae* pallidiores, striga unica fusca. Subtus omnes cinereo fuscoque variæ.

Polygonalis. P. ( la lisérée ) alis anticis cinereis, margine postico inaurato.

*Wien. Verz.* 121. 8. phalæna polygonalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* *Alæ* cinereæ, costa anticarum usque ad medium obscuriore. Margo posticus fusco-aureus. *Posticae* apice tantum inauratæ.

Politalis. P. ( l'unie ) alis fuscis, fascia media maculaque marginali flavis.

*Wien. Verz.* 121. 4. phalæna politalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Parva. *Alæ anticæ* basi fuscæ,  
 litura parva flava, in medio fascia lata  
 flava & in hac annuli duo connati  
 fusci. Apice fuscæ, macula una alte-  
 rave flava.

**Curtalis.** P. ( la courte ) alis flavo-cinerascentibus,  
 striga postica ferruginea.

*Wien. Verz.* 120. 8. phalæna curtalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Parva. Corpus cinereum. *Alæ omnes*  
 flavo cineræ, striga fere obsoleta, fer-  
 ruginea versus marginem posticum.

**Cespitalis.** P. ( des buissons ) alis anticis obscuris  
 variegatis, posticis nigris, strigis dua-  
 bus flavis.

*Wien. Verz.* 223. 32. phalæna cespitalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Magnitudo P. *purpuralis*. *Alæ an-  
 ticæ* colore variant.

**Porphyralis.** P. ( la marbrée ) alis fuscescentibus,  
 macula costali fulva, posticis atris,  
 striga albida.

*Wien. Verz.* 317. 50. phalæna porphyralis.  
*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Statura & summa affinitas P. *pur-  
 puralis*. *Alæ anticæ* basi obscure fuscæ,  
 maculis duabus indistinctis obscuriori-  
 bus, apice obscure purpurascentes.  
 Macula magna costalis fulva colores  
 hos distinguit. *Posticæ* atræ, striga alba.  
*Subtus* basi albidæ, striga nigra, apice  
 fuscæ, strigis albidis.

**Punicalis.** P. ( la rouge ) alis purpureis, lineola  
 baseos punctisque duobus mediis flavis.

*Wien. Verz.* 317. 49. phalæna punicalis.  
*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis *P. purpuralis*. *Alæ anticae* obscure purpureæ, lineola baseos & in medio punctis duobus flavis.

4-Punctalis. *P.* ( la quadripunctuée ) alis fuscis, anticis maculis duabus fulvis.

*Wien. Verz.* 124. 42. phalæna 4-punctalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura *P. purpuralis*. *Alæ omnes* fuscae. Maculae duæ fere oppositæ fulvæ in alis anticis ; *posticae* immaculatæ.

Pollinalis. *P.* ( la poudrée ) alis pulverulentis atris, lineola baseos punctisque duobus albis.

*Wien. Verz.* 124. 44. phalæna pollinalis.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis *P. atrali*, at *alæ* magis pulverulentæ, maculae magis approximatae & lineola baseos distincta. *Thorax* niger, immaculatus.

Alpestralis. *P.* ( le petit deuil ) alis nigro-cærulescentique variis, posticis nigris.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Abdomen* atrum, cingulis albis. *Alæ anticae* nigro-cærulescentibus variegatae. *Posticae* nigrae, margine tenuiore pallescente. *Subtus* basi cinereæ, apice fuscae.

### *Tortrices.*

Vernana. *T.* ( la printaniere ) alis rhombeis pallide virescentibus, posticis albis, margine virescente.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis *T. viridana* ; differt tamen corpore albo, alarum colore

teneriori, posticis albis, margine tantum virescente.

Vahliaua. T. ( la Valh ) alis rhombeis virescentibus, lineola alba, posticis atris, macula media margineque albis.

*Hab. in Holfatia.*

*Desc.* Statura fere bombycis. *Antennæ* crassæ, nigræ. *Corpus* nigrum. *Alæ anticae* virescentes, lineola a basi ultra medium ducta alba. *Posticae* atræ, margine antico & postico maculaque media albis. Subtus omnes atræ, margine, omni maculaque media albis.

Sponsana. T. ( l'épousée ) alis griseis, atomis rufescentibus.

*Wien. Verz.* 129. 1. phalæna sponsana.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Alæ* griseæ, atomis plurimis vix conspicuis rufescentibus, quæ fere strigas obliquas formant.

Hermannia- T. ( l'Hermann ) alis ferrugineis fusco  
na. irroratis.

*Wien. Verz.* 315. 30. phalæna Hermanniana.

*Hab. in Austriae rubo fruticoso. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Major P. *rosanæ*. *Alæ anticae* ferrugineæ, atomis maculisque numerosis fuscis. *Posticae* fuscæ.

Inundana. T. ( l'agréable ) alis anticis griseo fuscoque undatis, puncto medio niveo.

*Wien. Verz.* 132. 6. phalæna inundana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Corpus* fuscum. *Alæ anticae* fusco griseoque tenuissime variegatæ & in medio puncto niveo distincto. *Posticae* fuscæ.



Pasquagana. T. ( de l'aubépine-forbier ) alis ferrugineis immaculatis.

*Wien. Verz.* 318. 21. phalæna Pasquagana.

*Hab. in cratægo terminali. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura magna T. *rosanæ*. Caput & thorax ferruginea. *Alæ anticae* ferrugineæ, immaculatæ. *Posticæ* cineræ.

Ceretana. T. ( de la cire ) alis albis, fasciis tribus fuscis, tertia abbreviata.

*Wien. Verz.* 129. 3. phalæna ceretana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller*

*Desc.* Magna. Corpus fuscum. *Alæ anticae* albæ, fascia baseos fusca, secunda in medio obliqua, tertia ad marginem crassiolem abbreviata. *Posticæ* obscuræ.

Pilleriana. T. ( la Piller ) alis anticis aureis, fasciis duabus obliquis fuscis.

*Wien. Verz.* 126. 2. phalæna Pilleriana.

*Hab. in Stachys Germaniæ. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Alæ anticae* aureæ, fasciis duabus fuscis. *Posticæ* fuscæ.

*Variat* alis fere totis aureis absque fasciis.

*Piller*, Jesuita, olim professor Theresianus, nunc præpositus in Hungaria.

Costana. T. ( la marginale ) alis pallide testaceis, maculis duabus costalibus fuscis.

*Wien. Verz.* 127. 5. phalæna costana.

*Hab. Hafniæ. D. de Schestedt.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino T. *forsteranæ*, at *alæ* magis planæ. Caput & thorax pallide testacea immaculata. *Alæ anticae* pallide testaceæ, margine exteriori maculis duabus costalibus punctoque indistinctis nigris.

Lævigana. T. ( du charme ) alis anticis fusco-testaceis , macula media ferruginea.

*Wien. Verz.* 129. 12. phalæna lævigana.

*Hab. in Austria Carpino. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Alæ anticæ* obscure testaceæ , strigis vix conspicuis maculaque magna media ferrugineis. *Posticæ* fuscæ , macula apicis ferruginea.

Pflugiana. T. ( la Pflug ) alis fuscis , arcu communi dorsali anguloque ani niveis.

*Hab. Hafniæ. Dr. Pflug.*

*Desc.* Statura & magnitudo T. *Udmanianæ*. *Caput & thorax* fusca. *Alæ* fuscæ , arcu magno interne crassiori , communi anguloque ani niveis. *Posticæ* ad marginem crassiores strigæ aliquot obliquæ abbreviatæ , fere obsoletæ , argenteæ. *Posticæ* nigræ. *Subtus* cinerea.

Variegana. T. ( la variée ) alis albis , macula communi dorsali margineque postico fuscis.

*Wien. Verz.* 130. 6. phalæna variegana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Caput & thorax* alba , abdomine flavescente. *Alæ anticæ* macula communi in medio dorû fusca atomis nigris. Margo posticus fuscus , maculis obscurioribus.

Trapezana. T. ( la trapézoïde ) alis testaceis , macula communi dorsali cinerea , strigis testaceis.

*Hab. Hafniæ. Dr. Pflug.*

*Desc.* Statura præcedentium. *Caput* cinerascens. *Thorax* testaceus. *Alæ* testaceæ fere unicolores , macula magna dorsali cinerea & in hac strigæ abbreviatæ testaceæ. *Subtus* cinerea.

Ocellana. T. ( l'oculée ) alis pallidis, fascia bascos maculaque communi dorsali lituraque apicis fuscis.

Wien. Verz. 330. 7.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Parva. Corpus fuscum. Alæ anticæ pallidæ cinereæ, fascia lata bascos, macula communi versus posteriora lituraque in medio marginis postici fuscis. Costa punctis fuscis. Alæ posticæ fuscae.

Viburnana. T. ( de la viorne cotonneuse ) alis fusco-griseis nitidis immaculatis, posticis fuscis.

Wien. Verz. 128. 15. phalæna viburnana.

Hab. in viburno lantana. D. Schieffermyller.

Desc. Magna statura præcedentium. Caput & thorax fusca. Alæ fusco-griseæ, nitidulæ, immaculatæ; posticæ nigricantes, margine albicante.

Profundana. T. ( l'enfoncée ) alis cinereo fuscoque variegatis, macula communi dorsali alba.

Wien. Verz. 132. 1. phalæna profundana.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Magna. Affinis T. Brunichanæ, at alæ anticæ supra cinereo fuscoque variegatæ. Costa nigro punctata. Posticæ fuscae.

Jaquiniana. T. ( la Jaquin ) alis anticis aureis, macula dorsali communi punctisque costalibus albis.

Wien. Verz. 132. 4. phalæna Jaquiniana.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Parva. Alæ anticæ aureæ, macula magna communi albida. Costa albo punctata.

Trauniana. T. ( la Traune ) alis anticis nigricantibus ,  
macula communi dorsali flava.

*Wien. Verz.* 132. 3 phalæna Trauniana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Alæ anticæ* nigricantes, in  
medio macula magna communi flava,  
postice striga fere obsoleta aurea & in  
hac puncta quatuor costalia flava.

Woeberana. T. ( la Woeber ) alis fusco aureoque  
variis, costa strigis argenteis nume-  
rosis.

*Wien. Verz.* 126. 9. phalæna Woeberana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino T. *arcuanae*. *Alæ*  
*anticæ* strigis fuscis aureisque indis-  
tinctis contortuplicatis, apice macula  
obsoleta fusca, lineolis aureis. Costa  
strigis numerosis argenteis, nitidis.  
*Posticæ* fuscæ, margine interiori baseos  
albido.

Baro de *Woeber*, Jesuita, olim professor  
Theresianus, nunc pastor Viennensis.

Buoliana. T. ( la Buol ) alis anticis fulvis, strigis  
albis subreticulatis.

*Wien. Verz.* 128. 16. phalæna Buoliana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* *Alæ anticæ* fulvæ, strigis plurimis  
albidis, basi imprimis fere reticulatis,  
ultima distincta. *Posticæ* fuscæ.

Baro *Buol* Viennensis.

Decimana. T. ( la décimale ) alis anticis fulvis ar-  
genteo strigolis, fascia punctisque  
tribus flavis.

*Wien. Verz. app.* 300. phalæna deci-  
mana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Major. *Caput & thorax* fulva. *Alæ*

*antica* fulvæ, strigis quinque argenteis; secunda interrupta. Fascia lata flava ad basin. Maculæ duæ oppositæ flavæ in medio & quarta magna transversa ante apicem. *Postica* nigræ.

Beaumannia-T. ( la Beaumann. ) alis anticis flavis, fasciis duabus ferrugineis argento marginatis subanastomosantibus, posteriore interrupta.

Wien. Verz. 126 6.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Statura præcedentium. Caput & thorax ferruginea. Alæ anticae flavæ, fasciis duabus in medio fere anastomosantibus ferrugineis argento utrinque marginatis. *Postica* fuscæ.

Beaumann, senator Lipsiensis.

Variana. T. ( la mélangée ) alis anticis ferrugineo fuscoque variis, posticis fuscis apice fulvis.

Hab. Kiliæ. D. Daldorf.

Desc. Media. Alæ anticae fusco ferrugineoque variæ; posticæ fuscæ apice fulvæ. Subtus omnes fuscæ apice fulvæ.

Rufana. T. ( la rousse ) alis griseo-rufescentibus, macula marginali fusca punctoque medio albo.

Wien. Verz. 129. 8. phalæna rufana.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Magna in hoc genere. Caput & thorax fusca. Alæ anticae griseo-rufescentes, macula magna oblonga marginali fusca. In medio alæ punctum album, quod maculam fuscam attingit. *Posticæ* cineræ.

Roborana. T. ( du roure ) alis cinereis, maculis



duabus marginalibus testaceis, baseos minore.

*Hab. in Hafniæ quercu. D. de Sehestedt.*

*Desc.* Majuscula. *Caput* cinerem, antennis nigricantibus. *Thorax* cinereus, maculis tribus magnis ferrugineo-testaceis. *Alæ anticæ* obscure cinereæ, maculis duabus, altera baseos minore, altera media, triangulari testaceis. *Alæ* subtus dilutiores.

Saldonana. T. ( la Saldoner ) alis anticis virescentibus, vitta abbreviata flava, posticis atris, macula baseos albida.

*Hab. in Austria. D. Saldoner.*

*Desc.* Media. *Corpus* fuscum, abdomine apice cinereo. *Alæ anticæ* virescentes, vitta a basi ultra medium flavescente. *Posticæ* atræ, macula magna margineque albis. Subtus omnes atræ, macula margineque omni albis.

Gerningana. T. ( la Guerning ) alis rufescentibus, fasciis duabus obliquis fuscis, posteriore terminali.

*Wien. Verz.* 318. 23. phalæna Gerningana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis T. *oporana*. *Antennæ* pectinatae. *Alæ anticæ* rufescentes, fasciis duabus latis fuscis, anteriore in medio, posteriore marginali.

Rivagana. T. ( la barrée ) alis anticis griseis, strigis duabus mediis cinereis punctoque fulvo.

*Wien. Verz.* 130. 17. phalæna rivagana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Alæ* griseæ, mox obscuriores, mox punctis aliquot fuscis adpersæ; in medio strigæ duæ undatæ

cinereæ & inter has punctum parvum  
fulvum. *Posticæ* fuscæ.

Consperfana. T. ( la criblée ) alis anticis niveis ,  
maculis atomisque nigris sparsis.

*Wien. Verz.* 130. 14.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermiller.*

*Desc.* Magna. *Alæ anticæ* nivææ , ma-  
culis parvis atomisque innumeris ni-  
gris. *Posticæ* cinereæ. *Corpus* niveum.

Strigulana. T. ( la régulière ) alis anticis cinereis ,  
atomis numerosissimis fuscis.

*Wien. Verz.* 130. 15.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo omnino præ-  
cedentis , at *corpus* fuscum & *alæ*  
cinereæ , atomis fuscis.

Steinkelne- T. ( la Steinkelner ) alis anticis cinereis ,  
rana. linea flexuosa atra disci.

*Wien. Verz.* 130. 16.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. *Alæ anticæ* cinereæ , in  
medio disci linea magna flexuosa  
atra.

*Steinkelner* , Jesuita , olim professor The-  
resianus.

Niveana. T. ( la neigeuse ) alis anticis argenteis ,  
strigis duabus obliquis elevatis , mar-  
gine postico nigro punctato.

*Hab. in Suecia. D. de Paykull.*

*Desc.* Magna. *Corpus* album. *Alæ anticæ*  
argenteæ , strigis duabus obliquis e-  
squamis elevatis. Margo *alæ* posticus  
striga punctorum nigrorum. *Posticæ*  
supra fuscæ.

Cristana. T. ( la crête ) alis anticis fuscis , margine  
interiori

interiori albo punctoque medio fasciculato elevato.

*Wien. Verz.* 129. 10. phalæna cristana.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Magna. *Alæ anticæ* fuscae, margine tenuiori latè albo. In medio punctum album e fasciculo pilorum elevatorum fuscorum. *Posticæ* cinereæ. *Caput & thorax* albida.

Punctulana. T. ( la ponctuée ) alis anticis scabris fuscis, vitta media interrupta obscure cinerea.

*Wien. Verz.* 130. 13. phalæna punctulana.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Magna. *Caput & thorax* fusca. *Alæ anticæ*, punctis numerosis elevatis, sparsis, nigris, fuscescentes, vitta lata obscure cinerea in medio interrupta. *Posticæ* obscuræ.

Elevana. T. ( l'inégale ) alis anticis cinereis scabris, macula baseos fusca.

*Wien. Verz.* 130. 12. phalæna scabrana.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Magna. *Caput & thorax* cinerea. *Alæ anticæ* cinereæ, punctis elevatis sparsis, scabræ. Macula magna baseos fusca. *Posticæ* albidæ, immaculatæ.

Romanana. T. ( la Romain ) alis virescentibus albo scabris, lunula media atra.

*Hab. in Germania Australiori. D. Romanus.*

*Desc.* Affinis præcedenti. *Alæ anticæ* virescentes, punctis plurimis elevatis albis. In medio lunula magna atra. *Alæ posticæ* fusco-cinereæ. *Abdomen* cinereum, linea laterali fusca.

Borana. T. ( la fasciculée ) alis cinereo fuscoque variis , punctis elevatis nigris sparsis.

*Hab. in Suecia. D. Paykull.*

*Desc. Magna. Caput cinereum. Thorax fuscus, lobo antico cinereo. Alæ anticæ basi cineræ, striga e punctis fasciculatis elevatis nigris, apice fuscæ, macula magna ad angulum ani liturisque costalibus cinereis. Puncta plurima parva sparsa elevata atra. Subtus albidæ.*

Paykulliana. T. ( la Paykull ) alis albidis , macula triangulari communi baseos atra.

*Hab. in Suecia. D. Paykull.*

*Desc. Media. Corpus album. Alæ anticæ albidæ, macula magna baseos triangulari communi atra. Margo posticus fuscescit.*

Daldorfiana. T. ( la Daldorf ) alis anticis fuscis, apice aureis.

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc. Parva. Corpus fuscum, immaculatum. Alæ anticæ fuscæ, apice fulvæ sive aureæ, nitidæ. Posticæ, uti omnes subtrus, fuscæ, immaculatæ.*

Schumache- T. ( la Schumacherd ) alis anticis nigris, fascia media atomisque posticis albis.

*Hab. in Hafniæ nemoribus. D. de Schestedt.*

*Desc. Statura omnino T. Fabricianæ, at paullo major. Caput & thorax nigra. Alæ anticæ nigræ, fascia media parva sinuata atomisque plurimis posticis albis. Subtus fuscæ, punctis quatuor costalibus albis.*

Penkleriana. T. ( la Penkler ) alis anticis cinereo

fulcoque reticulatis, macula apicis  
fulco - grisea, strigis duabus argen-  
teis.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Corpus cinereum. Alæ  
anticæ fulco cinereoque subtilissime  
reticulatæ. In medio macula obscura  
annulis duobus fuscis. In apice macula  
magna grisea fusca, strigis duabus ar-  
genteis, quæ tamen marginem exte-  
riorem variegatum haud attingunt.*

*Penkler, baro Viennensis, in Theresiano  
studia & Entomologiam colens.*

**Bierkandra- T.** ( la Bierkandr ) alis fulco aureoque  
variis, strigis cinereis basi argento  
lineatis apice punctatis.

*Thumb. inf. Suec. 24. tab.*

*Tinea. Bierkandrella* alis fuscis nigro un-  
dulatis, punctis sparsis argenteis.

*Hab. in inula salicina Sueciæ. D. Paykull.*

*Desc. Statura & summa affinitas T. conwa-  
ganæ. Antennæ albo nigroque annulatæ.*

*Thorax aureus, linea laterali argentea.*

*Alæ basi aureæ, lineolis duabus argen-  
teis, tunc striga cinerea interne bifida,  
denique fulco-cinereo fulcoque variæ  
punctis argenteis numerosis. Caput &  
pedes alba, punctis fulco-argenteis;  
Abdomen fuscum.*

*Larva viridis, lateribus flavescens  
rete fabricat & metamorphosin saliens  
sub terra se condit.*

**Lipšana. T.** ( la Lipsicoise ) alis griseo - fuscis,  
puncto medio albo, pupilla atra.

*Wien. Verz. 129. 9. phalæna Lipšana.*

*Hab. Lipsiæ. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Alæ anticæ griseo-fuscæ,  
atomis paucis nigris. In medio alæ*



punctum orbiculatum album, pupilla atra. *Posticæ* cinereæ.

Abietana. T. ( du sapin ) alis fusco alboque variis ,  
margine exteriori albo punctata.

*Hab. in Sueciæ abiete. D. Pzykull.*

*Desc. Media. Caput & thorax fusca. Alæ anticæ* fusco alboque variegatæ ,  
*costa sola punctis distinctis albis.*

Undana. T. ( l'ondée ) alis fuscis , fasciis tribus  
cinereis , secunda extrorsum bifida.

*Wien. Verz. 131. 21. phalæna rivulata.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Affinis T. rivullanæ , at duplo minor  
& fascia secunda extrorsum bifida.*

Scopoliana. T. ( la Scopoli ) alis fuscis , arcubus  
duobus dorsalis albis.

*Wien. Verz. 129. 11. phalæna Scopoliana.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magna. Caput & thorax fusca. Alæ anticæ* ferrugineo-fuscæ. In medio arcus  
magnus dorsalis albus , & versus apicem alius magis cinereus minusque  
arcuatus. Litræ aliquot parvæ albidæ ad costam.

Mygindana. T. ( la Mygind ) alis anticis griseis ,  
strigis posticis fulvis.

*Wien. Verz. 131. 28. phalæna Mygindana.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Corpus cinereum. Alæ anticæ* cinereæ , pone medium strigis aliquot  
distinctis fulvis. *Posticæ* obscure cinereæ.

Tripunctana. T. ( la triponctué ) alis anticis fuscis  
apice albis , margine punctisque tribus  
distinctis fuscis.

*Wien. Verz. 131. 35. phalæna tripunctana.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Statura omnino *T. cynosbancæ*. *Alæ*  
*anticæ* basi fuscæ, apice albæ, mar-  
 gine tamen postico fusco. Ante mar-  
 ginem interne. maculæ duæ fuscæ &  
 inter has & marginem puncta tria  
 fusca.

Mitterba- T. ( la Mitterbach ) alis fusco rufo-  
 chiana. que variis, striga dorsali abbreviata  
 alba.

*Wien. Verz.* 129. 17. phalæna Mitterba-  
 chiana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Parva. *Alæ anticæ* fusco-rufæ. In  
 medio striga communis dorsalis abbre-  
 viata alba. Margo exterior & posticus  
 albo liturati.

Mediana. T. ( la bimaculée ) alis fuscis, maculis  
 duabus flavis.

*Wien. Verz.* 128. 14.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Parva. *Corpus* fuscum. *Alæ ant cæ*  
*fuscæ*, macula magna oblonga baseos  
 ad marginem interiorem & alia versus  
 apicem orbiculata flavis. *Posticæ* nigri-  
 cantes.

Achatana. T. ( l'agathe ) alis anticis fuscis apice  
 cinereis, maculis duabus ferrugineis.

*Wien. Verz.* 131. 27. phalæna achatana.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Media. *Caput & thorax* fusca. *Alæ*  
*anticæ* basi fuscæ immaculatæ, apice  
 cinereæ, maculis duabus magnis fer-  
 rugineis, altera ad marginem tenuio-  
 rem ante apicem, altera in ipso apice  
 marginis crassioris. *Costa* albo punc-  
 tata. *Posticæ* cinereæ.

**Boeberana. T.** ( la Boéber ) cinerea , alis depresso , disco communi baseos atro.

*Linn. Syst. nat.* 2. 288. 374. *in Suec.* 1377. phalæna nifella alis superioribus cinereo nebulosis , macula communi ovata nigra.

*Hab. in Daniæ quercu. D. Lund.*

*Desc.* Statura & magnitudo *T. applanæ*. *Antennæ* albo nigroque annulatæ. *Caput* & *thorax* cinerea , immaculata. *Alæ anticæ* a basi ultra medium interne nigræ , margine exteriori cinereo , apice cinereæ margine obscuriore. *Corpus* cinereum , pedibus nigricantibus.

**Populana. T.** ( du peuplier ) alis anticis fuscis , apice auro argentoque strigosis , macula dorsali alba , puncto fusco.

*Hab. in Sueciæ populo. D. Paykull.*

*Desc.* Affinis *T. Jaquinianæ* videtur. *Corpus* fuscum. *Alæ anticæ* basi cinereo-fuscæ , immaculatæ ; in medio dorsi macula magna communis triangularis alba , puncto medio fusco ; apice auro argentoque strigosæ , punctis costalibus albis.

### *Tinea.*

**Gigantella. T.** ( la teigne-géant ) alis anticis cinereo flavescens , posticis albis immaculatis.

*Wien. Verz.* 135. 27. tinea gigantella.

*Hab. in Austria. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna in hoc genere. *Palpi* porrecti. *Caput* & *thorax* flavescens. *Abdomen* cinereum. *Alæ anticæ* cinereo flavescens , immaculatæ. *Posticæ* albæ.

Centuriella. T. ( l'entourée ) alis oblongis cinereis fusco subfasciatis, macula flavescente.  
*Wien. Verz.* 319. 63. tinea centuriella.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura T. *sociellæ*, at paullo minor. *Alæ* cinereæ, litura marginali in medio fusca, postice fascia una alterave fusca & in hac macula magna flavescens. *Posticæ* cinereæ, margine fusco.

Plumbella. T. ( la plombée ) alis anticis plumbeis, macula media punctis numerosis apiceque fuscis.

*Wien. Verz.* 139. 34. tinea plumbella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Nimis affinis T. *padellæ*. Differt tamen alis puncto medio majori distincto & apice fuscis.

Nitidella. T. ( la brillante ) alis anticis argenteis, lineola baseos arcuque communi dorsali fuscis.

*Wien. Verz.* 137. 58. tinea nitidella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva statura T. *cornellæ*. *Alæ anticæ* argenteæ nitidæ, lineola baseos lunulaque communi fuscis.

Roscida. T. ( la régulière ) alis luteis, anticis nigro punctatis, posticis maculatis, thorace atro.

*Wien. Verz.* 68. 7. noctua roscida.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis T. *irrorellæ*, at duplo minor. Corpus totum atrum, ano solo fulvo. *Alæ anticæ* trifariam nigro punctatæ, maculis marginalibus fuscis.

Pastulella. T. ( la pointillée ) alis anticis atris , punctis ferrugineis flavisque numerosis.

*Cram. inf.* 31. tab. 372. fig. L. phalæna punctella.

*Hab.*

*Desc.* Alæ posticæ pallescentes , limbo nigro.

Perlella. T. ( la perlée ) alis cinereis , puncto medio strigae punctorum abbreviata nigris.

*Hab.* in Austria. D. Schieffermyller.

*Desc.* Statura & magnitudo T. lutarellæ.

Alæ omnes supra pallide cinereæ , puncto nigro in medio versus marginem interiorem , & pone hoc striga obliqua e punctis quatuor nigris , quæ tamen marginem tenuiorem haud attingit.

Guttella. T. ( l'étoilée ) alis atris , anticis punctis albis numerosis.

*Sp. inf. app.* 509.

*Wien. Verz.* 319. 60. tineæ antracinelæ.

*Hab.* in Europæ cedo acri.

*Desc.* Antennæ pedinatæ.

Vinetella. T. ( des vignobles ) alis anticis fuscis , lineolis tribus argenteis , intermedia longiori interrupta.

*Hab.* Dresdæ. Mus. D. Romani.

*Desc.* Statura omnino T. pinetellæ. Palpi valde porrecti , longitudine thoracis.

Alæ fuscae , lineis tribus aut quatuor argenteis. Posticæ tenuissimæ , nigrae , valde fimbriatæ.

Argyrella. T. ( la riche ) alis striatis argenteis fusco nitidulis.

*Wien. Verz.* 135. 28. tineæ argyrella.

*Hab.* in Austria. D. Schieffermyller.



*Desc.* Magna. Caput & thorax argenteo nitida. Abdomen cinereum. Alæ argenteæ fusco-nitidæ. Posticæ cinereæ.

Margaritella. T. ( la tranchée ) alis fuscis , linea unica albissima.

*Wien. Verz.* 134. 5.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino T. culmellæ ; differt tamen alis anticis linea unica , sive vitta læte alba postice latiore. Posticæ cinereæ.

Conchella. T. ( l'interrompue ) alis anticis fuscis , linea unica interrupta albissima.

*Wien. Verz.* 134. 6. tinea conchella.

*Hab. in Austria Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Affinis omnino præcedenti , at linea albissima in medio interrupta maculas duas format fere uti in T. pinetella. Alæ posticæ cinereæ.

Falsella. T. ( la confuse ) alis anticis fusco albo-que variegatis , posticis cinereis.

*Wien. Verz.* 134. 16.

*Hab. in Saxonia. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Caput & thorax cinerea. Abdomen fuscum , nitidulum. Alæ anticæ , striis fuscis albisque indistinctis , abbreviatis. Posticæ cinereæ , immaculatæ.

Tristella. T. ( la triste ) alis anticis griseo - fuscis , immaculatis.

*Wien. Verz.* 134. 17. tinea tristella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcedentium. Corpus , uti alæ anticæ , griseo-fuscæ , immaculatæ. Posticæ cinereæ.

Daphnella. T. ( du garou ) alis anticis cinereis ,

costa inæqualiter purpurascente punctisque mediis atris.

*Wien. Verz.* 136. 37. tinea daphnella.

*Hab. in Austria daphne. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magna. Caput & thorax albida, Alæ anticæ cinereæ, costa inæqualiter purpurascente. In medio litura fusca punctis duobus subocellaribus atris, exteriori minuto. Margo posticus atropunctatus. Posticæ cinereæ.*

*Mucronella. T. ( la pointue )* alis lanceolatis cinereis, vitta fusca.

*Wien. Verz.* 136. 45. tinea mucronella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magna. Palpi porrecti. Corpus cinereum. Alæ anticæ lanceolatæ, acuminatæ, cinereæ, vitta lata fusca ante marginem anteriorem. Posticæ exalbidæ.*

*Maurella. T. ( la More )* nigra, alis anticis atris nitidulis.

*Wien. Verz.* 142. 11. tinea maurella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magna. Corpus nigrum. Alæ anticæ atræ, nitidulæ, immaculatæ.*

*Anella. T. ( l'annulaire )* alis anticis griseis, vitta obsoleta ferruginea punctisque duobus centralibus subocellatis.

*Wien. Verz.* 135. 30. tinea anella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Magna. Caput & thorax cinerea, immaculata. Abdomen ferrugineum. Alæ anticæ griseæ, costa obscuriore. Vitta obsoleta ferruginea ante costam & in medio puncta duo albida annulo fusco cincta. Posticæ cinereæ.*

Fagella. T. ( du hêtre ) alis anticis griseis , strigis atomisque fuscis.

Wien. Verz. 134. 34. tineæ fagella.

Hab. in Austria fago sylvatica. D. Schieffermyller.

Desc. Major. Mas alis griseis, striga antica posticaque punctisque mediis fuscis.

Femina alis anticis lanceolatis obscurioribus fusco irroratis.

Palumbella. T. ( la cendrée ) alis anticis cinereis , fasciis duabus ferrugineis nigro marginatis.

Wien. Verz. 138. 15. tineæ palumbella.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Magna. Corpus griseum. Alæ anticæ cineræ , fasciis duabus cinereis , quarum anterior punctis duobus in medio strigaque postica notata , posterior antice striga undata marginata. Posticæ cineræ.

Abietella. T. ( du sapin ) alis anticis fuscescentibus , strigis duabus lunulaque media pallida.

Wien. Verz. 138. 16. tineæ abietella.

Hab. in Austria abiete. D. Schieffermyller.

Desc. Statura magna præcedentis. Corpus griseum. Alæ anticæ fuscescentes , strigis duabus undatis pallidis , quarum posterior antice nigro marginata. In medio lunula pallida. Margo posticus nigro punctatus. Posticæ cineræ.

Tetricella. T. ( la sombre ) alis griseo-fuscis nitidulis immaculatis.

Wien. Verz. 138. 22. tineæ tetricella.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Magna. Alæ omnes fusco nitidulæ , immaculatæ.

Flavifrontel- T. ( le front-jaune ) alis anticis fusco-cinereis immaculatis , capite flavo.

*Wien. Verz.* 143. 22. tinea flavifrontella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Magna. Caput flavum. Thorax & alæ anticae cinerae , immaculatae. Posticae albidæ.

Hemedactyl- T. ( la demi-dactyle ) alis linearibus pallide testaceis , rufo irroratis.

*Wien. Verz.* 124. 41. tinea hemedactyl-  
lella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. Statura præcedentium. Alæ lineares ; anticae testaceæ apice rufescentes ; posticae fusca.

Funerella. T. ( la coquette ) alis nigris , margine tenuiori basi albis , punctis duobus nigris.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. Alæ anticae nigrae , margine interiori ultra medium albo , punctis duobus nigris distinctis. Macula alba in medio marginis exterioris. Posticae nigrae basi albæ. Caput album , puncto verticis nigro. Thorax albus , punctis tribus anticis nigris.

Striatella. T. ( la striée ) alis griseo-fuscis , anticis albo lineatis , posticis ciliatis immaculatis.

*Wien. Verz.* 135. 26. tinea striatella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. Caput & thorax nivea. Alæ obscure griseæ , linea longitudinali alba a basi fere ad apicem ducta ; alia obliqua brevis ad basin aliaque ad apicem. Posticae pilis longioribus ciliatæ , fusca , immaculatae.

**Pectinella.** T. ( la pectinée ) alis cinerascens, arcu punctoque dorsalis albidioribus.

*Hab. in Suecia. D. Paykull.*

*Desc. Alæ cinerascens, nitidæ, lunula media punctoque postico communibus albidis.*

*Fæmina magis obscura.*

**Tripunctella.** T. ( la triponctée ) alis cinereis, punctis disci tribus fuscis.

*Wien. Verz. app. tinea tripunctella.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Alæ anticæ cineræ, nitidæ, punctis disci tribus fuscis 2, 1. Margo posticus nigro punctatus. Posticæ pallidiores. Caput, thorax anusque ferruginea.*

**Cuspidella.** T. ( les croissants ) alis anticis atris, lunulis duabus punctoque flavescens.

*Wien. Verz. 140. 53. tinea cuspidella.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Media. Corpus atrum, thoracis margine antico flavescens. Alæ anticæ atræ, lunula basos & apicis flavis & in posteriori hac punctum flavum. Posticæ valde ciliatæ nigræ.*

**Dimidiella.** T. ( la partagée ) alis anticis fuscis, disco flavo, puncto subocellari atro.

*Wien. Verz. 141. 73.*

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc. Parva. Caput & thorax flava. Abdomen fuscum. Alæ anticæ fuscæ, disco flexuoso flavo postice marginem anteriorem attingente. Punctum parvum subocellatum atrum in medio alæ.*

**Muscalella.** T. ( la fulvicéphale ) alis fuscis, maculis



duabus dorsalibus albis, capite fulvo;  
antennis pectinatis.

*Wien. Verz.* 143. 28. tinea muscalella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Caput* fulvum, antennis pectinatis fuscis. *Alæ* fuscae, maculis duabus communibus albis, anteriore majore. Punctum parvum ad marginem anteriorem.

**Bifasciella. T.** ( la bifasciée ) alis fusco nitidulis, fasciis duabus albis, posteriore interrupta, capite rufo.

*Hab. in Dania. D. de Schestedt.*

*Desc.* Media. *Caput* rufum. *Alæ anticae* fuscae, nitidae, fasciis duabus albis, anteriore ad marginem crassiorē dilatata, posteriore & maculis duabus oppositis composita. *Posticae* cinereae, immaculae.

**Rupella. T.** ( la ruficéphale ) alis fusco-aureis, maculis quatuor marginalibus albis, capite rufo.

*Wien. Verz.* 320. 45. tinea rupella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Caput* rufum. *Alæ* fusco-aureae, maculis quatuor magnis albis, duabus ad marginem anteriorem, duabus ad posteriorem.

**Prælatella. T.** ( la violette ) alis violaceis, striga punctisque duobus oppositis albis.

*Wien. Verz.* 320. 46. tinea prælatella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura præcæcis. *Alæ* violaceae nitidulae, striga media maculis duabus versus apicem oppositis albis. *Caput* ferrugineum.

**Dénifella. T.** ( la bariolée ) alis fuscescentibus, lineolis fasciæque albis.

*Wien. Verz.* 138. 23. tinea denifella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura omnino T. *Geoffroyellæ*.

*Palpi* magni recurvi, albi, margine fusco. *Alæ anticæ* pallide fuscae, lineolis duabus baseos, in medio fascia lata ad marginem crassiolem late bifida & versus apicem striga obliqua abbreviata albis. *Posticæ* nigricantes, immaculatæ.

**Tunbergella. T.** ( la Tunberg ) alis auratis, maculis fasciæque media purpureis.

*Hab. Kiliæ. D. Daldorf.*

*Desc.* Parva. *Corpus* nigrum. *Antennæ* breves, nigrae. *Alæ anticæ* aureæ, nitidæ. Maculae duæ purpureæ ante medium ad marginem crassiolem. In medio fascia lata purpurea ad marginem crassiolem bifida, versus apicem denique adhuc macula purpurea. *Alæ posticæ* auratæ, immaculatæ.

**Fibulella. T.** ( l'éclatante ) alis rubro-aureis, macula communi flava.

*Wien. Verz.* 143. 33. tinea fibulella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Minuta. *Caput*, cum antennis brevibus, nigrum. *Alæ anticæ* rubro-aureæ, nitidæ, macula magna communi flava.

**Exiguella. T.** ( la petite ) alis anticis fusco cinereoque griseis, striga alba.

*Wien. Verz.* 141. 21. tinea exiguella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Minuta.

Alpella. T. ( la montagnarde ) alis flavis , maculis olivaceis.

Wien. Verz. 135. 21. tineæ alpella.

Hab. in Austriæ montosis. D. Schieffermyller.

Desc. Statura omnino T. lucellæ. Caput & thorax flava immaculata. Alæ anticæ flavæ , maculis aliquot olivaceis. Costa punctata. Posticæ cineræ.

Nyctemerella. T. ( la découpée ) alis anticis niveis , vitta communi dorsali dentata maculisque costalibus atris. Aluc. 9.

Wien. Verz. 130. 38. tineæ nyctimerella.

Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Caput & thorax alba. Alæ anticæ nivæ , vitta dorsali dentata atra costaque atro maculata , ad basin litura , in medio macula magna puncto albo , tunc macula transversa fere geminata & tandem lineola apicis. Posticæ fusæ.

Betulinella. T. ( de l'agaric du bouleau ) alis albidis apice fusco variis.

Hab. in bolito betulino Sueciæ. D. Paykull.

Desc. Statura omnino T. granellæ , at duplo major. Caput & thorax albida. Alæ posticæ adscendentes basi albidæ , apice variegatæ. Aluc. 13.

Perficella. T. ( du pêcher ) alis anticis emarginatis sulphureis , strigis abbreviatis obscurioribus.

Wien. Verz. 319. 67. tineæ perficella.

Hab. in Austriæ persica. Mus. D. Schieffermyller.

Desc. Statura & magnitudo T. asperellæ. Caput & thorax flava Abdomen cinereum. Alæ anticæ apice emarginatæ sulphuræ ,

fulpureæ, strigis duabus abbreviatis  
marginis tenuioris obscurioribus. *Pos-  
tica* cineræ, ciliis albis. *Aluc.* 16.

Enzenber- T. ( l'Enzenberg ) alis emarginatis fuscis ;  
gella. vitta media argentea.

*Hab.* in Austria. *D. Saldoner.*

*Desc.* Media. *Palpi* porrecti. *Alæ* angustæ ;  
fuscae, vitta media argentea, quæ tamen  
marginem posticum haud attingit. In  
vitta hac lineolæ aliquot fuscae. Margo  
posticus alæ emarginatus. *Postica* cine-  
ræ, immaculatæ. *Aluc.* 22.

Pilella. T. ( la brune ) alis fuscescentibus imma-  
culatis, antennis longissimis.

*Wien. Verz.* 142. . tinea pilella.

*Hab.* in Austria. *Mus.* *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo T. *Swam-  
merdammellæ.* *Antennæ* albidæ, basi  
flavescentes. *Aluc.* 24.

Erxlebella. T. ( l'Erxlebell ) antennis mediocribus  
unicoloribus, alis anticis fusco-aureis,  
posticis nigris, capite fulvo.

*Hab.* Goettingæ. *Dr. Schulz.*

*Desc.* Nimis affinis videtur T. *calthellæ.*  
*Antennæ* mediocres, pallefcentes. *Caput*  
fulvum. *Thorax* & *alæ* anticæ fusco-  
aureæ, margine postico obscuriore.  
*Pedes postici* longiores, fulvi. *Aluc.* 27.

Promulella. T. ( la bordée ) antennis mediocribus,  
alis anticis fusco-aureis, posticis fla-  
vis, margine nigro.

*Wien. Verz.* 1 2 17. tinea promulella.

*Hab.* in Austria. *Mus.* *D. Schieffermyller.*

*Desc.* Statura & magnitudo T. *calthellæ*,  
distincta alis posticis flavis margine  
nigro. *Aluc.* 29.

Vindella. T. ( l'albicorne ) alis viridi-aureis , corpore atro , antennis longis albis.

*Wien. Verz.* 142. 4. tinea vindella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Vix fatis a T. *Reaumurella* distincta. *Aluc.* 33.

Cuprella. T. ( la cuivreuse ) alis cupro-aureis nitidis , antennis longissimis.

*Wien. Verz.* 320. 44. tinea cuprella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Vix fatis distincta a T. *Reaumurella*. Differt tantum alarum colore rubro cupreo. *Aluc.* 35.

Formosella. T. ( la jolie ) alis anticis ferrugineo-flavis , strigis duabus abbreviatis obliquis albis , posteriore majore.

*Wien. Verz.* 140. 47. tinea formosella.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Media. *Alæ anticæ* flavo ferrugineoque variæ. *Strigæ* duæ ad marginem crassiorem abbreviatæ , obliquæ posteriore majore. *Posticæ* fuscæ. *Antennæ* albo annulatæ. *Aluc.* 39.

Festiculla. T. ( la leucocéphale ) alis anticis albis , maculis duabus fuscis apice flavis.

*Wien. Verz.* 319. 80. tinea festiculla.

*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*

*Desc.* Parva. *Palpi* albi basi fusci. *Caput* niveum. *Alæ anticæ* fere lineares basi albæ , apice flavæ ; in medio maculæ duæ fuscæ annulo albo cinctæ , una pone alteram. *Posticæ* fuscæ.

#### *Alucita.*

Calodactyla. A. ( la calodactyle ) alis fissis fuscis , anticis subfalcatis fissis fulvo maculatis , posticis tripartitis.



*Wien. Verz.* 146. 4. alucita calodactyla.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Statura præcedentium. *Alæ anticæ*  
 cinereo - fuscae, apice obscuriores,  
 macula magna fulva. Margo interior  
 dentatus, posticus fissus. *Posticæ* tripar-  
 titæ nigræ. *Pedes* albo annulati.

Rhododac- A. ( la rhododactyle ) alis fissis flavesc-  
 tyla. centibus, strigis albis, anticis bifidis,  
 posticis tripartitis.

*Wien. Verz.* 146. 5. alucita rhododactyla.  
*Hab. in Saxonie rosas. D. Zschuck.*  
*Desc.* *Alæ anticæ* flavæ basi obscuriores,  
 strigis duabus albis, anteriore obliqua,  
 usque ad strigam posteriorem fissæ.  
*Posticæ* tripartitæ, lobis duobus ante-  
 rioribus flavescens, tertio albo  
 macula magna ante apicem ferruginea.  
*Corpus* ferrugineum, *thoracis* lateribus  
 flavescens.

Migadactyla. A. ( la migadactyle ) alis fissis albidis  
 fusco maculatis, anticis fissis, posticis  
 tripartitis.

*Wien. Verz.* 146. 8. alucita migadactyla.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Statura præcedentium. *Corpus* al-  
 bum. *Alæ anticæ* albidæ fusco macu-  
 latæ; *posticæ* fuscae. *Pedes* albi, fusco  
 maculati.

Ochrodactyla. A. ( l'ochrodactyle ) alis patentibus li-  
 nearibus indivisis, anticis griseis,  
 posticis nigris.

*Wien. Verz.* 145. 1. Alucita ochrodactyla.  
*Hab. in Austria. Mus. D. Schieffermyller.*  
*Desc.* Parva *Abdomen* basi rufescens. *Alæ*  
 immaculatæ.

## NEUROPTERA.

*Libellula.*

Depressa. 5. L. *Obs.* Larva in humo spongiosa impalpabili lutosa degens tardigrada, ore bivalvi, valvis virescentibus, rostro inflexo maxilloso, abdomine trigono, subtus fulvescente, pedibus ciliatis. Scop.

Grandis. 9. L. *Obs.* Quisquis sua specimina aliter describit & qualibet icone singulare quid, nec cæteris proprium observatur. Interdum larva eadem, nascendi tempus idem unaque semper & eadem proportio partium. Specimen nostrum exacte denunciens descriptio nulla hucusque data, cum tamen abdomen gerat attenuatum ex lato principio ut L. *quadrimaculata*, thoracem abdomini concolorem hirsutumque, ut L. *grandis*, maculasque flavas abdominales, ut L. *forcipata*; unde ego sane judico species spurias in hoc genere vel admixtas fuisse, vel earum historiam de novo inchoandam, cum differentia a coloribus petita non sufficiant. Scop.

*Myrmeleon.*

Libelluloides. 1. M. *Obs.* Nostra specimina Brutia ad figuram D. de Geer. & magnitudinem figuræ D. Sulzers æquant, colore autem diversa sunt; nam alæ hyalinæ nigro punctatæ & maculatæ sunt. Corpus nigrum, hirsutum totum, cauda forcipata, unde nisi novam constituent speciem, pro insigni saltem varietate habenda. D. Vincent Petagn. speciem insect. Ulter. Calabr. n. 149.

Barbarum. 5. M. *Obs.* 1°. Variat 1°. maculis flavis;  
2°. maculis cæruleis loco flavarum;  
3°. maculis albis.

*Obs.* 2°. In omnibus corpus totum nigrum  
hirsutum, cauda forcipata. *Antennæ*  
nodosæ, porrectæ, longæ, clavatæ,  
clava suborbiculata truncata, cyathi-  
formi. *D. Vincent. Petagn. p.* 30.

Italicum. 6. M. Delendum. In nova enim *Mantiss.*  
*Ascalaphus italicus myrmeleon longi-*  
*corn. synon.*

*Raphidia.*

Mantispa. 2. M. *Obs.* Ex hoc genere raphidiam  
mantispaam rejecit *D. Fab.* & ad mantis  
genus transtulit.

H Y M E N O P T E R A.

*Tenthredo.*

Punctata. 93. T. *Desc.* Corpus cæruleo - nigrum. *An-*  
*tennæ* nigræ. *Abdomen* nigrum, primo  
& ultimo segmento flavo in medio  
maculatis. *Mas.*

Bifasciata. 94. T. *Desc.* Caput labiumque superius nigra.  
*Antennæ* basi flavæ. *Thorax* lineolis  
duabus luteis. *Abdomen* nigrum, fasciis  
duabus luteis; *subtus* flavum. *Pedes*  
flavi, genubus nigris. *Postici* nigri.

Trifasciata. 95. T. *Desc.* Præcedenti affinis. Nigra.  
*Thorax* lineis duabus flavis ante alarum  
ortum. *Abdomen* nigrum, primi,  
quinti, sexti, ultimi marginibus flavis.  
*Alæ* fuscæ. *Pedes* lutei, *posteriorum*  
genubus tarsisque nigris.

Virgata. 96. T. Desc. *Antennæ* nigræ, articulis primis duobus luteis. *Caput* nigrum. *Thorax* niger, macula flava utrinque ante alas. *Alæ* fuscæ, margine exteriori incrassato. *Abdominis* segmenta 2, 3, 5, omnino nigra. *Pedes* lutei, *tarsis femoribusque* inferne nigris.

*Sirex.*

Juvenus. 3. S. Obs. Variat antennis nigris & flavis. *Schæff. icon. t. 305. f. 3. urocerus.*

Camelus. 4. S. Obs. Variat antennis nigris thoraceque longioribus: *marem* forsan descripsit *Linn. Fæminæ* aculeus corpore toto longior.

*Ichneumon.*

Sugillatorius. 1. I. Variat pedibus totis nigris.

Mandator. 134. I. An diversus ichn. *mandator* *Linn. ?*

Fuscicornis. 266. I. Obs. Hæc species sequentesque apteræ vel saltem fœmima aptera, inde citationes duplicantur.

Compressus. 1. ( le comprimé ) ater, abdomine compresso segmentorum marginibus flavis, antennis pedibusque luteis.

*Hab. in Suecia.*

Desc. Affinis ichn. *variegator*. *Antennæ* flavæ, articulo primo ultimisque nigris. *Caput & thorax* atra, immaculata. *Abdomen* compressum, breve, atrum, segmentorum marginibus flavescens. *Alæ* albidæ. *Pedes* lutei, *femoribus* omnibus basi, *posticis* totis nigris. *M. app.*

*Sphex.*

Clavipes. 2. *S. Obs.* Synonymia *D. Fab.* forsan delenda, species enim. *Desc. n.* 20, diversa videtur.

Gibba. 13. *S. Obs.* Nomen triviale mutandum, ne confundatur cum sph. *gibba* Linn. Lege *cingulata*, le *Mandarin*.

Clypeata. 34. *S. Variat* fasciis tribus abdominis interruptis & integris.

Gibba. 40. *S. Obs.* Nimis affinis sph. *fuscæ*.

4-Maculata. *S.* ( le quadrimaculé ) hirta nigra, abdomine maculis quatuor fuscis.

*Drury. inf. 2. t. 39. f. 2.*

*Vincent. Petagn. n. 160.*

*Hab. in America Boreali. In Ulter. Calab. Vincent. Petagn.*

*Desc. Caput & thorax atra, pilis rarioribus hirta. Alæ fuscæ, violaceo colore nitentes. Abdomen oblongum, segmento secundo tertioque maculis duabus magnis, orbiculatis, flavis. Margines segmentorum ciliati.*

*Obs. 1. Cum hac specie convenit D. Vincent. Petagn. specimen, diversum tantum macularum colore qui in suo flavus est.*

*Obs. 2. Ex Massilia nobis missa, sed exotica visa fuit. V.*

2-Maculata. *S.* ( le bimaculé ) hirta atra, abdomine maculis duabus luteis, antennis flavis.

*Vincent. Petagn. n. 161.*

*Hab. in America Boreali M. D. Yeats. In Ulter. Calabr.*

*Desc. Antennæ flavæ, primo articulo*



nigro. *Corpus* hirtum, nigrum; maculæ duæ glabræ, luteæ in tertio abdominis segmento. *Alæ* apice fuscæ.

*Obs.* Nostrium specimen huic apprime respondet tantumque maculæ in nostro fulvæ sunt. *Alæ* fuscæ, violaceo colore nitentes.

*Chrysis.*

*Ænea*. C. ( la bronzée ) glabra ænea nitida, pedibus antennisque fuscis. *M.* 15.

*Hab.* Halæ-Saxonum. *D.* Hybner.

*Desc.* Statura parva omnino *C. aurata*, at tota ænea nitida, *antennis pedibusque* fuscis. *Alæ* apice fuscæ.

*Vespa.*

*Vulgaris*. 2. *V. Variat.* Rarius minor, *scutello* bipunctato.

*Gallica*. 5. *V. Pedes* flavi, *femoribus* nigris.

*Coarctata*. 8. *V. Abdomen* nigrum, segmentis margine flavis, primo secundoque bipunctato.

*Bifasciata*. 11. *V. Aliam* simillimam vidit *Hafniæ D. Fab.* at labio, punctis duobus anticis, *thoracis* lineolaque transversa *scutelli* flavis. *Pedes* ferruginei.

*Apis.*

*Centuncularis*. 4. *A. Schæff. icon*, t. 252. f. 6, 7.

*Terrestris*. 95. *A. Schæff. icon.* t. 251. f. 7.

*Soroeentis*. 109. *A. Schæff. icon.* t. 251. f. 6.

*Mutilla.*

Brutia. II. M. ( la Brutienne ) nigra , thorace rufo , abdomine maculis sex cinguloque albo argenteis. *D. Vincent. Petagn. inf. speciem. tab. f. xxxviii.*

*Hab. in Europa. In Ulteriore Calabria.*

*Desc. Apter. Corpus vespa vulgari majus , nigrum , hirsutum. Antennæ capite longiores , bicolores. Thorax parallelipedus rufus , antice niger. Abdomen conicum , primo secundoque segmento maculis tribus tertioque cingulo albo argenteis , segmentis postremis subtus albicantibus.*

Littoralis. 12. M. ( la maritime ) nigra , thorace rufo , abdomine antice macula biloba alba , segmentorum quinque posticorum marginibus albis. *Ibid. f. xxxvii.*

*Hab. in Europa. In Ulteriore Calabria.*

*Desc. Apter. Corpus præcedenti minus nigrum , hirsutum. Caput nigro-testaceum. Maxillæ porrectæ nitidæ uti & oculi. Antennæ subulatæ testaceæ , capitis longitudine. Thorax rufus parallelipedus Abdomen conicum , antice macula biloba alba marginibusque quinque posticorum segmentorum fascia alba. Pedes testacei. Magnitudo speciminum varia , forte varietas sexus ; affinis M. *Europææ* , sed diversa species.*

## DIPTERA.

*Tipula.*

Rufipes. 50. T. *Obs. Desc. Faun. Suec. omnino concurrit , at magnitudo T. plumosæ.*

Thomæ. 63. T. Schæff. icon. t. 209. f. 6. 7.

*Musca.*

Hypoleon. 6. M. Fab. stratiomys 12. scutello bidentato flavo, corpore nigro flavo variegatur.

Geoff. inf. paris. tom. 2. p. 481. n. 10. stratiomys atra, thorace abdomineque maculis flavis.

Scop. 912. musca rara.

Schæff. icon. t. 14. f. 15.

Obs. Musca hæc in D. Fab. speciebus enunciata fuit, sed synonymiam non memoraveram. V.

Diadema. 18. M. Obs. Varietas e Dania duplo major accepta, at vix distincta.

Mutica. 45. M. Eadem quæ n. 21 describitur; prima igitur delenda est.

Gibbosa. 98. M. Schæff. icon. t. 200. f. 1.

Maculata. 153. M. Antennis plumatis cinerea, thorace abdomineque maculis numerosis nigris.

Obs. Musca hæc sub nomine M. vulpina in speciebus D. Fab; sed separavit has species in M. nov. nomen triviale Linn. conservavit; musca igitur vulpina species diversa.

Vulpina. M. ( la rusée ) antennis plumatis, thorace lineato, abdomine ferrugineo, nigro maculato.

Hab. in Europa Boreali.

Desc. Frons nigra, oculorum orbita argentea. Thorax pilosus, ater, lineis quatuor longitudinalibus cinereis. Scu-

*tellum* nigrum , margine ferrugineo.  
*Abdomen* ferrugineum , maculis plurimis nigris sparsis anoque cinereo punctis duobus nigris ; *subtus* nigrum , lateribus ferrugineis. *Alæ* subfuscae. *Pedes* nigri.

Cæmeterio- 200. M. Antennis fetariis nigro - ænea ,  
 rum. abdomine depresso atro nitido , alis nigricantibus M. syrph. 59. musc. spec. 39. quid ?

Serrata. 204. M. *Variat* in Suecia duplo minor.  
 D. Paykull.

Nobilitata. 215. M. *Schæff.* icon. t. 26. f. 5.

Colombas- M. ( la pestiférée ) atra , abdominis incisuris tibiis tarsisque albis.

*Pall. itin. app.* 23. bibio fanguinaris.

*Griff. itin.* Oestrus.

*Hab.* in Servia , Bannatu in initio veris & sub fine æstatis copiosissima provincens , obruit pecora & intrat partes nobiles venenatoque morfu intra 4, 5, horas ea enecat. Arcetur fumo.

*Desc.* Culice pipiente duplo minor. *Corpus* nigrum. *Abdomen* incisuris albidis. *Femora* nigra , tibiis tarsisque albidis. *Rhag.* 15. Mant.

### *Tabanus.*

Maustellatus. 18. T. An Mauritanus *Syst.* ?

*Linn. Desc.* *Corpus* mediæ magnitudinis.

*Rostrum* porrectum , longitudine fere corporis. *Oculi* unicolores , nigro-subcærulecentes. *Antennæ* ferrugineæ. *Thorax* niger , pilis testaceis. *Abdominis* segmentum , a minimum nigrum ;

*b* ferrugineum, macula in medio nigra;  
*c-h* nigrum, margine postico testaceo.  
*Alæ* hyalinæ, maculis variis fuscis.  
*Pedes* ferruginei.

*Conops*.

*Aculeata*. 6. *C. Obs. Schæff. icon. t. 228. f. 8.*

*Afilus*.

*Barbarus*. 2. *A. Obs. Femora nigra.*

*Teutonus*. 6. *A. Obs. Pedes rufi, apicibus nigris.*

*Nigerrimus*. *A. ( le charbon ) totus ater glaber,*  
*alis nigris, costa atra.*

*Hab. in Europa.*

*Desc.* Nihil in hoc insecto alterius;  
 quam nigri coloris. *Enum.*

*Tomi quarti ultimique finis.*



T O M I I V

# NOMENCLATOR

## ENTOMOLOGUS,

INSECTORUM SYSTEMATIS NATURÆ GENERA;  
SPECIES LINN. ANTIQUAS RECENTIORESQUE  
NUPERRIME DETECTAS,  
NECNON PRÆCIPUORUM ENTOMOLOGORUM  
SYNONYMIAM,  
ORDINE ALPHABETICO INDICANS,  
ABBREVIATIONES.

• • • • • Species novas designat.

*D. F.* . . . . D. Fabricium.

*Enum.* . . . . Austriæ Insectorum Enumerationem

*Scop.* . . . . Entomologiam Carniolicam.

*Geoff.* . . . . Insectorum Parisiensium Historiam.

*Ent. parif.* . . Entomologiam Parisiensem.

*V.* . . . . Nostrium Musæum.

D. Cinn.

Pag.

Gall.

APTERA.

LEPISMA.

Lineata.	* 3	La Rayée. <i>F.</i> . . . .
Longicornis.	* 3	La Longicorne. <i>Scop.</i>
Polypoda.	2	La Polypede. . . .
Saccharina.	1	La Saccharine. . . .
Terrestris.	3	La Terrestre.

PODURA.

Ambulans.	9	L'Ambulante. . . .
Annularis.	* 10	L'Annulaire. <i>Geoff.</i> . .
Aquatica.	8	L'Aquatique. . . .
Aquatica grisea.	* 10	L'Aquatique grise, <i>D. Geer.</i>
Arborea.	6	Des Arbres. . . .
Atra.	4	La Noire. . . .
Cincta.	7	L'Entourée. . . .
Fimetaria.	9	La Printaniere. . . .
Lignorum.	* 11	Des Bois. <i>F.</i> . . . .
Livida.	* 10	La Livide. <i>Geoff.</i> . . .
Longicornis.	* 10	La Longicorne. <i>Geoff.</i> .
Minuta.	5	La Petite. . . .
Monura.	* 11	La Monure. <i>Enum.</i>
Nivalis.	6	De la Neige. . . .
Plumbea.	5	La Plombée. . . .
Polypoda.	4	La Polypede. . . .
Pusilla.	8	La Bronzée. . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

APTERE.

. . . . .	. . . . .	ead. 3.
. . . . .	La Forbicine cylin-	
	drique. . . . .	ead. 2.
Forbicine demi-	Forbicine platte. .	ead. 1.
cylindrique,		
Pod. non sauteuse. . . . .		ead. 17.
<i>Deleatur.</i>		
Podure aquatique	Podure noire aqua-	
noire.	tique. . . . .	ead. 15.
Podure aquatique		
grise, p. 28.		
Podure grise des	Podure porte-an-	
arbres. <i>Lege</i> p. 21.	neaux. . . . .	ead. 9.
Pod. brune ronde. . . . .		ead. 4.
. . . . .	. . . . .	ead. 11.
. . . . .	. . . . .	ead. 16.
. . . . .	. . . . .	ead. 13.
. . . . .	Podure jaune à an-	
	neaux noirs. . .	Annulata.
. . . . .	Podure brune en-	
	fumée.	
. . . . .	. . . . .	ead. 6.
Podure grise des		
arbres. . . . .	. . . . .	ead. 7.
Podure plombée. .	Podure grise com-	
	mune. . . . .	ead. 5.
. . . . .	. . . . .	ead. 3.
. . . . .	. . . . .	ead. 14.

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Signata.	*	9	La Tachetée. <i>Geoff.</i> . . .
Termiformis.	*	13	La Termiforme. <i>Scop.</i>
Vaga.		6	La Vagabonde. . . . .
Viatica.	*	10	Des Chemins. <i>Geoff.</i> . . .
Villosa.		7	La Velue. . . . .
Violacea.	*	10	La Violette. <i>Geoff.</i> . . .
Viridis.		4	La Verte. . . . .

# TERMES.

Fatidicum.	15	Le Prophete. . . . .
Florum.	* 15	Des Fleurs. <i>Scop.</i>
Pulsatorium.	14	Le Balancier. . . . .
Sylvarum.	* 15	Des Forêts. <i>Scop.</i>

# PEDICULUS.

Alaudæ.	* 40	De l'Alouette des Champs. <i>I num.</i>
Albiventris.	* 38	Du Roitilet. <i>Scop.</i> . . .
Anseris.	23	Des Oies. . . . .
Apis.	31	De l'Abeille. . . . .
Ardeæ.	24	Du Héron cendré. . . .
Afini.	21	De l'Ane. . . . .
Auritus.	* 35	L'Auriculé. <i>Scop.</i>
Bidentatus.	* 37	Du Ramier. <i>Scop.</i>
Bovis.	20	Du Taureau. . . . .
Canis.	* 33	Du Chien. <i>D. Geer.</i> . . .
Caponis.	29	Du Chapon. . . . .
Cerambycinus.	* 38	De l'Abeille-Violette. <i>Scop.</i>
Cervi.	19	Du Cerf. . . . .
Charadrii.	25	Du Pluvier vert. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Podure noirâtre à  
taches fauves sur  
le ventre. . . ead. 1.

. . . . . ead. 8.

Pod. noire terrestre.

Podure commune  
velue. . . ead. 11.

Podure violette.

Podure verte aux  
yeux noirs. . . ead. 2.

. . . . . Hemer. 16.

Pou du Bois.

Pou du Bois. . . Hemer. 15.

. . . . . Motacillæ.

. . . . . id. . . . id. 22.

. . . . . id. . . . id. 42.

. . . . . id. . . . M. id.

. . . . . id. 10.

. . . . . id. 7.

Ricin du Chien.

Pou de la Poule à  
ventre bordé de  
noir. . . . id. 35.

. . . . . id. 5.

. . . . . M. id.



<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gali.</i>
Chloridis.	* 41	Du Verdier. <i>Enum.</i>
Ciconiæ.	25	De la Cicogne. . . . .
Citrinellæ.	* 41	De l'Ortolan. <i>Enum.</i>
Coccineus.	* 38	Des Hémérobés. <i>Scop.</i>
Columbæ.	30	Du Pigeon. . . . .
Colymbinus.	* 37	Du Grebe de riviere. <i>Scop.</i>
Corvi.	22	Du Corbeau. . . . .
Currucæ.	* 41	De la Fauvette babillarde: <i>Enum.</i>
Curvirostræ.	* 41	Du Bec-Croisé. <i>Enum.</i>
Cuspidatus.	* 37	Du Râle d'eau. <i>Scop.</i>
Cygni.	23	Du Cygne. . . . .
Dentatus.	* 35	Du Canard. <i>Scop.</i>
Dolichocephalus.	* 34	Du Lorient. <i>Scop.</i>
Emberizæ.	* 32	Du Bruant. <i>D. Geer.</i>
Equi.	21	Du Cheval. . . . .
Farionis.	31	De la Truite faumonée.
Fasciatus.	* 34	Du Coucou. <i>Scop.</i>
Fringillæ.	* 31	Du Pinçon. <i>D. Geer.</i>
Fulicæ.	25	De la Morelle. . . . .
Gallinæ.	28	De la Poule. . . . .
Gallinæ.	* 33	De la Poule. <i>D. Geer.</i>
Grassicornis.	* 35	Du Canard sauvage. <i>Scop.</i>
Gruis.	25	De la Grue. . . . .
Hæmatopi.	26	De l'Huitrier. . . . .
Hæmatopus.	* 33	De l'Autour. <i>Scop.</i>
Hirundinis.	31	Du Martinet. . . . .
Humanus.	17	De l'Homme. . . . .
Humanus capitis.	* 41	De la Tête. <i>D. Geer.</i>
Junceus.	* 37	Du Vaneau. <i>Scop.</i>
Infaufti.	22	Du Merle de Roche. . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

• • • • • id. 28.

• • • • • Pou du Pigeon. id. 36.

Ricin de la Cor- Pou du Corbeau. id. 15.  
nille.

• • • • • id. id. 21.

Ricin du Bruant. Pou du Moineau Orioli.  
Franc. id. 37.  
• • • • • id. 9.

Ricin du Pinçon. Cuculi.  
• • • • • id. M. id.

• • • • • Pou de la Poule à  
tête & corcelet  
pointu des deux  
côtés. id 33 &  
non 30.

Ricin de la Poule.  
*Lege Crafficornis.*

• • • • • id. 27.  
• • • • • id. 30.  
• • • • • Strigis.  
• • • • • id. 40.  
Le Pou ordinaire. Le Pou ordinaire. id. 1.  
Pou humain de la  
tête.

• • • • • id. 17.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Lagopi.	30	De la Gêlinotte blanche. :
Maximus.	* 34	De la Bufe. <i>Scop.</i> . . .
Meleagridis.	27	Du Dindon. . . . .
Mergi.	* 32	Bu Plongeon. <i>D. Geer.</i> .
Moschatae.	23	Du Canard masqué.
Musculi.	* 39	Des Souris. <i>Enum.</i>
Ocellatus.	34	De la Corneille. . . . .
Ortygometrae.	* 40	Du Roi de Caille. <i>Enum.</i>
Ovalis.	* 37	Du Courly. <i>Scop.</i>
Ovis.	19	De la Brebis.
Pari.	30	De la Mêleange. . . . .
Pavonis.	26	Du Paon. . . . .
Phasiani.	* 39	Du Faifan. <i>F.</i> . . . . .
Picae.	23	De la Pie. . . . .
Plataleae.	24	De la Spatule. . . . .
Porcelli.	18	Du Cochon-d'Inde.
Pubis.	18	Le Morpion. . . . .
Querquedulae.	24	De la Sarcelle. . . . .
Recurvirostrae.	25	De l'Avofette. . . . .
Roftratus.	* 38	Du Taupe-Grillon. <i>Scop.</i>
Rubeculae.	* 41	De la Rouge-Gorge. <i>Enum.</i>
Sternæ.	24	De la Mouette. . . . .
Suis.	18	Du Cochon.
Tetraonis.	29	Du Coq de bruyere. . . .
Tinnunculi.	21	De la Crecerelle. . . . .
Vituli.	21	Du Veau. . . . .

P U L E X.

Irritans.	42	La Puce. . . . .
-----------	----	------------------

A C A R U S.

Acarorum.	* 78	Des Mittes. <i>Enum.</i>
Alaudæ.	* 74	De l'Alouette. <i>Enum.</i>
Agaricorum.	* 65	Des Agarics. <i>Scop.</i>
Appendiculatus.	* 75	L'Appendiculée. <i>Enum.</i> <i>D. Geer.</i>

*Fab.*

### Ricin du Plongeon.

	<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Aphidum.	*	67	Des Pucerons. <i>D. Geer.</i> :
Aphidioides.		49	L'Aphidioïde. . . . .
Aquaticus.		53	L'Aquatique. . . . .
Aquaticus marginatus.	*	69	L'Aquatique à ailerons. <i>D. Geer.</i> . . . . .
Aquaticus maculatus.	*	69	L'Aquatique tachetée. <i>D.</i> <i>Geer.</i> . . . . .
Aquaticus globosus.	*	68	L'Aquatiq. ronde. <i>D. Geer.</i>
Avicularum.	*	66	L'Aviculaire. <i>D. Geer.</i> .
Baccarum.		57	Des Baies. . . . .
Cadaverum.	*	71	Des Cadavres. <i>Enum.</i>
Carduelis.	*	77	Du Chardonnet. <i>Enum.</i>
Caudatus.	*	68	La Prolongée. <i>D. Geer.</i> .
Coccinellæ.	*	64	Des Coccinelles. <i>Scop.</i>
Coccineus.	*	77	L'Écarlate. <i>Enum.</i>
Coleoptratorum.		59	Des Coléoptères. . . . .
Coleoptratus.		49	La Coléoptère. . . . .
Collurionis.	*	63	Du Lanier-Écorcheur. <i>Scop.</i>
Conservæ.	*	71	De la Conserve. <i>Enum.</i>
Cornicis.	*	62	De la Corneille. <i>Scop.</i>
Corticalis.	*	67	La Corticale. <i>D. Geer.</i> :
Craffipes.		46	La Craffipede. . . . .
Croceus.		62	La Safranée. . . . .
Culicis.	*	67	Des Cousins. <i>D. Geer.</i> .



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Mitte des Pucerons.

. . . . . La Tique rouge des  
pierres à pattes  
antérieures fort  
longues. . . .

id. 19.

Mitte aquatique  
rouge.

La Tique rouge fa-  
tinée aquatique.

Trombidium  
tertium &  
non septi-  
mum.

Mitte aquatique à  
ailerons.

Mitte aquatique à  
taches.

Mitte aquatique  
ronde. . . . .

Trombid. 5.

Mitte des petits  
Oiseaux.

. . . . . id. 26.

Mitte à queue. . . . . Trombid. 4.

Mitte des Bour-  
dons.

Mitte des Coléop-  
teres. . . . .

id. 30.

Mitte à rebord.

Tique noire à ven-  
tre anguleux en  
devant. . . .

id. 18.

Mitte de l'écorce  
des arbres.

Tique noire & lisse  
des pierres.

. . . . . id. 14.

. . . . . id. 40.

Mitte des Cousins.

1 ij

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Denticulatus.	* 76	La Dentelée. <i>Enum.</i>
Destructor.	* 72	La Mitte - Destructeur. <i>Enum.</i>
Domesticus.	* 65	La Domestique. <i>D. Geer.</i>
Dysenteriaë.	51	La Dyssentérique. . . . .
Elephantinus.	44	L'Éléphant. . . . .
Eruditus.	* 73	La Bibliomane. <i>Enum.</i>
Exulcerans.	52	De la Gale. . . . .
Foliorum.	* 77	Des Feuilles. <i>Enum.</i>
Formicarum.	* 64	Des Fourmis. <i>Scop.</i>
Fucorum.	* 70	Du Varec. <i>F.</i> . . . .
Fungorum.	61	Des Champignons. . . .
Geniculatus.	53	La Géniculée. . . . .
Graminum.	* 75	Des Graminées. <i>Enum.</i>
Gymnopteronum.	58	Des Gymnopteres. . . .
Hispanus.	* 70	L'Espagnole. <i>F.</i> . . . .
Holofericeus.	54	La Satinée. . . . .
Holfatus.	* 70	L'Aplanie. <i>F.</i> . . . .
Lactis.	51	Du Lait. . . . .
Leucurus.	* 71	La Blanchâtre. <i>Enum.</i>
Lichenum.	* 65	Des Lichens. <i>Scop.</i>
Lichenis.	* 71	Du Lichen de terre. <i>Enum.</i>
Limacum.	* 77	Des Limaçons. <i>Enum.</i>
Liptienfis.	* 70	La Saxonne. <i>F.</i> . . . .
Littoralis.	61	Des Rivages. . . . .
Locusta.	* 63	De la Mésange bleue. <i>Scop.</i>
Longicornis.	60	La Longicorne. . . . .
Motatorius.	48	La Mobile. . . . .
Muscarum.	57	Des Mouches. . . . .
Muscarum.	* 64	Des Mouches. <i>Scop.</i>
Musci.	* 77	De la Mouffe. <i>Enum.</i>
Muscorum.	* 65	Des Mouffes. <i>Scop.</i>
Nataior.	* 70	La Tique-Nageur. <i>Enum.</i>
Nepæformis.	* 64	La Cimicoïde. <i>Scop.</i>
Pallipes.	* 69	La Pallipede. <i>F.</i> . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Mitte Domestique.

. . . . . id. 24.  
. . . . . id. 1.

Mitte de la Gale.

Le Ciron de la Gale.

Scabiei.

. . . . . id. 36.  
. . . . . id. 37.  
. . . . . id. 25.

Mitte des Demoi-  
selles.

Mitte rouge des  
Mouches. . .

id. 29.  
*M.* id.

Mitte satinée ter-  
restre.

Tique rouge satinée  
terrestre.

Trombid. 2.

. . . . . *M.* id.  
. . . . . id. 23.

. . . . . id. 8.  
. . . . . id. 35.

. . . . . La Pince rouge. . id. 34.  
. . . . . id. 17.

Mitte des Mouches.

Mitte brune des  
Mouches. . .

id. 28.

. . . . . id. 4.  
*l. iij*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Parasitus.	* 67	La Parasite. <i>D. Geer.</i> .
Passerinus.	47	Des Moineaux. . . .
Phalangii.	* 66	Des Faucheurs. <i>D. Geer.</i>
Phalangoides.	* 68	La Phalangiforme. <i>D. Geer.</i>
Pici.	* 63	Du Pic moyen. <i>Scop.</i>
Piger.	* 65	Du Lichen des Hêtres. <i>Scop.</i>
Prægnans.	* 76	La Printanière. <i>Enum.</i>
Putrescentiæ.	* 77	De la Fermentation. <i>Enum.</i>
Radiatus.	* 62	Des Tortues. <i>Scop.</i>
Reduvius.	44	La Réduve. . . . .
Ricinus.	46	La Tique des Chiens. . .
Rubens.	* 76	La Rougeâtre. <i>Enum.</i>
Rupestris.	60	Des Pierres. . . . .
Salicinus.	61	Des Saules. . . . .
Sambuci.	* 78	Du Sureau. <i>Enum.</i>
Sanguisugus.	* 69	La Sangsue. <i>F.</i> . . .
Scaber.	61	La Chagrinée.
Siro.	50	De la Farine. . . . .
Squamofus.	* 66	L'Écailleuse. <i>D. Geer.</i> .
Telarius.	50	La Tisserand. . . . .
Testudineus.	* 76	La Tortue. <i>Enum.</i>
Tremellæ.	61	De la Trémelle. . . . .
Turdi.	* 63	Du Merle à collier. <i>Scop.</i>
Vegetans.	* 79	La Végétante. <i>Enum.</i>
Vespertilionis.	47	Des Chauve-Souris. . .
Vitis.	* 76	De la Vigne. <i>Enum.</i>
Zosteræ.	* 70	De l'Algue marine. <i>F.</i> .

# PHALANGIUM.

Araneoides.	* 85	L'Aranéoïde. <i>F.</i> . . .
Balænarum.	* 83	Des Baleines <i>F.</i> . . .
Bilineatum.	* 84	Le Rayé. <i>F.</i> . . . .
Bimaculatum.	* 84	Le Bimaculé. <i>F.</i> . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Mitte Parasite.

Mitte des Moi- Tique de la Chauve-  
neaux. Souris. . . . id. 16.

M. des Faucheurs. . . . id. 31.

Mitte-Faucheur.

Mitte Réduve. . . . id. 3.

Mitte Ricinoïde. . LaTique des Chiens. id. 2.

. . . . id. 33.

. . . . id. 39.

. . . . id. 5.

Mitte de la farine. . . . id. 21.

Mitte à écailles.

Mitte Fileuse. Le Tisserand d'au-  
tomne. *Lege* 626. id. 20.

. . . . id. 38.

. . . . id. 15.

. . . . id. 27.

. . . . id. 10.

. . . . Pyenogo-  
num 1.

. . . . id. 4.

. . . . id. 6.



clxviii Tom. IV. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Cancroides.	82	Faux Scorpion. . . . .
Cornutum.	81	Le Cornu. . . . .
Diadema.	* 84	Le Diadème. <i>F.</i> . . . .
Grossipes.	80	Le Grossipede.
Opilio.	80	Des Murailles. . . . .
Tricarinatum.	83	Le Tricarené. . . . .

A R A N E A.

Albini.	* 108	L'Albin. <i>Scop.</i>
Albo-Maculata.	* 117	La Huitmaculée. <i>D. Geer.</i>
Aldrovandi.	* 107	L'Aldrovande. <i>Scop.</i>
Angulata.	90	L'Angulaire. . . . .
Annularis.	* 128	L'Annulaire. <i>V.</i>
Aquatica.	102	L'Aquatique. . . . .
Arundinacea.	90	Des Roseaux.
Atrox.	* 117	L'Atroce. <i>D. Geer.</i> . . .
Aurantio-Maculata.	* 114	L'Orangée. <i>D. Geer.</i> . . .
Bimaculata.	98	La Bimaculée.
Bipunctata.	89	La Biponctuée. . . . .
Blancardi.	* 113	La Blancard. <i>Scop.</i>
Prachiata.	* 125	La Difforme. <i>Faun. Frid.</i>
Calycina.	88	La Fleuriste.
Carnifex.	* 123	La Meurtrière. <i>F.</i> . . . .
Catesbei.	* 112	La Catesby. <i>Scop.</i>
Chelata.	* 125	La Chéliforme. <i>Faun. Frid.</i>
Cicatricosa.	* 115	La Cicatrisée. <i>D. Geer.</i> . .
Cinerea.	* 125	La Condrec. <i>F.</i> . . . .
Citrea.	* 120	La Citronnée. <i>D. Geer.</i> . .
Clerckii.	* 109	La Clerk. <i>Scop.</i>
Conica.	* 115	La Conique. <i>D. Geer.</i> . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Faux - Scorpion d'Europe.	Le Scorpion-Arai- gnée.	Scorpio 7.
Faucheur cornu.	id. teste <i>D. Fabricio.</i>	id. 3.
. . . . .	. . . . .	id. 5.
Fauc. des murailles.	Le Faucheur. . .	id. 2.
. . . . .	. . . . .	<i>M.</i> id. 6.

Araignée tachetée  
de blanc.

Araignée angulaire. . . . . ead. 20.

Araignée aquatique. L'Araignée brune  
aquatique. . . ead. 32.

Araignée atroce.  
Araignée tachetée  
d'orangé.

Araignée à points  
concaves.

. . . . . ead. 36.

Araig. à cicatrices. . . . . ead. 44.

Araig. jaune-citron. L'Araignée citron.  
*Lege n<sup>o</sup>. 2.*

Araignée à ventre  
conique.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Corollata.	94	Des Fleurs.
Cucurbitina.	88	La Cucurbite. . . . .
Degeeri.	* 107	La Degéer. <i>Scop.</i>
Diadema.	86	La Porte-Croix. . . . .
Domestica.	91	La Domestique. . . . .
Dorsalis.	* 123	La Dorsale. <i>F.</i> . . . .
Dorsata.	* 122	La Hâlée. . . . .
Dumetorum.	* 126	Des Buissons. <i>Geoff.</i> . . .
Extensa.	96	La Patte-Étendue. . . .
Fasciata.	* 125	La Fasciée. <i>Geoff.</i> . . .
Fimbriata.	97	Des Marais. . . . .
Foliata.	* 126	La Porte-Feuille. <i>Geoff.</i> . .
Formicaria.	* 119	La Fourmi. <i>D. Geer.</i> . . .
Formosa.	* 130	La Belle. <i>V.</i>
Forskaelii.	* 110	La Forschael. <i>Scop.</i>
Frischii.	* 108	La Frisch. <i>Scop.</i>
Fumigata.	94	L'Enfumée. . . . .
Furcata.	* 129	La Fourchue. <i>V.</i>
Fusca.	* 115	La Brune. <i>D. Geer.</i> . . .
Globosa.	* 121	La Globuleuse. <i>F.</i> . . . .
Goedartii.	* 108	La Goédart. <i>Scop.</i>
Goezenii.	* 125	La Goézen. <i>Enum.</i>
Grossipes.	* 119	La Crassipède. <i>D. Geer.</i> . .
Halsequitii.	* 111	L'Halsequist. <i>Scop.</i> <sup>1</sup>
Holosericea.	98	La Satinée. . . . .
Horrida.	* 121	L'Horrible. <i>F.</i> . . . .
Joblotii.	* 113	La Joblot. <i>Scop.</i>
Jonstoni.	* 111	La Jonston. <i>Scop.</i>

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Araignée verte à  
points noirs.

Araignée à croix. L'Araignée à croix  
papale. . . . .

ead. 27.

Araig. Domestique. . . . .

ead. 13.

. . . . .

ead. 41.

. . . . .

ead. 14.

. . . . . Araignée à feuille  
coupée.

Araignée Patte- Araignée à ventre  
Étendue. cylindrique &  
pattes de devant  
étendues. . . . .

ead. 1.

. . . . . Araignée brune à  
trois raies trans-  
versales sur le  
ventre.

Araig. des marais. . . . .

ead. 40.

. . . . . Arai. Porte-Feuille.

Araignée Fourmi.

. . . . .

ead. 39.

Araignée brune.

. . . . .

ead. 9.

Araignée à grosses  
pattes.

Araignée satinée.

. . . . .

ead. 10.

clxxij *Tom. IV. NOMENCLATOR*

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Impressa.	* 122	L'Imprimée. <i>F.</i> . . .
Intersecta.	* 126	L'Entrecoupée. <i>Geoff.</i> . .
Kalmii.	* 111	La Kalm. <i>Scop.</i>
Labyrinthica.	92	La Dédale. . . . .
Lævipes.	105	La Tigrée. . . . .
Latens.	* 120	La Cachée. <i>F.</i> . . . .
Leuwenhoekii.	* 106	La Leuwenhoek. <i>Scop.</i>
3-Lineata.	92	La Trirayée.
4-Lineata.	93	La Quadrirayée.
Lineata.	* 129	La Rayée. <i>V.</i>
Littoralis.	* 118	Des Rivages. <i>D. Geer.</i> .
Longipes.	* 124	La Longipede. <i>F.</i> . . .
Longipes.	* 127	La Longipede. <i>Geoff.</i> . . .
Lupus.	* 127	Le Loup. <i>Geoff.</i> . . .
Malpighii.	* 109	La Malpighi. <i>Scop.</i>
Marginata.	* 118	La Bordée. <i>D. Geer.</i> . .
Margravii.	* 113	La Margrave. <i>Scop.</i>
Marmorata.	* 122	La Marbrée. <i>F.</i> . . .
Marmorata.	* 127	La Déchiquetée. <i>Geoff.</i> .
Merianæ.	* 107	La Mérian. <i>Scop.</i>
Moniligera.	* 128	La Porte-Anneau. <i>V.</i>
Montana.	95	La Renversée. . . . .
Mouffeti.	* 110	La Mouffet. <i>Scop.</i>
Myopa.	* 124	La Myope. <i>F.</i> . . . .
Nigrita.	* 121	La Nègresse. <i>F.</i> . . . .
Nocturna.	96	La Nocturne.
Notata.	95	La Fasciée.
Octopunctata.	89	La Huitponctuée. . .
Osbeckii.	* 110	L'Osbeck. <i>Scop.</i>
Palustris.	103	Des Prés marécageux. .



*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

. . . . . ead. 15.

. . . . . Araignée à ventre  
roux rayé de noir  
& pattes arlequi-  
nées.

Araignée tigrée. . . . . ead. 30.

. . . . . ead. 16.

. . . . . ead. 5.

Araig. des rivages.

. . . . . ead. 48.

. . . . . Araignée rougeâtre  
à ventre jaune  
ponctué de noir.

. . . . . Araignée-Loup.

Araignée bordée.

*Lce* Marmorea. . . . . Marmor. 22.

. . . . . Araignée à feuilles  
découpées & dé-  
chiquetées.

Araignée renversée  
Domestique.

. . . . . ead. 47.

. . . . . ead. 8.

. . . . . ead. 31.

clxxiv Tom. IV. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gall.</i>
Petiverii.	* 110	La Pétiver. <i>Scop.</i>
Phalangioides.	* 127	La Phalangioïde. . . . .
Pini.	* 119	Du Pin. <i>D. Geer.</i> . . . .
Podæ.	* 113	La Poda. <i>Scop.</i>
Pubescens.	* 123	La Cotonneuse. <i>F.</i> . . .
Pundatoria.	* 128	La Dangereuse. <i>V.</i>
Quadrinaculata.	* 114	La Quadrinaculée. <i>D. Geer.</i>
Quadrinaculata.	198	La Quadrinaculée. . . . .
Raji.	* 106	La Rai. <i>Scop.</i>
Reaumurii.	* 105	La Réaumur. <i>Scop.</i>
Redii.	* 107	La Redi. <i>Scop.</i>
Redimita.	93	La Couronnée. . . . .
Resupina Sylvestris.	* 116	La Renversée - Sauvage. <i>D. Geer.</i> . . . . .
Reticulata.	87	La Réticulée.
Riparia.	92	Des Rivages.
Roberti.	* 112	La Robert. <i>Scop.</i>
Roefelii.	* 108	La Roefel. <i>Scop.</i>
Rufipes.	95	La Rufipede.
Rufofasciata.	* 117	La Fasciée. <i>D. Geer.</i> . . .
Rumphii.	* 112	La Rumphius. <i>Scop.</i>
Rufestris.	102	Des Pierres.
Ruricola.	* 118	La Campagnarde. <i>D. Geer.</i>
Saccata.	103	La Porte-Sac. . . . .
Sanguinolenta.	95	La Sanguinolente.
Scenica.	101	La Parée. . . . .
Schæfferi.	* 109	La Scheffer. <i>Scop.</i>

D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

. . . . . : Araig. Domestique  
semblable au Fau-  
cheur. *Ent. paris.*

Araignée du Pin.

. . . . . ead. 43.

Araignée à quatre  
taches blanches.

. . . . . ead. 23.

Araignée à couron-  
ne rouge.

Araignée Renver-  
sée-Sauvage.

Araignée à bande  
rouille.

Araignée de terre.

. . . . . Araignée cendrée à  
trois lignes blan-  
ches sur le cor-  
celet. . . . . ead. 38.

Araignée à bandes  
blanches, Araig. fauteuse aux  
trois chevrons  
blancs. . . . . ead. 41.

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Gal.</i>
Scopulorum.	* 125	Des Écueils. <i>F.</i> . . .
Scorpiformis.	* 123	La Scorpiforme. <i>F.</i> . . .
Senoculata.	99	A six Yeux. . . . .
Sexpunctata.	97	La Sixpunctuée. . . . .
Signata.	* 120	La Marquée. <i>F.</i> . . .
Sloanii.	* 112	La Sloane. <i>Scop.</i>
Swammerdamii.	* 106	La Swammerdam. <i>Scop.</i>
Tarantula.	100	La Tarentule. . . . .
Tricuspidata.	* 122	La Convergente. <i>F.</i> . . .
Triguttata.	* 122	La Triponctuée. <i>F.</i> . . .
Truncorum.	101	Des Troncs.
Tuberculata.	* 115	La Tuberculée. <i>D. Geer.</i> . .
Udmanni.	* 111	L'Udmann. <i>Scop.</i>
Umbratica.	* 129	La Délicate. <i>V.</i>
Viatica.	104	La Voyageuse. . . . .
Virefcens.	104	La Verdâtre.
Viridissima.	* 116	La Verte. <i>D. Geer.</i> . . .
Vittata.	* 127	La Bandelette. <i>Geoff.</i> . .
Wilkii.	* 111	La Wilkes. <i>Scop.</i>

## S C O R P I O.

Europæus.	131	L'Européen. . . . .
-----------	-----	---------------------

## C A N C E R.

Alatus.	* 165	L'Ailé. <i>F.</i> . . . . .
Angulatus.	* 141	L'Anguleux. <i>F.</i> . . . . .
Araneiformis.	* 166	L'Aranéiforme. <i>F.</i> . . . .
Araneus.	142	L'Araignée. . . . .
Arctus.	159	L'Étroit. . . . .
Astacus.	153	L'Écrevisse. . . . .
Atomos.	164	L'Atome. . . . .
Auritus.	* 149	L'Auriculé. <i>F.</i> . . . . . <i>D. Geer.</i>





D. Linn. Pag. Gall.

Bernardus.	150	Bernard - l'Hermite.	c. 1
Boreas.	* 167	Le Boréal. F.	. . . . .
Cancellus.	* 169	Le Sibérien. F.	. . . . .
Caput-Mortuum.	152	La Tête-de-Mort.	. . . . .
Carabus.	156	Le Carabé.	. . . . .
Chiragra.	* 149	Le Chiragre. F.	. . . . .
Condylatus.	* 148	Le Crochu. F.	. . . . .
Corniger.	* 169	Le Porte-Corne. F.	. . . . .
Cornutus.	146	Le Cornu.	. . . . .
Crangon.	155	Crangon.	. . . . .
Cruentatus.	147	L'Enfanglanté.	. . . . .
Depressus.	* 142	L'Aplati. F.	. . . . .
Depurator.	139	L'Élargi.	. . . . .
Dodecos.	145	Le Formidable.	. . . . .
Eremita.	151	L'Hermite.	. . . . .
Esca.	* 170	L'Utile.	. . . . .
Gammarus.	152	La Langouste.	. . . . .
Germanus.	147	L'Allemand.	. . . . .
Gibbosus.	* 169	Le Bosu. F.	. . . . .
Granarius.	* 136	Le Grain. F.	. . . . .
Granulatus.	139	Le Granulé.	. . . . .
Grapsus.	148	Le Tacheré.	. . . . .
Groenlandicus.	* 168	Le Groenlandois. F.	. . . . .
Grossipes.	161	Le Grossipede.	. . . . .
Harengum.	* 167	Des Harengs. F.	. . . . .
Hastatus.	145	Le Militaire.	. . . . .
Hexapus.	134	L'Exapode.	. . . . .
Hirtellus.	143	Le Hérissé.	. . . . .
Histro.	* 167	L'Arlequin. F.	. . . . .
Homari.	* 166	Du Homar. F.	. . . . .
Istrianus.	* 140	L'Istrien. Scop.	. . . . .
Lanatus.	142	Le Velu.	. . . . .
Locusta.	163	La Sauterelle.	. . . . .
Longicornis.	135	La Longicorne.	. . . . .
Linearis.	163	Le Linéaire.	. . . . .
Maja.	146	Le Maja.	. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Écrevisse-Bernard-

l'Hermite. . . . .

Pagur. 2.

Astac. 12.

Gamm. 3.

Pagur. 9.

id.

*M.* id.

Gamm. 7.

id.

Astac. 20.

id.

id.

Longirostr.

Pagur. id.

Gamm. 12.

Marinus.

id.

*M.* Gam. id.

*M.* id.

id.

id.

Astacus 14.

Gammarus

longicornis.

Astacus 8.

id.

*Lege* Histrio. . . . .

Astacus id.

Astacus id.

id.

Gammar. 5.

id.

Gammar. 8.

id.

*m ij*

CLXXX TOM. IV. NOMENCLATOR

<i>D. Linn.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Call.</i>
Mantis.	160	La Mante. . . . .
Mascearonius.	* 150	L'Aplani. <i>F.</i> . . . .
Medusarum.	* 170	Des Meduses. <i>F.</i> . . . .
Minutus.	134	La Nourrice. . . . .
Mœnas.	138	Le Fou. . . . .
Muscosus.	143	L'Enveloppé. . . . .
Mutus.	123	Le Muet. . . . .
Narval.	* 166	Le Narval. <i>F.</i> . . . .
Nasutus.	* 148	Le Prolongé. <i>F.</i> . . . .
Norwagicus.	158	Le Norvégien. . . . .
Nugax.	* 169	Le Dilaté. <i>F.</i> . . . .
Nucleus.	137	La Noix. . . . .
Oculatus.	* 165	L'Oculé. <i>F.</i> . . . .
Pagurus.	140	L'Officinal. . . . .
Pelagicus.	136	De l'Océan. . . . .
Pennaceus.	154	L'Arlequin. . . . .
Personatus.	144	Le Caché. . . . .
Pisum.	133	L'Orbiculaire. . . . .
Puber.	126	Le Cotonneux. . . . .
Pulex.	162	La Puce. . . . .
Puillus.	* 136	Le Nain. <i>F.</i> . . . .
Pygmaeus.	* 141	Le Pygmée. <i>F.</i> . . . .
Rhomboides.	136	Le Romboïde. . . . .
Rostratus.	143	Le Museau. . . . .
Rugosus.	* 166	Le Ridé. <i>F.</i> . . . .
Salinus.	164	Des Salines. . . . .
Scorpio.	* 149	Le Scorpion. <i>F.</i> . . . .
Squilla.	155	La Squille. . . . .
Stagnalis.	164	Des Étangs. . . . .
Strigosus.	157	Le Strié. . . . .
Symnista.	157	Le Secrétaire. . . . .
Tettigonus.	* 168	L'Islandois. <i>F.</i> . . . .
Tribulus.	144	Le Tribule. . . . .
Tubularis.	151	Le Tubulaire. . . . .
Varius.	* 168	Le Varié. <i>F.</i> . . . .



MONOCULUS.

Apus.	171	L'Armé. . . . .
Bispinosus.	* 175	L'Épineux. <i>D. Geer.</i> . .
Conchaceus.	174	L'Ovale. . . . .
Elongatus.	* 176	L'Alongé. <i>D. Geer.</i> . .
Exspinosus.	* 176	Le Foible. <i>D. Geer.</i> . .
Gasterostei.	* 177	Du Gasteroste. <i>Geoff.</i> . .
Infusorius.	* 177	L'Imperceptible. <i>Enum.</i>
Lenticularis.	175	Le Lenticulaire.
Pediculus.	173	Le Pou branchu. . . .
Piscinus.	171	Le Plumet. . . . .
Pulex.	172	La Puce branchue. . .
Quadricornis.	173	Le Quadricorne. . . .

ONISCUS.

Albicornis.	* 186	L'Albicorne. <i>F.</i> . . .
Aquaticus.	182	L'Aquatique. . . . .
Armadillo.	184	L'Armadille. . . . .
Afellus.	183	Le Cloporte. . . . .
Afilus.	178	L'Afile. . . . .
Affimilis.	183	L'Analogue. . . . .
Bicolor.	* 188	Le Bicolor. <i>V.</i>
2-Caudatus.	181	La Double-Queue. . .
Ceti.	180	De la Baleine. . . . .
Chelipes.	* 185	Le Porte-Pince. . . .



D. Geer.

D. Geoff.

D. Fab.

Le Binocle à queue  
en filets. . . . id.

Monocle à coquille  
à deux pointes. . . . id.

Monocle à coquille Le Monocle à co-  
ovale. . . . quille longue. . . id.

Monocle alongé.

Monocle à coquille  
sans pointe. . . . id.

Monocle-Pou bran- Le Monocle à queue  
chu. . . . retrouffée. . . id.

Le Binocle à queue  
en plumer. . . id.

Monocle - Puce Le Perroquet d'eau.  
branchue. . . . Lege p. 655. . id.

Monocle à quatre Le Monoc. à queue  
cornes. . . . fourchue. . . id.

Squille-Afelle. . . . L'Afelle d'eau-  
douce. . . . M. id.  
id.

Le Cloporte-Arma-  
dille. . . . id.

Cloporte-Afelle. Le Clop. ordinaire. id.

id. id.

id. id.

id. id.

Squille de la Ba- id.

leine. . . . id.

id. id.

id. id.

# CLXXXIV TOM. IV. NOMENCLATOR

D. Linn.	Pag.	Gall.
Convexus.	* 187	Le Voûté. D. Geer. . . . .
Entomon.	179	Entomon. . . . .
Macillatus.	* 186	Le Tacheté. F. . . . .
Marginatus.	* 187	Le Bordé. V. . . . .
Marinus.	181	Le Marin. . . . .
Muscorum.	* 187	Des Mouffes. Scop. . . . .
Oceanicus.	183	L'Océanique. . . . .
Oestrum.	178	L'Oestre. . . . .
Phyfodes.	179	Le Quadricorne. . . . .
Pfora.	173	L'Anti-Galeux. . . . .
Pustulatus.	* 186	Le Pustulé. F. . . . .
Scopulorum.	182	Des Écueils. . . . .
Serratus.	* 186	Le Dentelé. F. . . . .
Spinofus.	185	L'Épineux. . . . .
Variegatus.	* 188	Le Varié. V. . . . .

## SCOLOPENDRA.

Coleoptrata.	190	La Coléoptère. . . . .
Electrici.	193	L'Électrique. . . . .
Ferruginea.	192	La Ferrugineuse. . . . .
Forficata.	191	La Forchue. . . . .
Gabrielis.	193	La Gabriele. . . . .
Lagura.	189	Le Pinceau. . . . .
Marina.	194	La Marine. . . . .
Morfitans.	191	La Mordante. . . . .

## JULUS.

Complanatus.	196	L'Aplati. . . . .
Ovalis.	195	L'Ovale. . . . .
Sabulosus.	197	Du Sable. . . . .
Terrestris.	195	Le Terrestre. . . . .
Varius.	198	Le Varié. . . . .

*D. Geer.*

*D. Geoff.*

*D. Fab.*

Cloporte voûté.

Squille-Entomon. . . . . id.

*Lege* Maculatus. . . . . id.

Squille marine. . . . . id.

. . . . . id.

. . . . . id. 4 &

*non* 3.

. . . . . id.

. . . . . id. 12 &

*non* 3.

. . . . . id.

. . . . . id.

. . . . . *M.* id.

. . . . . id.

. . . . . ead.

Scolopendre jaune. La Scolopendre à

*Lege* Electrica. vingt-huit pattes. ead.

Scolopendre rousse. . . . . ead.

Scolop. fourchue. La Scolopendre à

treinte pattes. . ead.

. . . . . ead.

Jule à queue en pin- La Scol. à pinceau. ead.

ceau. . . . . ead.

. . . . . ead.

Scolop. mordante. . . . . ead.

Jule aplati. . . . . Scolop. à 60 pattes. id.

. . . . . id.

. . . . . Jule à 240 pattes. id.

Jule à bandes. Le Jule à 200 pattes. id.

. . . . . id.







